


Alex. Ziwet
gt.
8-30-1922

LIPSIAE: TYPIS B. G. TEUBNERI.

.e quo u. infra p. XIII.
XV, de quo u. infra

aec. XVI, olim Col-
!—32, Sereni opus-

ie. saec. XV—XVI,
Eutocium continet,
olim Pinellii, qui
rum initium (usque
taui.
odicum uideamus.

sse, ostendit eius Vat.
nsensus, uelut II
338, 15; 342, 20;
n modo reliquit;
ἄμετρον habet;

ersus, om. w;
o uersus, πρ w;
o uersus, om. w;

. uelut II p. 170,

it uel hi loci Vat.
s — p. 192, 1
W, om. wv.
potest, ut ex
atio igitur II

Urbin. 73 e v descriptus est U; u. II p. 326, 13 *HΘ* καί] *HΘK* cum lacuna 2 litt. Ww, ηϑκ v, ἡ ϑκ U, ϑη m. 2; p. 342, 16 εἰς τὸ λγ′] Ww, om. vU, εἰς τὸ λδ′ mg. m. 2 U.

Paris. suppl. 451, Paris. 2358 praeterea e v descripti sunt codd. 4 et 5; u. II p. 168, 9 ἐπινοῆσαι] Ww, ἐπιχειρῆσαι vU, 4, 5, corr. m. 2 U et 5; II p. 170, 11 ἐν] Ww, om. vU, 4, 5, corr. m. 2 U.

Mutin. etiam cod. Mutin. II D 4 ex v pendere, demonstrabo infra p. XXI.

Uat. 1575 Paris. 2357 codd. 1 et 3, quorum uterque ab Ioanne Hydruntino scriptus est, ab ipso W pendent; nam summa fide omnia eius uitia, etiam minutissima, repetunt.

Paris. 2342 p quoque ex W pendet; nam non modo saepissime eosdem errores stultos habet (II p. 174, 14; 176, 24; 180, 6; 194, 4; 212, 15; 214, 4, 12; 222, 13, 16; 228, 5; 234, 17; 238, 25; 248, 20; 268, 7; 274, 22; 278, 1; 280, 1, 4, 12; 284, 7; 302, 3, 5; 308, 23; 312, 3; 314, 6; 320, 9, 15; 324, 2, 11; 346, 1; 350, 9; 358, 2; 360, 5) et easdem lacunas omissionesque (II p. 196, 26; 218, 10; 290, 8; 292, 1, 14; 306, 8; 308, 14; 310, 6; 334, 22; 338, 15; 340, 13, 15; 342, 20; 344, 14; 346, 17, 19; 352, 19); sed loci haud ita pauci eius modi sunt, ut demonstrare uideantur, eum ex ipso W descriptum esse. cuius generis haec adfero:

II p. 172, 21 *AEZ*] om. W in fine uersus, om. p;
p. 200, 5 τέμνουσα] τέμνουσ∞ W, τέμνουσαι p;
p. 208, 23 *NΘ*] W, sed *N* litterae *H* simile, *HΘ* p;
p. 286, 21 τῶν (alt.)] om. W in fine uersus, om. p;
p. 294, 1 κατασκευήν] seq. lacuna, ut uidetur, propter figuram W, lac. p (nihil deesse uidetur);

II p. 306, 2 *A, B*] *AB* | *AB* W, $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\alpha\beta}$ p;
p. 328, 4 *ΑΗΑ*] *Η* litterae *Π* simile W, *ΑΠΑ* p;
p. 340, 16 τὴν *ΑΞ*] τῇ $\overline{\nu\lambda\xi}$ W, τὴν $\overline{\lambda\xi}$ p;
p. 356, 7 καί (pr.)] 'ἔστωσ' καί m. 1 W (h. e. ἔστωσαν ex lin. 6 repeti coeptum, sed deletum), ἔστω^σ^ καί p.

hoc quoque dignum est, quod commemoretur, scripturam II p. 170, 24 a W[1] ex alio codice enotatam etiam in p eodem modo in mg. exstare. cfr. p. 220, 16.

sane constat, p plurimis locis, ne de correctis erroribus dicam, qui ex permutatis uocalibus η et ι, ο et ω orti sunt, meliores scripturas exhibere (II p. 172, 2, 18; 174, 22; 188, 10; 190, 15, 18; 192, 15; 194, 20, 26; 196, 17; 198, 8, 13; 208, 13, 14; 210, 22; 218, 17; 220, 18?; 240, 12, 13, 27; 246, 2; 248, 2, 23; 254, 5, 8; 260, 4, 21; 262, 20, 22, 27; 264, 24; 268, 13; 274, 5; 276, 17; 280, 19; 282, 20; 284, 17, 19; 286, 19; 290, 18; 294, 7; 298, 8, 10; 300, 20; 302, 13; 304, 13, 16; 306, 3, 9; 310, 14, 15; 312, 1, 2; 316, 23; 326, 16; 330, 7; 332, 21; 336, 19; 348, 5, 9; 352, 2, 15; 358, 8, 20; 360, 7). sed harum omnium emendationum nulla est, quae facultatem librarii uerborum rerumque uel mediocriter periti excedat. quare cum librarius codicis p in Apollonio uel emendando uel interpolando et peritiam suam et audaciam ostenderit, ut infra certis documentis arguemus, non dubito haec omnia coniecturae eius tribuere. et hoc aliis rebus confirmatur. nam primum p interdum falsam scripturam codicis W habet postea demum a manu prima correctam (II p. 184, 27; 214, 12; 316, 16; 348, 14; cfr. p. 234, 22;

272, 6; 352, 24). est etiam, ubi errorem subesse perspexerit, sed lacunam reliquerit, quia in eo emendando parum sibi confideret (II p. 244, 10, 13; 248, 6, 9; 322, 13; cfr. p. 182, 25); II p. 296, 6 ei adcidit, ut pro uera scriptura ἡμέραν, quam non intellexit, ἡμε sequente lacuna poneret. locis non paucis interpolatio manifesta est, cum aut errrores recte deprehensos male corrigit (II p. 200, 25; 202, 21; 242, 5; 270, 7, 10; 296, 24; 302, 13; 304, 1, 8; 306, 7; 308, 26; 326, 13; 338, 14; 342, 15; 352, 5) aut scripturam bonam suo arbitrio mutat (II p. 168, 12; 176, 24; 236, 3; 294, 23; 310, 2; cfr. quod II p. 274, 3 γεναμένην in γενομένην corrigit, et quod in uerbo εὑρίσκω semper formas sine augmento praefert, u. II p. 292, 19; 294, 8, 23; 330, 12; 332, 12). II p. 194, 26; 260, 1; 274, 5 cum manu recenti codicis W conspirat.

**adparatus** Ex his omnibus sequitur, in Eutocio edendo codicem W solum auctorem habendum esse. itaque eius discrepantias omnes in adparatu critico dedi. sed cum p tot coniecturas probas habeat, eius quoque scripturam plenam recepi, nisi quod de formis ἐστί et ἐστίν nihil adnotaui; ex ceteris codicibus pauca tantum de Uvw notaui, reliquos prorsus neglexi.

Iam de genere codicis W uideamus. commentaria **Uat. 204** Eutocii in eo excerpta esse e codice Conicorum, ubi in margine adscripta erant, sicut ab initio ab Eutocio ordinatum fuerat, infra exponam; margines huius codicis laceros fuisse, sub finem maxime, ostendunt lacunae plurimae ab ipso librario significatae.

praeterea eum litteris uncialibus scriptum fuisse, adparet ex erroribus, quales sunt II p. 174, 23 ΠΛΕΟΝ

pro ΠΑϹѠΝ, p. 202, 21 ΗΝΕΥΘΥϹΑΝ pro ΗΝΕΥΟΥϹΑ, p. 274, 5 ΚΑΙΑΜΕΤΡΟΝ pro ΔΙΑΜΕΤΡΟΝ. compendiis eum repletum fuisse, colligimus ex his locis:

II p. 186, 7 μέσων] σημείων W permutatis $\overset{\sigma}{\mu}$ et $\overset{\mu}{\sigma}$;
p. 194, 4 *ΒΑ*] βάσις W ($\overline{\beta\alpha}$ et $\overset{\sigma}{\beta\alpha}$);
p. 254, 23 μᾶλλον] ἔστω W permutatis (μα) λλ' et μ;
p. 306, 14 ἀπό] αἵ W non intellecto compendio Α';
cfr. p. 248, 23;
p. 324, 15 ἴσον] ἐν W male intellecto compendio ч;
p. 350, 12 δῆλον] δή W; fuit $\overset{\lambda}{\delta\eta}$;
p. 352, 5 τὸ ὑπό] τοῦ W; fuit το y'.

menda quauis fere pagina obuia, quae e permutatis uocalibus ι et η, ο et ω, ει et η, αι et ε orta sunt, et in litteris figurarum, ubi saepissime permutantur Θ—Ε—Ο—C, Γ—Π—Τ, Α—Δ—Λ, Ν—Η—Μ—Κ, Π—Η, Ξ—Ζ, fortasse ipsi librario codicis W tribuenda sunt.

De editionibus Eutocii breuis esse possum.

Commandinus codice Urbin. 73 usus est, nec dubito, quin eius sint emendationes margini illius a manu 2 adscriptae; u. II p. 168, 20 ὀρθήν] Urbin., mg. m. 2 „for. γωνίαν πλευρᾶς"; haec uocabula addidit Commandinus fol. 4ᵘ; II p. 170, 18 γραμμῶν] Urbin., mg. m. 2 „for. τομῶν"; sectionum Commandinus fol. 4ᵘ; II p. 306, 2 *Α, Β*] $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\alpha\beta}$ Urbin., mg. m. 2 $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\gamma\delta}$; *ab, cd* Commandinus fol. 54ᵘ; cfr. II p. 180, 13; 256, 11. Commandinus

Halleius, qui adhuc solus Eutocium Graece edidit, codice usus est Barocciano Bibliothecae Bodleianae (praef. p. 2). is ubi hodie lateat, nescio; sed eum Halley

ex Urbin. 73 descriptum fuisse, constat his locis collatis:

II p. 174, 23 *ἐπὶ πασῶν*] *ἐπὶ πλέον* Urbin., mg. m. 2 „for. *ἐπὶ πάντων*“, et sic Halleius uitio non intellecto;

II p. 202, 23 *μένον*] Urbin., mg. m. 2 „for. hic addenda sunt ut inferius *πρὸς τῆς κορυφῆς τῆς ἐπιφανείας*“; *μένον πρὸς τῇ κορυφῇ τῆς ἐπιφανείας* Halley;

II p. 274, 10 *νδ'*] Urbin., *νγ'* m. 2; et ita Command., Halley;

II p. 288, 3 *νδ' καὶ νε'*] Urbin., *νγ'* m. 2, Comm., Halley;

II p. 288, 4 *νϛ' καὶ νζ' καὶ νη'*] Urbin., *νδ'* m. 2, Comm., Halley;

II p. 288, 5 *νθ'*] Urbin., *νε'* m. 2, Comm., Halley;

II p. 288, 6 *ξ'*] Urbin., *νϛ'* m. 2, Comm., Halley;

II p. 326, 13 *ΗΘ καί*] *ἡ θκ* Urbin., *ΘΗ* m. 2, Halley.

Scribebam Hauniae mense Septembri MDCCCXCII.

**I. L. Heiberg.**

# PROLEGOMENA.

## Cap. I.

### De codicibus Conicorum.

Codices Conicorum mihi innotuerunt hi

1) Cod. Uatican. Gr. 206, de quo u. I p. IV.

2) Cod. Uatican. Gr. 203, bombyc. saec. XIII (cfr. I p. V); continet fol. 1—44 Theodosii sphaerica, de habitationibus, de diebus et noctibus, Autolyci de sphaera mota, de ortu et occasu, Hypsiclis anaphor., Aristarchi de distantiis, fol. 44—55 Eutocii commentarium in conica, omnia manu neglegenti et celeri scripta; deinde manu eleganti et adcurata fol. 56—84 Apollonii Conic. I—IV, fol. 84—90 Sereni de sectione cylindri, fol. 90—98 Sereni de sectione coni; huius operis uersus ultimi tres eadem manu scripti sunt, qua prior pars codicis.

3) Cod. Uatican. 205, chartac. saec. XVI, elegantissime scriptus et magnifice ornatus; continet p. 1—75 Apollonii Conic. I—II (p. 76 uacat), p. 77—141 libb. III—IV (p. 142 uacat), p. 143—168 (a manu uetustiore numerantur 1—26) Sereni de sectione cylindri, p. 169—207 (27—65) Sereni de sectione coni; p. 207 (65) legitur: hoc opus ad huius bibliothecae Palatinae usum ego Ioannes Honorius a Mallia oppido Hydruntinae Dioecesis ortus librorum Graecorum instaurator sic exscribebam anno dñi MDXXXVI Paulo III pont. max.

4) Cod. Uatic. Gr. 1575, chartac. saec. XVI, manu eiusdem Ioannis Hydruntini scriptus; continet fol. 1—131 Apollonii Conic. I—IV, deinde post folium uacuum noua paginarum serie fol. 1—51 Eutocii commentarium.

5) Cod. Cnopolitanus, u. I p. V; continet fol. 1—55^r Theonis comment. in Ptolemaeum, fol. 55^u—180 Pappi comment. in Ptolem. libb. V—VI, fol. 181—258 Procli hypotyposes, fol. 259—281 Ioannis Alexandrini de astrolabio, fol. 283—347 Gemini introductionem, fol. 349—516 Apollonii Conic. I—IV, fol. 517—549

Sereni de sectione cylindri, fol. 549—588 Sereni de sectione coni in fine mutilum (des. in πασῶν p. 76, 15 ed. Halley).

6) Cod. Marcianus Uenet. 518, membran. saec. XV; continet Aeliani hist. animal., Eunapii uitas sophist., deinde fol. 101—149 Apollonii Conic. I—IV, fol. 150—160 Sereni de sectione cylindri, fol. 160—173 Sereni de sectione coni.

7) Cod. Ambrosianus A 101 sup., bombyc. saec. XIV?; continet fol. 1—4 Elem. lib. XIV, fol. 4—5 Elem. lib. XV, fol. 6—7 Marini introduct. in Data, fol. 7—25 Data, fol. 25ᵘ fragmentum apud Hultschium Hero p. 249, 18—252, 22; fol. 26—34 Euclidis optic. recensionem uulgatam, fol. 34ᵘ Damiani optica, fol. 35ᵘ—39 Euclidis catoptrica, fol. 40—86 Apollonii Conic. I—IV, fol. 86—109 Sereni opuscula (fol. 110 uacat), fol. 111—138 Theodosii sphaerica, fol. 138—142 Autolyci de sphaera mota cum scholiis, fol. 142ᵘ—154 Euclidis Phaenomena, fol. 154—158 Theodosii de habitat., fol. 158—174 Theodosii de diebus, fol. 174—179 Aristarchi de distantiis, fol. 180—188 Autolyci de ortu, fol. 188—189 Hypsiclis anaphor., fol. 190—226 Theonis ad προχείρους καν. Ptolemaei.

8) Cod. Mutinensis II D 4, chartac. saec. XV; continet Eutocii commentarium, Apollonii Conic. I—IV, Georgii Gemisti de iis quibus Aristoteles a Platone differt.

In primo folio legitur: *Γεωργίου τοῦ Βάλλα ἐστὶ τὸ βιβλίον* et postea additum *Τοῦ λαμπροτάτου κράντορος Ἀλβέρτου Πίου τὸ βιβλίον*. Parisiis fuit a. 1796—1815.

9) Cod. Taurinensis B I 14, olim C III 25, chartac. saec. XVI; continet fol. 1—106 Apollonii Conic. I—IV, deinde Sereni opuscula et Chemicorum collectionem.

10) Cod. Scorialensis *X*—I—7, chartac. saec. XVI; continet Apollonii Conic. I—IV, Sereni opuscula, Theodosii sphaerica.

11) Cod. Parisinus Gr. 2342; u. I p. V*); continet Euclidis Elementa (ab initio mutila), Data cum Marino, Optica, Damiani Optica, Euclidis Catoptrica (des. fol. 118ʳ, ubi legitur in mg. inf. *μετὰ τὰ κατοπτρικὰ ἐν ἄλλοις βιβλίοις τὰ κωνικὰ τοῦ Ἀπολλωνίου καὶ Σερίνου κωνικὰ καὶ κυλινδρικά*), Theodosii sphaerica, Autolyci de sphaera mota, Euclidis Phaenomena, Theodosii de habitationibus, de diebus, Aristarchi de distantiis, Autolyci de ortu, Hypsiclis Anaphor., deinde fol. 155ᵘ—187

---

*) Errore ibi hunc codicem saeculo XIII tribui; est sine ullo dubio saeculi XIV.

Apollonii Conic. I—IV cum commentario Eutocii in mg. adscripto, fol. 187—200 Sereni de sectione coni, de sectione cylindri (in fine mutilum). fuit Mazarinaeus.

12) Cod. Paris. Gr. 2354, chartac. saec. XVI; continet fol. 1—125 Apollonii Conic. I—IV, deinde Syriani comment. in Metaphysica Aristotelis et de prouidentia. fuit Memmianus.

13) Cod. Paris. Gr. 2355, chartac. saec. XVI; continet Apollonii Conic. I—IV. fuit Colbertinus. fol. 43r legitur: *εἰκάδι ἐλαφηβολιῶνος ἔγραφε Ναγκήλιος ἐν τοῖς Παρισίοις ἔτει τῷ ͵αφνη'*. fol. 71—73r alia manu scripta sunt.

14) Cod. Paris. Gr. 2356, chartac. saec. XVI; continet Apollonii Conic. I—IV. fuit Thuanaeus, deinde Colbertinus.

15) Cod. Paris. Gr. 2357, chartac. saec. XVI; continet fol. 1—87 Apollonii Conic. I—IV, fol. 88—121 Eutocii commentar., fol. 122—170 Sereni opuscula. fuit Mediceus. scriptus manu Ioannis Hydruntini.

16) Cod. Paris. supplem. Gr. 451, chartac. saec. XV; continet fol. 3—45 Theodosii sphaerica, fol. 46—52 Autolyci de sphaera mota (fol. 53 uacat), fol. 54—209 Apollonii Conic. I—IV (fol. 210—213 uacant), fol. 214—246 Eutocii commentar. fol. 1 legitur: Mauritii Brescii ex dono illustris viri Philippi Ptolomaei equitis S. Stephani Senensis. Senis 1. Decemb. 1589.

17) Cod. Uindobonensis suppl. Gr. 9 (63 Kollar), chartac. saec. XVII; continet Apollonii Conic. I—IV, Sereni de sectione cylindri, de sectione coni, Euclidis Catoptrica, problema de duabus mediis proportionalibus, Euclidis Optica, Data, Aristarchi de distantiis, Hypsiclis Anaphor. fuit I. Bullialdi.

18) Cod. Monacensis Gr. 76, chartac. saec. XVI; continet fol. 1—93 Asclepii comment. in Nicomachum, fol. 94—220 Philoponi comment. in Nicomachum, fol. 220—276 Nicomachi Arithmetic., deinde alia manu fol. 277—293 Apollonii Conic. I—IV, fol. 394—418 Sereni de sectione cylindri, fol. 419—453 de sectione coni.

19) Cod. Monac. Gr. 576, chartac. saec. XVI—XVII; continet fol. 1—83 Apollonii Conic. I—IV, fol. 84—100 Sereni de sectione cylindri, fol. 100—124 de sectione coni. „ex bibliotheca civitatis Schweinfurt".

20) Cod. Norimbergensis cent. V app. 6, membranac. saec. XV; continet fol. 1—108 Apollonii Conic. I—IV, fol. 109—128 Sereni de sectione cylindri, fol. 128—156 de sectione coni. fuit Ioannis Regiomontani.

21) Cod. Guelferbytanus Gudianus Gr. 12, chartac. saec. XVI; continet Apollonii Conic. I—IV. fuit Matthaei Macigni.

22) Cod. Berolinensis Meermannianus Gr. 1545, chartac. saec. XVII; continet fol. 1—118r Apollonii Conic. I—IV (fol. 118u—120 uacant), fol. 121—144 Sereni de sectione cylindri, fol. 145—178 de sectione coni.

23) Cod. Bodleianus Canonicianus Gr. 106, chartac. saec. XV; continet Apollonii Conic. I—IV.

24) Cod. Upsalensis 48, chartac. saec. XVI; continet Sereni opuscula, Apollonii Conic. I—IV (omissis demonstrationibus). fuit Conradi Dasypodii.

25) Cod. Upsalensis 50, chartac. saec. XVI; continet Marini introductionem ad Data, Apollonii Conic. I—IV, Sereni de sectione coni, de sectione cylindri. scriptus manu Sebastiani Miegii amici Dasypodii.

Cod. Paris. Gr. 2471, chartac. saec. XVI, Mazarinaeus, qui in catalogo impresso bibliothecae Parisiensis commemoratur, nunc non exstat.*) codicem Paris. supplem. Gr. 869 chartac. saec. XVIII, qui a fol. 114 „notas in Apollonium Pergaeum" continet, non uidi. cod. Barberin. II, 58 chartac. saec. XVI in fol. 64—68 continet Conic. III, 1—6 et partem propositionis 7. de cod. Magliabecchiano XI, 7 (chartac. saec. XVI) nihil notaui; continet Conic. I—IV. cod. Magliabecch. XI, 26 saec. XVI praeter Philoponum in Nicomachum figuras aliquot continet e codd. Graecis Eutocii et Apollonii excerptas. cod. Ambrosianus A 230 inf. interpretationem Latinam Apollonii et Eutocii continet, de quo in pag. 1 haec leguntur: Conica Apollonii studio Federici Commandini latinitate donata et commentariis aucta ipsamet quae typis mandata sunt multis in locis in margine manu ipsius Commandini notata Illustrissimo Federico Cardinali amplissimo Borromaeo grati animi ergo in suam Ambrosianam bibliothecam reponenda, quo etiam carissimum affinem perennet, Mutius Oddus Urbinas consecrat. denique cod. Upsal. 56 interpretationem latinam continet Conicorum „Londini Gothorum a Nicolao Schenmark a die XXIX Iulii ad diem XIII Sept. 1762 spatio XL dierum" ad editionem Halleii factam (habet praeter Conic. I—VII etiam octaui restitutionem Halleianam).

*) Quo peruenerit codex a Constantino Palaeocappa Parisiis descriptus (Omont, Catalogue des mss. gr. copiés par Palæocappa, Paris 1886, p. 6), nescio.

codicum illorum XXV contuli totos codd. 1, 5, 11, ceteros ipse inspexi praeter codd. 6, 9, 21, de quibus quae cognoui beneuolentiae uirorum doctorum debeo, qui bibliothecis Marcianae, Taurinensi, Guelferbytanae praepositi sunt. iam de cognatione horum codicum uideamus.

primum cod. 2 a V pendere, certissimo documento adparet Uat. 203
ex figura II, 32 p. 248; ibi enim in hyperbola *AB* in cod. 2 ante *A* adpositum est *N*, quod hic nullum habet locum; neque enim omnino eo loco figurae littera opus est, neque, si maxime opus esset, *N* esse debuit, sed *M*. origo huius erroris statim e V manifesta est; ibi enim figura illa ita in mg. descripta est, ut in uerba Apollonii transeat et terminus superior hyperbolae *AB* ante litteram *ν* in *τῶν* p. 248, 10 fortuito cadat; unde littera *N* in figuram irrepsit. quamquam iam hoc sufficit ad demonstrandum, quod uolumus, alia quoque documenta adferam. nam I p. 8, 5 pro *πρός* hab. *πρὸς ἡ* cod. 2 (*ἡ* postea deletum), quod e fortuita illa lineola codicis V, de qua u. adn. crit., ortum est. I p. 376, 6: *ΑΞΖ*] corr. ex *ΑΞΘ*, ita ut *Θ* non prorsus deleta sit, V; *ΑΞΘΖ* cod. 2. I p. 390, 6: *ΗΞ*] corr. ex *ΗΓ* littera *ξ* ad *Γ* adiuncta V, *ΗΓΞ* cod. 2. et omnino etiam apertissimi errores codicis V fere omnes in cod. 2 reperiuntur, uelut dittographia I p. 214, 5. aliquid tamen ad recensionem utile inde peti posse, explicaui I p. V.

cum in cod. 3 eadem prorsus ratio sit figurae II, 32 atque Uat. 205
in cod. 2, is quoque a V pendet; et eum ex ipso V, non e cod. 2, descriptum esse, hi maxime loci ostendunt:

notam I p. 267 adn. e V adlatam etiam cod. 3 habet, in cod. 2 contra omissa est et figurae suo loco repositae.

I p. 448, 17: *ΘΔ*] *Δδ* V, *Δ* seq. lac. 1 litt. cod. 2, *ΑΔ* cod. 3. itaque librarium cod. 3 ratio figurae in V in eundem errorem induxit. ceterum Ioannes Hydruntinus, qui et hunc cod. et cod. 4 et 15 scripsit, ab a. 1535 ad a. 1550 munus „instauratoris" librorum Graecorum apud papam obtinuit, ut adparet ex iis, quae de salario ei numerato collegit Müntz La Bibliothèque du Vatican au XVI^e^ siècle p. 101—104. itaque cum cod. V pessime habitus sit (I p. IV), ne usu periret, eum pro suo munere descripsisse putandus est. et hoc est „apographum" illud, quod in notis in V mg. manu recenti adscriptis citatur, uelut I p. 2, 15 *διὰ τὸ πρὸς εὔπλῳ κτλ. ἐξ ἀπογράφου εἰκονικοῦ* (h. e. adcurati, fidelis); nam ita cod. 3 (*ἔκπλῳ* rectius cod. 2); cfr. praeterea in Sereno (ed. Halley):

p. 14, 34: *ZM*] *ΘM* V, *M* euan.; „ἡ *ΘN* in apographo" mg. m. rec.; *ΘM* cod. 2, *ΘN* cod. 3;

p. 64, 40: ἡ *ZE* τῆς *EΘ*] V, cod. 2; „ἡ *EZ* τῆς *EΘ* sic in apographo" mg. m. rec. V, ἡ *EZ* τῆς *EΘ* cod. 3;

p. 71, 6: ὅτι] τι V, „ἔτι in apographo. puto igitur ὅτι $\overset{\tau}{M}$" mg. m. rec.; ὅτι cod. 2 (*o* in ras. m. 1), ἔτι cod. 3;

p. 83, 9: ὃ προέκειτο] cod. 2; κειτο post lacunam V, „puto deesse ὃ προ" mg. m. rec.; προέκειτο post lacunam cod. 3. adparet, correctorem ita scripturum non fuisse, si cod. 2 inspexisset; nam per uocabulum „puto" suam significat coniecturam, uelut p. 75, 48: ὁ κέντρῳ]· ᾧ κέντρῳ V, mg. m. rec. „$\overset{\tau}{M}$ † puto ὁ κέντρῳ sic infra [h. e. p. 76, 3] in repetitione".

his notis, quas manus recens partim Graece partim Latine in mg. codicis V adscripsit, saepius, ut uidimus, praemittitur $\overset{\tau}{M}$, h. e. monogramma Matthaei Devarii (u. Nolhac La bibliothèque de F. Orsini p. 161), qui ab a. 1541 in bibliotheca Uaticana „emendator librorum Graecorum" fuit (u. Müntz l. c. p. 99). ei igitur tribuendum, quicquid manu recenti in V adscriptum est.

Uat. 1575 etiam cod. 4 ex ipso V descriptus est; nam et littera *N* in figura II, 32 addita a V pendere arguitur, et eum neque e cod. 2 neque e cod. 3 descriptum esse ostendunt scripturae I p. 376, 6: *ΑΞZ*] *ΑΞΘZ* cod 4, *ΑΞZ* cod. 3 et corr. ex *ΑΞΘ* V; *ΑΞΘZ* cod. 2; I p. 310, 13: *KZ*] corr. ex *KH* V, *KHZ* cod. 2, *KZ* cod. 4. nec aliter exspectandum erat, quippe qui a Ioanne Hydruntino scriptus sit sicut cod. 3. ceterum cod. 4 cum bibliotheca Columnensi in Uaticanam peruenit.

Paris. 2357 cod. 15 ab eodem Ioanne Hydruntino scriptus et ipse e V descriptus est. nam quamquam hic *N* in figura II, 32 omissum est, tamen in erroribus omnibus cum V ita conspirat, ut de eorum necessitudine dubitari nequeat; et hoc per se uerisimile erat propter Ioannem Hydruntinum librarium. eum a codd. 2, 3, 4 originem non ducere ostendit uel ipsa omissio litterae *N*, confirmant alia, uelut quod titulus libelli περὶ κυλίνδρου τομῆς hic est: Σερήνου περὶ κυλίνδρου τομῆς; ita enim V, cod. 3 uero: Σερήνου Ἀντινσέως φιλοσόφου περὶ κυλίνδρου τομῆς, e subscriptione codicis V petita; cod. 4 Serenum non habet. nec a cod. 2 pendet; nam I p. 4, 27 recte κρίνειν habet, non κρύπτειν ut cod. 2.

hic codex quoniam Mediceus est, a. 1550 a Petro Strozzi

in Galliam cum ceteris codd. Nicolai Ridolfi Cardinalis adlatus est. ibi statim ex eo descriptus est cod. 14. is enim Paris. 2356
fol. 135r (ad finem Conicorum) et fol. 137 haec habet: „perlectum Aureliae 15 Martii 1551“, scripta*) manu Petri Montaurei mathematici Aurelianensis (u. Cuissard L'étude du Grec à Orléans p. 111), qui sine dubio eo ipso anno codicem suum in usum describi iussit et descriptum perlegit emendauitque, ut solebat. cod. 14 e cod. 15 descriptum esse ex his locis colligo: I p. 6, 15: τε] om. codd. 14, 15 soli (praeter cod. 13, de quo mox dicam), I p. 218, 5: τούτου] τούτων cod. 14 (et 13), quia του$^{τ'}$ cod. 15 (ita etiam praeter V codd. 2, 3, 4, sed inde cod. 14 descriptus esse non potest, quoniam in fig. II, 32 *N* non habet).

Montaureus plurimis locis in mg. et emendationes et adnotationes suas addidit, quarum speciminis causa nonnullas adferam:

1) ad I def. 6 mg. *περὶ τῶν ἀντικειμένων ἐν τῷ ιϛ' τοῦ α' περὶ τῆς ἐλλείψεως ἐν τῷ με' τοῦ β' πρὸς τῷ τέλει.*

2) I, 5 p. 20, 1 mg. *λείπει· ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΚΖΗ· ἀλλὰ τὸ ὑπὸ τῶν ΕΖΔ τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΔΖ, ΖΕ ἴσον.* deinde deleta: *ἡ γὰρ ὑπὸ ΗΘΚ κτλ.*

3) I, 22 p. 76, 8 post *Γ, Δ* inseruit mg. *μὴ συμπίπτουσα τῇ διαμέτρῳ ἐντός.*

4) I, 33 p. 98, 25 post *καταχθῇ* mg. *εὐθεῖα.*

5) I, 39 p. 120, 9 post *καί* mg. *ἐκ τοῦ ὃν ἔχει.*

6) I, 41 p. 128, 9 post *ΔΗ* mg. *τὸ ἄρα ἀπὸ ΔΕ εἶδος τὸ ὅμοιον τῷ ΑΖ.*

7) I, 45 p. 138, 2 post *ΓΔ* mg. *ἐπὶ τὴν δευτέραν διάμετρον.*

8) I, 45 p. 136, 17: *ὑπ' αὐτῶν δι' οὗ ἀποτέμνει τριγώνου ἡ κατηγμένη πρὸς τῷ κέντρῳ ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς μεῖζον* cod. 14, Montaureus deletis *δι'* et *ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς* post *αὐτῶν* mg. inseruit *τρίγωνον ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς.*

9) I, 54 p. 168, 29 mg. addit *τέτμηται ἄρα ἐπιπέδῳ ὀρθῷ πρὸς τὸ ΖΗΘ τρίγωνον καὶ ποιεῖ τομὴν τὸν ΗΠΘΡ κύκλον;* p. 170, 3 post *ὑποκειμένῳ* mg. add. *τέμνοντι τὴν βάσιν τοῦ κώνου.*

10) I, 55 p. 172, 22 mg. *λείπει· καὶ δυνήσονται τὰ παρὰ τὴν ΑΝ παρακείμενα ὀρθογώνια.*

11) I, 56 p. 180, 5—6: *ΒΕ πρὸς ΕΖ ἡ ΒΚ πρὸς ΚΘ* cod. 14,

---

*) Teste Henrico Omont, uiro harum rerum peritissimo.

mg. m. 1: *καὶ τοῦ τῆς ΑΕ πρὸς ΕΖ ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΒΕ πρὸς ΕΖ*, Montaureus deletis *ἡ ΒΚ πρὸς ΚΘ* mg. add. *ἡ ΒΚ πρὸς ΚΘ τουτέστιν ἡ ΖΛ πρὸς ΛΘ.*

12) Ad II, 13 mg. „*παράδοξον* Proclus in fine li. 2 commentariorum in 1. Euclidis".

13) II, 16 p. 220, 20—22: *τὸ μὲν ὑπὸ ΚΛΘ τῷ ὑπὸ* (*ἀπὸ* m. 2) *ΘΜΗ ἐστιν ἴσον καὶ ἡ ΛΘ τῇ ΚΜ* cod. 14, mg. m. 2: *λείπει· ΑΓ τὸ δὲ ὑπὸ ΘΜΗ τῷ ἀπὸ ΓΒ ὥστε τὸ ὑπὸ τῶν ΚΛΘ ἴσον ἔσται τῷ ὑπὸ τῶν ΘΜΚ καὶ ἡ ΛΘ τῇ ΚΜ ἴση* deletis uerbis *ΘΜΗ ἐστιν ἴσον.*

Paris. 2355 Hae correctiones notaeque Montaurei omnes fere in cod. 13 receptae sunt, unde adparet, eum e cod. 14 descriptum esse. et concordant temporum rationes. nam cod. 13 Petri Rami fuit — nomen eius in prima pagina legitur —, qui ipse Petrum Montaureum magistrum suum in mathematicis praedicat et inter mathematicos Graecos, ad quorum studium se adcingebat, Apollonium nominat (Waddington Ramus p. 108). de eo Nancelius, scriptor librarius codicis 13, in epistula I, 61 (p. 211 ed. Paris. 1603) ad Scaligerum haec narrat: „ipsi illi multa Graeca exemplaria mea manu perdius ac pernox exscripsi, quorum ille sibi copiam Roma e Vaticano et ex bibliotheca regia et Medicaea per reginam regum nostrorum matrem fieri sedulo satagebat et per alios utique viros *φιλομαθεῖς*". in mg. a Nancelio saepius „exemplar reginae" citatur, uelut I p. 6, 27 *τῆς γραμμῆς*] *τῆς καμπύλης γραμμῆς* cod. 13, mg. hoc vocabulum non est in exemplari reginae, p. 8, 13 post *ἑτέρᾳ* supra scr. m. 1 *διαμέτρῳ* cod. 13, mg. hoc vocabulum in exemplari reginae non reperitur, p. 8, 23 *κορυφῆς* del. m. 1 cod. 13, mg. hoc uerbum est in exemplari reginae. sine dubio „exemplar reginae" est ipse cod. 15; nam codices Petri Strozzi ad Catharinam de Medicis reginam post mortem eius peruenerunt. ex eodem codice illas quoque scripturas petiuit Nancelius, quas addito uocabulo „alias" in mg. adfert, uelut I p. 10, 1 *καὶ ἔστω*] om. cod. 13, mg. alias adduntur *καὶ ἔστω*, p. 220, 21 *ὥστε τὸ ὑπὸ ΚΛΘ ἴσον ἔσται τῷ ὑπὸ τῶν ΘΜΚ καὶ ἡ ΛΘ τῇ ΚΜ ἴση ΘΜΚ ἐστιν ἴσον καὶ ἡ ΛΘ τῇ ΚΜ* cod. 13 cum Montaureo (u. supra), quem non intellexit; mg. alias ita legitur *ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ ΚΛΘ τῷ ὑπὸ ΘΜΚ ἐστιν ἴσον καὶ ἡ ΛΘ τῇ ΚΜ.*

Marc. 518 Ex ipso V praeterea descriptus est cod. 6; nam in fig. II, 32 habet *N* et in praefatione libri primi lacunas tres habet (p. 2, 15

ἔκ — om., οὐ διακα — om., p. 2, 16 ὡς ἔσχατον om.) propter litteras in V detritas, quae in antiquioribus apographis eius seruatae sunt. in cod. 6 propter litteras paululum deformatas in V pro κρίνειν p. 4, 27 scriptum est κρίπτειν. eundem errorem habent codd. 17, 18, 22, qui ea re a cod. 6 pendere arguuntur. praeterea cod. 22 et p. 2, 15—16 easdem lacunas Berol. 1515
habet et uerba p. 8, 12 ὧν — 13 ἑτέρᾳ cum cod. 6 solo bis scripsit. et cum sit Meermannianus, per complurium manus e bibliotheca profectus est Guillelmi Pellicier, qui omnes fere codices suos Uenetiis describendos curauerat. etiam cod. 17 Uindob.
easdem lacunas illas habet, sed expletas a manu recenti, quae suppl. 9
eadem κρίπτειν in κρίνειν correxit et alias coniecturas adscripsit, uelut p. 4, 10 παράδοξα] mg. παντοῖα, p. 4, 12 καὶ κάλλιστα] mg. καλὰ καί, p. 4, 21 συμβάλλουσι] mut. in συμβάλλει, mg. καὶ ἀντικείμεναι ἀντικειμέναις κατὰ πόσα σημεῖα συμβάλλουσι; sine dubio ipsius Bullialdi est. hunc codicem Uenetiis scriptum esse, docet, quod problema illud de duabus mediis proportionalibus e Marc. 301 sumpsit. Sereni libellus de sectione coni falso inscribitur Σερήνου Ἀντινσέως φιλοσόφου περὶ κώνου τομῆς β′, quia in cod. 6, ubi inscriptio est περὶ κυλίνδρου τομῆς β′, supra κυλίνδρου scriptum est κώνου numero β′ recte deleto, quod non animaduertit librarius codicis 17. cod. 18 lacunas habet postea expletas; uersus Monac. 76
finem libelli de sectione cylindri habet: „ἐνταῦθα δοκεῖ ἐκλείπειν καὶ μὴ ἀκολουθεῖν τὸ ἑπόμενον. sic videtur aliquid deesse“, quae uerba hic in cod. 6 adscripsit Bessarion (ἐλλείπειν pro ἐκλείπειν, hic videtur aliquid deficere; Latina etiam cod. 22 hoc loco habet prorsus ut Bessarion); in fine libelli de sectione coni addidit in cod. 6 Bessarion: οὐχ εὕρηται πλέον; eadem eodem loco habent codd. 18 et 22.

praeterea e cod. 6 descriptus est cod. 10; nam et lacunas Scorial.
p. 2, 15—16 habet et post Serenum notas Bessarionis (ἐνταυθα X—I—7
δοκεῖ ἐλλείποι καὶ μὴ ἀκολουθεῖν τὸ ἑπόμενον, οὐχ εὕρηται πλέον). et Diegi de Mendoza fuit (Graux Fonds Grec d'Escurial p. 268), quem constat bibliothecam suam apographis Marcianis impleuisse.

pergamus in propagine codicis V enumeranda. cod. 16, Paris. suppl.
cum p. 2, 15 πρὸς ἔκπλῳ et οὐ διακα-, p. 2, 17 ἔσχατον ἐπε- gr. 451
postea in spatio uacuo inserta habeat, necesse est e V, in quo litterae illae euanuerunt, originem ducere siue ipso siue per apographum. de cod. 6 intermedio cogitari non potest, quia

in eo priore loco non πρὸς ἔκπλῳ, sed ἐκ- tantum omissum est, tertio non ἔσχατον ἐπε-, sed ὡς ἔσχατον. p. 2, 15 post lacunam alteram in cod. 16 legitur θάρανες (corr. m. 2) et p. 4, 25 post δέ additur περί. iam cum eaedem scripturae in cod. 20 inueniantur, inter V et codd. 16, 20 unum saltim apographum intercedit; neque enim alter ex altero descriptus esse potest, quia cod. 20 p. 2, 15 ἐκ- solum omittit et p. 2, 17 pro ἔσχατον ἐπελευσόμενοι habet ἔδια τὸν ἐτελευσόμενοι; praeterea in cod. 16 opuscula Sereni inscriptione carent, in cod. 20 uero inscribuntur σερήνῃ περὶ κυλίνδρου τομῆς et σερήνου ἀντινσέως φιλοσόφου περὶ κυλίνδρου τομῆς. hinc simul adparet,
Norimb. cent. V app. 6 cod. 20 e cod. 6 descriptum non esse, quod exspectaueris, quia Regiomontani fuit; ibi enim libelli illi inscribuntur σερήνου ἀντινσέως φιλοσόφου περὶ κυλίνδρου τομῆς $\overline{\alpha}^{ov}$ et σερήνου ἀντινσέως φιλοσόφου περὶ κυλίνδρου (κώνου Bessarion) τομῆς $\overline{\beta}^{ov}$ (del. Bessarion); in V prior libellus inscribitur σερήνου περὶ κυλίνδρου τομῆς, alter inscriptionem non habet, sed in fine prioris legitur σερήνου ἀντισσέως φιλοσόφου περὶ κυλίνδρου τομῆς: —, quam subscriptionem in titulum alterius operis mutauit manus recens addito in fine τὸ $\overline{\beta}$ et ante eam inserto τέλος τοῦ $\overline{\alpha}$. cum cod. 20 arta necessitudine coniunctum esse
Taur. B I 14 cod. 9, inde adparet, quod p. 2, 17 ἔδια τὸν ἐτελουσόμενοι praebet (p. 2, 15 ἐκ- et οὐ διακα- in lacuna om.), sed cum p. 4, 25 περί non habeat, neuter ex altero descriptus est; praeterea p. 4, 13 pro συνείδομεν cod. 9 συνοί habet.

nihil igitur relinquitur, nisi ut putemus, codd. 9, 16, 20 ex eodem apographo codicis V descriptos esse, in quo a principio omissa essent p. 2, 15 πρὸς ἔκπλῳ et οὐ διακα-, p. 2, 17 ἔσχατον ἐπε- et p. 4, 25 in mg. adscriptum περί, postea p. 2, 15 πρὸς πλω et p. 2, 17 errore legendi ἔδια τὸν ἐτε- suppleta, fortasse ex ipso V.

Monac. 576 Upsal. 48 apographa codicis 20 sunt codd. 19 et 24, ut hae scripturae ostendunt: p. 2, 4 ἔχοι] ἔχει 19, 20, 24; p. 2, 8 εὐαρεστήσωμεν] εὐαρεστήσομεν 19, 20, 24; p. 2, 15 οὐ διακαθάραντες] θάρανες 19, 20, 24; p. 2, 17 ἔσχατον ἐπελευσόμενοι] ἔδια (α ita scriptum, ut litterae ω simile fiat) τὸν ἐτελευσόμενοι 20, ἔδιω τὸν ἐτελευσόμενοι 19, 24; p. 4, 6 ἄξονας] ἄξωνας 19, 20, 24; p. 4, 25 δέ] δὲ περί 19, 20, 24. neutrum enim ex altero descriptum esse, hi loci demonstrant: p. 4, 5 τάς] τούς compendio 19, 20, τάς corr. ex τοῦ uel τῶν 24; p. 4, 9 καλῶ] 19, καλῶ seq. ras. 1 litt. 20, καλῶς 24; p. 4, 11 τε] 19, 20,

δέ 24; p. 4, 13 συνειδόμεν] 24, συνείδαμεν 19, 20; p. 4, 16 ἄνευ] 24 et litteris ε, υ ligatis 20, ἄνα 19; p. 6, 7 ὅθεν] 19, 20, ὅταν 24; p. 6, 26 εὐθείᾳ] 19, om. in extremo uersu 20, sed addidit mg. m. 1, εὐθεία mg. 24.

denique ex ipso V descriptus esse uidetur cod. Uindobon. suppl. gr. 36 (64 Kollar), chartac. saec. XV, qui priores tantum duos libros Conicorum continet (fuit comitis Hohendorf); neque enim in fig. II, 32 *N* litteram habet, et a V eum pendere ostendunt scripturae p. 2, 15 εὔπλῳ, p. 226, 6 τό] om. Uindob. et in extremo uersu V. lacunas p. 2 non habet, p. 2, 12 ὂν δέ pro ὅν. ceterum nihil de eo mihi innotuit.

restant eiusdem classis codd. 8, 12, 21, 23, quos omnes e codice 2 originem ducere ostendit error communis κρύπτειν p. 4, 27; ita enim propter litteras in V, ut dixi, deformatas pro κρίνειν cod. 2 (corr. m. rec.). lacunas p. 2 non habent. utrum omnes ex ipso cod. 2 descripti sint an alius ex alio, pro certo adfirmare non possum; cfr. p. 2, 4 ἔχοι] 2, 8, 12, 23, ἔχει 21; p. 2, 12 ὅν] ὂν δέ 2, 8, 12, 21, 23; ἐσχόλαζε] 2, 8, 12, ἐσχόλαζεν 21, 23; p. 2, 19 συμμεμιχότων] 2, 8, 12, 21, συμμεμιλότων 23; p. 2, 20 καὶ τό] 2, 8, 12, 21, καί 23; p. 4, 1 πέπτωκεν] 8, 12, 23, πέπτωκε 2, 21; p. 4, 4 καί] 2, 12, om. 8, 21, 23; ἐξειργασμένα] 2, 8, 12, 21, ἐξηργασμένα 23; p. 4, 9 εἰδήσεις] 2, 8, 12, 23, εἰδήσις 21; p. 4, 17 σύνθεσιν] 2, 8, 12, 23, θέσιν 21; p. 4, 21 κατά] 2, 8, 12, om. 21, 23; p. 6, 14 τοῦ] 2, 8, 23, τοῦ κέντρου τοῦ 12; p. 8, 10 ἑκάστην] ἑκάστη in extremo uersu 2, ἑκάστη 8, 12, 23; p. 8, 18 συζυγεῖς] 2, 8, 23, συζυγεῖς δέ 12; p. 8, 19 διάμετροι] 2, 12, 23, διάμετρι 8; p. 8, 21 α'] om. 8, α^{ον} 23, θεώρημα α^{ον} 12; p. 10, 9 ἐστί] 2, 8, 23, ἐστίν 12. itaque codd. 8, 12, 23 apographa ipsius cod. 2 uideri possunt, cod. 21 autem fortasse ex cod. 23 pendet. cod. 21 quoniam Matthaei Macigni fuit, sine dubio idem est, quem Tomasinus Bibliotheca Patauina manuscripta p. 115 inter codices Nicolai Triuisani enumerat, cui Macignus mathematicus Uenetus bibliothecam suam legauerat (u. Tomasinus p. 115[2]).

Mutin. II D 4
Paris. 2354
Gud. gr. 12
Canon. 106

codd. denique 7 et 25 e cod. 11 descriptos esse, uel inde adparet, quod hi soli libellum Sereni de sectione coni ante alterum eius opus collocant. cfr. praeterea p. 2, 8 εὐαρεστήσωμεν] 11 supra scripto εὑρω, εὑρωστήσωμεν 7, εὐαρεστήσωμεν (supra scr. εὑρω) 25; p. 2, 12 παραγενηθείς] παραγενόμενος 7, 11, 25; p. 2, 15 ἔκπλῳ] ἔκπλουν 7, 11, 25.

Ambros. A 101 sup.
Upsal. 50

iam de codicibus, qui soli relicti sunt, 5 et 11 uideamus.
Cnopol. c prius e cod. 5 (c) omnes scripturas adferam, quae a V discrepant, melioribus stellula adposita (scholia marginalia non habet):

I p. 2, 15 ἔκπλουν*(?) 19 συμμετεχόντων

p. 4, 1 πεπτωκεν* 6 καί — 7 ἀσυμπτώτους] om. 13 συνείδομεν corr. ex συνείδαμεν 14 Εὐκλείδους e corr. 16 ἄνευ] τὸν ἄνευ 19 καί — 21 συμβάλλουσι] om.

p. 6, 1 πρῶτοι] ᾱ 2 Ἐάν] ἄν

p. 8, 5 πρός 6 ὀρθίαν] θείαν post lac. 21 α′] hab.

p. 10, 15 β′] om. 16 post κατά del. κο 20 Α] πρῶτον 24 Α] πρῶτον

p. 12, 3 Ζ] corr. ex Η 16 περιφέρειαν* 21 γ′ om.

p. 14, 4 ΒΓ] e corr. 13 ἔχον 22 ἔχον 25 συμβαλέτω

p. 16, 4 συμβαλ^λέτω 6 τέμνεται τοῦ] semel* 12 καί — 13 ἀλλήλαις] om. 24 ε′] δ′ mg.

p. 20, 2 τό] τῷ τό] τῷ 8 ς′] om. 14 συμβαλεῖ* τῷ] τῷ τοῦ

p. 22, 15 post ἐπιφανείᾳ del. συμπιπτέτω κατὰ τὸ Η. λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΔΖ τῇ ΖΗ

p. 22, 21 ἀπὸ τοῦ* 26 ζ′] om.

p. 24, 11 οὐκ αἰεί] οὐ καὶ εἰ 28 ΔΖΕ] corr. ex ΔΕ

p. 26, 22 τό] om.

p. 28, 3 τό] semel* 5 τρίγωνον] om. 11 ΗΖ] ΖΗ

p. 30, 5 προσεκβαλεῖται 28 τῆς*

p. 32, 6 τομῆς* 11 ἐκβάληται 15 ΖΘ] ΖΗ 20 ἀπολαμβάνουσα] om.

p. 34. 1 τὴν βάσιν 15 ΖΗ] ΗΖ 17 δή] om. 19 post τό del. τῶν ΚΜ] supra scr. 20 ΒΓ] Β 21 ὁ] hab.* 24 τῷ] corr. ex τό

p. 36, 2 ἡ ὑπό] corr. ex ὑπό 3 ἐστί] om. 7 σημεῖα ἡ] σημεῖ^α ἡ 11 ΒΓ] ΑΓ 12 τό — 13 τομήν] om. 15 τά 23 μή] hab.* νεύει (fort. scrib. οὐ νεύει)

p. 38, 4 ἄν] om. 6 δυνηθήσεται 15 Α] πρῶτον 22 τοῦ] e corr. 24 πεποιήσθω*

p. 40, 1 παράλληλον — 3 ἐπίπεδον] semel* 6 τῷ] corr. ex τό 7 ΘΖ] ΖΘ 14 ΝΑ 15 ΑΜ] ΜΑ η] hab.* 21 ΖΑ] corr. ex ΑΖ

p. 42, 2 ἦν] ὅν 5 ἐάν] ἄν

p. 44, 2 *τέμνουσι*] sic* 14 *δέ*] corr. ex *τε* 15 *ΝΟΞ*] *ΟΞ*

p. 46, 3 *καί* — 4 *ΚΒ*] om. 8 *ΖΛ*] *ΛΖ* 12 *καί* — 13 *ΣΝΡ*] om. 13 *ΖΛ*] *ΛΖ* 19 *τῷ*] *τό* *ΞΝΖ*] *ΞΚΖ* 27 post *ὀρθία* del. *καί*

p. 48, 2 *ἐάν*] *ἄν* 16 *εὐθείαις*] *γωνίαις*

p. 50, 23 *τῶν*] om.

p. 52, 4 *ὁ τοῦ* — 5 *ΠΜΡ*] semel* 15 *εἴδει*] corr. ex *ἤδη* 17 *ἡ δὲ ΕΘ*] om.

p. 54, 2 *μή*] om. 26 *Α* (alt.)] *Η*

p. 56, 8 *τέτμηται* — 12 *τριγώνου*] bis 9 *τοῦ κώνου*] om. priore loco 16 *καί* — 17 *ΕΠ*] semel* 29 *τό*] hab.*

p. 58, 2 *τὸ ὑπό* — 4 *ΒΣΓ*] mg. m. 1 23 *ἐκβεβλήσθω*

p. 60, 9 *Ν*] om. 21 *ΗΞ*] *ΝΞ* 24 *ΓΘ*] *ΓΔ*

p. 64, 7 *συζυγεῖσα* 12 *συζυγεῖσα* 25 *ΒΖ*

p. 66, 3 *ΝΛ* 5 *ΝΛΑ* 10 *ἄρα*] *ἄρα καί* 13 *ΞΓΔ* 14 *συζυγεῖσα* 21 *ἀντικειμένων*

p. 70, 4 *ἐπεί* — 5 *ΕΖ καί*] om. 10 *τῇ τομῇ*] om. 28 *ἐντός*

p. 72, 4 *συμπεσεῖται*] corr. ex *συμπίπτει* 19 *τῷ* — 21 *ΔΖ*] om. 24 *ἀπό*] om.

p. 74, 7 *ἤ* (pr.)] corr. ex *ἡ** 10 *μέν*] hab.* 13 *οὕτως*

p. 76, 8 *τά*] corr. ex *τήν*

p. 78, 3 *διαμέτρων* — 4 *ΓΔ*] bis 4 ante *ἑκατέρᾳ* del. *τῇ* (priore loco) 6 *ΗΕ*] *Ε* e corr. 10 *ἐστι*] sic* 11 *τῆς*] bis 12 *μεῖζον*] om. 13 *ΖΛ*] *ΖΑ* 15 *ΖΛ*] *Λ* e corr. 26 *Ζ*] e corr.

p. 80, 16 *ΗΚ* (pr.)] *ΙΘΚ*

p. 82, 4 *ἀνήχθω*] om. 7 post *τῆς* del. *ἀπό*

p. 86, 2 *τουτέστι* — *ΔΖ*] semel* 21 *ΕΖ*] *ΕΞ*

p. 88, 1 *ΚΛ*] sic* 5 *τό*] e corr. 9 *ΒΗ*] *ΒΝ* 12 *ἀπό* (pr.)] *ὑπό* 21 *εὐθεῖα*] e corr.

p. 90, 2 *ΒΖ*] *Β* 10 *τῷ*] *τό*

p. 92, 6 *ὡς* — *ΗΕ*] om. 11 *ΑΓ*] sic* 21 *τομήν*] *τομὴν ἡ*

p. 94, 2 *Ε*] in ras. *τεταγμένως*] seq. ras. 4 *τῇ*] bis 18 *ἐπειδή* — 19 *πεσεῖται*] om. 23. *κώνου*] *τοῦ κώνου*

p. 96, 17 *ὑπό*] corr. ex *ἀπό*

p. 98, 7 *τῷ*] sic* 16 *ὡς* — 17 *ΘΛ*] om. 26 *πρός*] e corr.

p. 100, 19 *ΑΔ*] *ΔΕ* 20 *τετράκις**

p. 102, 2 *ἡ*] *ἤ* 23 post *ΞΝ* del. *ἴση ἄρα ἐστι* 25 *ἡ ΝΞ**

p. 104, 9 *ὑπό* (alt.)] corr. ex *ἀπό* 11 *ὑπό* (pr.)] *ἀπό* 12 *ΗΘ*] *ΖΘ*, *Θ* e corr. *ὡς* — 13 *ΖΗ*] mg. m. 1

p. 108, 22 *συμπίπτῃ*, -*ῃ* e corr. *τῇ*] e corr. 27 *τοῦ*] sic*

p. 110, 8 *ΕΓ*] *ΓΕ* 16 *ΖΕ*] $\overset{\beta}{E}\overset{\alpha}{Z}$ 23 *τό*] *τῷ*

p. 114, 13 *καί* — 15 *ΗΓ*] om. 17 *ΛΜ*] corr. ex *ΗΜ* 24 *τό*] corr. ex *τῷ* 25 *ὡς* — 26 *ΜΗΛ*] om.

p. 116, 1 *πρὸς τό*] *τῷ* *ἴσον* — 2 *ΗΛ*] om. 14 *τῆς* (alt.)] *τοῦ* 23 *ΗΖ*] *ΖΗ* 26 *ΗΓ*] *ΗΣ* 27 *ΓΖΔ*] *ΓΖΛ* *ἡ ΔΓ* — 28 *ΖΔ*] om. 28 *ΔΘ*] *ΘΔ*

p. 118, 21 *ὅν* (alt.)] *ἥν*

p. 120, 24 *ΘΗ*] corr. ex *Θ*

p. 122, 7 *καὶ ἐκ* — 8 *πρὸς Κ*] om. 15 *ἐν*] om. 21 *τὴν λοιπήν*] sic*

p. 124, 2 post *εἴδει* del. *ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως* 14 ante *καί* del. *τὸ ἀπὸ τῆς ΔΓ* 23 *ἔχει*] om.

p. 126, 8 *ΑΕ*] corr. ex *ΕΑ*

p. 128, 3 *ΑΖ*] sic*

p. 130, 4 *ΔΖ*] corr. ex *ΔΒ* 7 *τό* (pr.)] *τήν*

p. 132, 10 *τῷ*] sic 20 *ΒΓΛ*] corr. ex *ΒΔΓΛ*

p. 134, 14 *ΖΟ*] *ΖΗ* 16 *Ν* (alt.)] *Η*

p. 136, 10 *τῇ δευτέρᾳ*] semel*

p. 138, 1 *Β*] e corr. 3 *ΗΘΖ*] *ΗΘ*

p. 140, 7 *ΒΖΕ*] *Ε* e corr. 8 *ΓΔΛ*] *ΓΔ* 11 *ἁφῆς*] *τομῆς*

p. 144, 19 *ΕΔ*] *Δ* e corr.

p. 146, 5 *τό*] om. 20 *τό*] om.

p. 148, 2 *ΚΠΜ*] *ΚΠΒ* 6 *τοῦ*] *τῇ* 12 *ΓΔΛ*] corr. ex *ΔΛ* 13 *ΚΛΝ*] *ΚΛΜ* 14 *ἴσον* — *ΚΛΝ*] del. m. 1 15 *τῷ* — *ΓΔΛ*] om.

p. 150, 6 *ἁφῆς*] corr. ex *τομῆς* m. 1 21 *ΖΕ*] *ΗΞΕ* *ΕΗ*] *Η* 28 *ΓΚ*] corr. ex *ΚΓ*

p. 152, 2 *ἐστι** 6 *τοῦ*] *τῇ τριγώνῳ* 10 *ΝΡΞΜ*, sed corr. 18 *συναμφότερος*] *συναμ* 24 *ὑπό*] mg. m. 1

p. 156, 3 *ΒΛΗ*] *Λ* e corr. 4 *Κ*] *Η*? 13 *ΑΞΝ*] *ΑΗΞ* 20 *ΑΖ*] *ΑΒ* 22 *ἡ Κ** 26 *Ζ*] *ἑβδόμῳ*

p. 160, 7 *ἀνάλογος* 9 *τετραπλασία* — 11 *ἥ*] om. 21 *δέ*] *δή* 22 *ΚΛ*] e corr. 25 *ΜΝ*] corr. ex *ΜΗ*

p. 162, 11 *τριγώνου*] om.

p. 164, 6 *ἀπό*] *ὑπό* 12 *ΛΚΜ*] $\overset{\beta}{K}\overset{\alpha}{\Lambda}M$ 25 *δή*] postea ins. m. 1

p. 166, 2 δύο] postea ins. δοθεισῶν] e corr. 8 ἀπό] ἐπί

p. 168, 4 τὸ Α] postea ins. 14 ΖΞ] corr. ex Ξ 16 διάμετρος; deinde del. κῶνος

p. 170, 21 τόν] bis

β α

p. 172, 2 δεδο¨μένη 9 ΑΖΔ] ΑΔΖ

p. 174, 2*) μέν] e corr. 13 ΓΑ] Α e corr. 15 πρὸς ΗΔ] om. κοινός] e corr. 19 ΓΑ] Α e corr.

p. 176, 27 ΔΕ] ΔΗ 29 δή] δέ

p. 178, 2 τῇ — 3 γωνίᾳ] om. 4 ΖΒΔ] Β e corr. 13 ΗΘΝ] ΗΘΚ, Κ e corr. 19 ἡ] postea ins. ἄρα] postea ins. 20 ΚΗ] ΚΝ 26 ΖΘ] Ζ postea ins.

p. 180, 4 τὸ δέ — 5 ΕΖ] om. 18 περί] sic* 25 μείζων — ΖΗ] mg. m. 1 26 ἀπό] sic*

p. 182, 3 ΖΔ] ΖΑ 18 ἔστω] ἔστι

p. 184, 15 ΗΕ — 16 πρός] om.

p. 186, 5 post ΒΘ del. ὥστε τὰς καταγομένας κατάγεσθαι ἐν γωνίᾳ 6 δή] sic* 20 αἱ] lac. 2 litt.

p. 188, 9 τῷ] corr. ex τό 10 ἔσται 18 δή] ins. m. 1

p. 190, 2 ΖΑΗ] Α e corr.

πο

p. 192 Ἀπολλωνίου κωνικῶν α̅ 5 πέμφα 6 σοι] postea ins. 11 αὐτῶ 14 ἀπολειφθῇ

p. 194, 7 ΓΒ] corr. ex ΒΓ 25 καὶ αἱ — 26 παράλληλοι] om.

p. 196, 2 ΔΕ] Ε e corr. 9 post ΑΚ ins. ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΔ τὸ ὑπὸ ΑΔΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΚ 15 ΜΚΗ] ΜΚ ἤ

p. 200, 8 ἐπιζευχθεῖσα* 12 Η ὑ-] e corr. 22 τέμνῃ] corr. ex τέμνει ἡ] ἤ

p. 202, 9 ἡ] ἤ 13 ἥ] η 18 ΓΔ] sic 24 ΗΕ] ΕΗ

p. 204, 13 ἀλλ'

p. 208, 10 ὑπό] corr. ex ὁπό 17 — mg. 18 ΘΗΒ] ΘΒΗ

p. 210, 3 ΖΑΔ] corr. ex ΖΔΑ 6 ΖΑΔ] Α e corr. 20 ΓΑΔ] corr. ex ΑΓΔ

p. 212, 2 ΒΑ] corr. ex ΒΔ 17 ἀχθῶσιν] sic*

p. 214, 5 ὑπὸ ΑΔΓ] sic* 15 μόνον] bis 16 ΓΑ] sic*

p. 216, 3 Μ] corr. ex Β 5 καί (pr.)] om. 15 δέ] om. 17 ἀφέξονται 19 ΑΘ] ΕΘ 21 ΔΗ] Η e corr.

---

*) Ubi in V error a prima manu correctus est, plerumque de c nihil notaui, si cum V correcto concordat.

p. 222, 5 τοῦ] bis 15 ἐάν] ἐὰν ἐν
p. 224, 25 ἡ (alt.)] sic* 27 κατά] sic*
p. 226, 1 δέ] om. 6 τό] postea ins. 9 ἐστιν] sic* 20 καί — ΚΕ] om.
p. 228, 6 ΔΗΘ] corr. ex ΔΘΗ 10 πεποιήσθω] sic* 16 τῆς] om. 22 ΓΧ] ΧΓ 24 τὸ ΗΘΧ] e corr.
p. 230, 11 ΕΧ] ΧΕ 13 ΕΧ] ΧΕ 14 ΗΟ] corr. ex Ο 18 ΗΟ] Η
p. 232, 4 τοῦ] sic* 5 τῇ] τῷ 24 ἄρα] ἄρα ἡ
p. 234, 24 συμπτώσεως, sed corr.
p. 238, 5 ΕΖ] ΕΞ 13 τῆς] om.
p. 240, 2 ἐστιν] corr. ex ἐστη 15 ἐν] om.
p. 242, 10 ἡ] e corr.
p. 246, 17 ΘΚ] ΚΘ 26 ἔστωσαν — p. 248, 2 γωνίας] om.
p. 248, 4 ἀσυμμτώτοις, sed corr. 5 Θ, Η] Η, Θ 16 Β] Β, Γ
p. 250, 10 τις] corr. ex τι 17 τό] sic* 20 ΓΔ — 22 τῇ] om.
p. 252, 6 παράλληλος — 8 τομῆς] bis 14 ἐν] om.
p. 254, 19 Ζ] Η
p. 256, 6 ΧΔ] ΓΔ 9 κέντρον] κέντρον ἀγομένη 16 καὶ τάς — 17 τέμνει] mg. m. 1 19 ΓΖΔ] ΖΔ corr. ex Δ
p. 258, 14 ἐφάπτονται] sic* 24 ἐφάπτωνται, sed corr. m. 1
p. 260, 9 Β] δευτέρας
p. 262, 2 τέμνουσιν 9 ἀλλήλαις
p. 266, 26 ἄρα] δὲ ἄρα παρά] e corr.
p. 268, 13 εὕρηται
p. 272, 2 τά] sic* 10 καί] om. 12 τῷ — 13 ΡΚ] om. 18 ἐστιν ἴσα] om. 17 ἔστι — 18 ΚΜ] bis
p. 274, 13 ἐκτός] ἐντός
p. 276, 10 Γ] corr. ex Α 21 ΑΓ] ΓΑ 22 ΔΒΓ] ΒΔΓ corr. ex ΒΓ ΔΓ 28 ΖΘΕ] corr. ex ΘΕ
p. 278, 14 τῷ] corr. ex τό 23 ἐστίν] om. 26 πεποιείσθω
p. 280, 9 καὶ τῆς] sic*
p. 282, 4 τήν] τοῦ 5 ἦκται] om. 11 ΖΘ] corr. ex ΘΖ 24 ΘΕ] ΘΕΒ
p. 284, 14 ΗΒ] ἡ Β 29 ΒΓ] Β postea ins. m. 1
p. 286, 14 ante γεγονέτω del. καί
p. 288, 9 ΒΓ] Β 15 ἡ δοθεῖσα] om. 20 ΗΘΕ] Ε post lac. 2 litt. 24 ΕΖΗ] Η supra scr. m. 1
p. 290, 1 ἴση] sic* 10 τῆς] om.

p. 292, 20 *AZ*] sic* 28 *EΓ* — p. 294, 2 *ἀπό*] om.

p. 294, 8 *KM* — 9 *HK πρός*] om. 18 *τοῦ*] *τῶν*

p. 296, 2 *ἤ*] om. 8 *γωνία*] om. 9 *καί* (pr.)] supra scr. m. 1

p. 298, 28 *ET*] *EΓ*

p. 300, 14 *ἀπό*] corr. ex *ὑπό*

p. 302, 11 *τουτέστι*

p. 304, 1 *καί* — 2 *ὀρθίαν*] sic*

p. 306, 12 *ZΘΑΓ*, sed corr. 18 *ΔB*] sic

p. 308, 4 *πεποιήσθω*] sic* 10 *ON*, *OM*] corr. ex *ΩN ΩM* 11 *AB*] *AM* 16 *τῆς*] *τῇ* 17 *ἔχει*] sic* 21 *TO*] *τὸ OT*

p. 310, 7 *NΞM*] *M* e corr. m. 1 16 *HZE*] e corr.

p. 312, 8 *ἐστι*] corr. ex *δι* 14 *ἐστίν*] sic* 16 *AΓH*] *A* e corr. 22 *NΠ*] *MΠ* *ἄρα*] *ἄρα ἡ* 24 *ἡ* (alt.)] om.

p. 314, 5 *τουτέστιν* — 6 *μείζονα*] om. 9 *ἔχει*] om. 12*) *ἔχει*] om. 18 *IΞ*] corr. ex *TΞ*

p. 316, 3 *ἡ TΞ* — 4 *A'ς*] om. 5 ante *ΞΠ* del. *H* 7 *MΠΞ*] *MΞΠ* 11 *τῷ*] *τῇ* *ΞΣΠ*] *ΞOΠ* 13 *τουτέστι* — 14 *ΞΣ* (pr.)] ter (alt. et tertio loco *TΣZ*) 14 *MΣΠ*] *MOΠ* 19 *ἐστιν*] bis

p. 318, 1 *α'*] om. 5 *γενόμενα*

p. 320, 9 *ΔHΓE*] *Γ* e corr. 11 *β'*] om. (ut deinceps)

p. 322, 4 *ΓΑHI*] *ΓΑH*

p. 324, 4 *τοῦ ΓZ*] e corr.

p. 326, 3 *συμπίπτωσι*] sic*

p. 328, 13 *KMA*] *KAM*

p. 330, 2 *ΦXTAΨ* 12 *τὸ NE*] sic* 13 *TK*] *ΓK* 20 *ΞI*] *Ξ* *τῷ*] *τό*

p. 332, 3 *ΞBΔ*] *Δ* e corr. 4 *ΘZB*] *ΘBZ* 10 *ΔEI*] *ΔE* 15 *τό*] supra scr. 21 *AEZ* (pr.)] *AHZ* 23 *KO*] *KH* 29 *ΩXKI*] *ΩXK*

p. 334, 14 *προκείσθω*

p. 336, 6 *ὅτι*] corr. ex *ὅ* m. 1 18 *ἐστί*] om.

p. 338, 3 *λεῖπον* corr. in *λιπόν* m. 1 *ἤ*] *ἡ* 4 *ἤ*] sic* 14 *BE*] *BZ*

p. 340, 10 *διοίσει*] -*οίσ*- e corr. 13 *τι*] supra scr. m. 1 14 *B*] *δευτέρας* 22 *AM*] corr. ex *AM* m. 1 24 *ΘT*] *ΘO*

p. 342, 5 *ἤ*] *εἰ* 9 *τῷ*] corr. ex *τό* m. 1 12 *ἐπιψαύουσαι*] corr. ex *ἐπιψαύωσι* m. 1 28 *τήν*] *τό*

---

*) *τήν* ante *ς A'* delendum; omittunt Vc.

p. 344, 12 *πεποιήσθω*] sic* 26 *ΔΒΕ*] *δὲ ΔΒΕ* 28 *ΔΒΕ*] *δὲ ΔΒΕ*

p. 346, 2 *τῷ ΙΘΗ*] sic* 7 post *ΔΒ* del. *Ε* 9 *ἡ Ρ*] *ΗΡ* 10 *καί*] sic* *ΘΓΒ*] *ΘΒΓ* 17 *ἐκ τοῦ*] bis, sed corr. 19 post *ΘΑΖ* una litt. macula obscurata

p. 348, 11 *ἐφαπτέσθω* 20 *ΒΑΓ*] corr. ex *ΒΓ ΑΓ* 22 *ἐστί*] om. 23 *τῷ*] e corr.

p. 352, 18 *ΙΜΕ*] *ΙΕΜ* 23 *ΖΞ*] *ΞΖ*

p. 354, 1 *πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΓ*] *πρός*, sed del. m. 1

p. 356, 4 *ΒΑΓ*] *ΑΓ* e corr. 18 *αἱ*] sic* 23 *ΜΑΞ*] *ΜΑΖ*

p. 358, 1 *ΔΖΤ*] *ΔΖΓ* 9 *τις*] om. 24 *ΒΖΔ*] *ΒΔΖ*

p. 360, 2 *ὑπό*] corr. ex *ἀπό* 16 *ὑπό*] corr. ex *ἀπό*

p. 362, 25 *πλευρά*] *πλευρ* (with *ά* supra scr.)

p. 364, 4 *ΚΕΑΜ*] *ΕΚΑΜ* 10 *ΗΖ*] *ΗΞ* 24 *συμπίπτωσιν*] sic*

p. 366, 22 *ΤΝΞΣ*] *ὑπὸ ΤΝΞΣ*

p. 368, 9 *τόπῳ*] om. 26 *ἴσον*] corr. ex *πρὸς τόν*

p. 370, 11 *μέν*] om. 20 *ἀπό*] e corr.

p. 372, 8 *ΡΝΜ*] *ΡΤΜ* 9 *τό* (pr.)] sic* 18 *τοῦ* — 19 *ΑΕ*] sic*

p. 374, 6 *ὑπό*] sic*

p. 378, 3 *ΝΖ*] *ΝΞ* 15 ante *τετράγωνον* del. *εἶδος* 28 *ἐστι*] om.

p. 380, 18 post *ΒΔ* aliquid del. (*εἰ* ...)

p. 382, 13 *Ζ*] *Ξ* 14 *ἄρα εἰσί*] om. 19 *ΑΞ*] *ΔΞ*

p. 384, 8 *συμπτώσεως*] *συμπτώσεως καί*

p. 386, 9 *συμπτώσεως*] *πτώσεως*

p. 388, 6 *ΔΜ*] *ΔΝ* 20 *ΓΗΘ*] e corr. 21 *ΓΗ*] *ΓΗΘ* e corr.

p. 390, 4 *ΝΑΚ*] *ΝΚΑ* 6 *ΗΞ*] *ΗΓΞ* 11 *τε*] supra scr.

p. 392, 12 *ΑΜ*] *Α*

p. 394, 17 *ΜΠ*] corr. ex *ΠΜ*

p. 396, 15 *ἡ* (pr.)] om. 23 *ὑποβολή*

p. 398, 12 *ΑΔ*] corr. ex *Δ* 13 *ΔΟ*] *ΔΗ*

p. 400, 3 *τήν*] *τόν* 20 *καί* — 21 *ΣΗ*] om. 22 *τὸ ΝΓ*] sic*

p. 402, 11 *μέν*] supra scr.

p. 404, 1 *ΑΓ*] e corr. 7 *δέ*] om. 10 *ΑΓΡΞ*

p. 406, 23 *ἡ* (pr.)] om.

p. 408, 12 *ΕΘΣ*] *ΕΘΟ* 15 post *ΘΜ* del. *καὶ ἐναλλάξ*

p. 410, 16 ἔστωσαν] e corr. 27 ἡ (alt.)] supra scr. m. 1

p. 412, 4 πρός (alt.)] sic* 11 πρός] bis

p. 414, 17 ΓΠ] corr. ex Π 20 ΜΒ] sic* 21 ἔσται] sic* 26 ὡς δέ] corr. ex καὶ ὡς ἄρα

p. 416, 7 ἡ ΚΑ — ΑΝ] om.

p. 420, 10 ἀπὸ τῶν] sic*

p. 422, 1 ἴσον — 2 ΑΒΝ] om. 17 τῷ] sic* ΗΔΕ] corr. ex ΒΔΕ 27 ἐν] om.

p. 426, 3 εἰσί] εἰσῖ 6 ποιοῦσι] corr. ex ποιοῦσιν εὐθείας 9 ΓΔΖ] sic* 16 αὐτῷ] bis

p. 428, 7 ἴση] ἴση ἐστίν 14 πρός] bis 27 ὡς — ΜΑ] om.

p. 430, 19 κάθετος] bis

p. 432, 1 ΗΘΒ] Η e corr.

p. 434, 10 ἐστίν 18 ὁ] ἡ

p. 436, 8 ἐλλείψει] corr. ex ἐλλείψεως τόν] corr. ex τήν 22 ἴση ἄρα — 23 ἴση] bis 23 ἴση] sic altero loco, priore ἐστιν ἴση

p. 438, 11 ἤχθωσαν 21 ΖΒ — 25 τῆς (pr.)] om. 26 ΓΕ] ΕΓ

p. 440, 25 Η, Ζ] corr. ex ΖΗ

p. 442, 15 τὸ δέ — 16 ΛΘΚ] om. 23 μέσον

p. 446, 4 ΑΚ] corr. ex Κ 5 δι'] e corr. 7 ὁ] om. 24 λόγον ἕξει] sic*

p. 448, 5 ΑΕΖΗ] ΑΕΝΖ 14 ὑπό] sic* 17 ΘΔ] ΛΔ 20 ΘΔ] ΘΛ 22 πρός] sic*

p. 450 in fine, sed ita, ut pro titulo libri IV haberi possit, Ἀπολλωνίου Περγαίου κωνικῶν γ̄ ἐκδόσεως Εὐτοκίου Ἀσκαλωνίτου εὐτυχῶς.

**II** p. 4, 3 ποικίλων] sic* ξενιζόντων] ξενιξόντων 8 Κώνωνα 9 Κώνωνος 22 α'] om., ut deinceps 26 δύο] τὰ δύο

p. 6, 6 ἔστω] ἔστωσαν 15 ἐφαπτομένην] sic*

p. 8, 21 συμπεσεῖται] sic*

p. 10, 17 τῶν ἀ-] sic*

p. 12, 7 τῆς] τοῦ 14 ὑπό] corr. ex ἀπό

p. 16, 3 διαιρέσεων] αἱρέσεων 5 συμπτώσεων] corr. ex ἀσυμπτώτων 6 τῆς γραμμῆς] γραμμῆς 9 Ε] om.

p. 18, 5 Δ] τέταρτον 20 Δ] τέταρτον 24 τέμνουσαι] sic*

p. 20, 13 μηδέ] μή

p. 24, 5 ἐφάπτηται] corr. ex ἐφάπτεται

p. 26, 13 περιεχομένης] ἀγομένης

p. 28, 15 ἐν] om. 24 εὐθεῖαι] om.
p. 30, 10 ἤ (pr.)] e corr.
p. 32, 20 δή] om. 28 συμβαλέτω
p. 34, 21 ante συμπτώσεων del. α
p. 36, 7 *B*] δευτέραν 12 συμπτώσεων] sic*
p. 38, 9 συμβαλέτω
p. 40, 18 *P*] *E* δή] corr. ex δέ
p. 42, 6 *Α*] πρῶτον 8 συμβαλέτωσαν
p. 46, 17 δή] supra scr. m. 1 27 *AHB*] *ΔHB*? 28 τά] om.
p. 50, 11 *AB* — 12 ἡ] om. 12 δή] δέ 24 τά] om.
p. 52, 12 τά] om. 20 *HΔ*] corr. ex *Δ*
p. 54, 2 εἰσίν] εἰσι 5 post περιφέρεια del. ἡ *ΑΒΓ* 10 συμβαλλέτω] -λέτω e corr.
p. 56, 18 συμβαλέτω 19 *Α*] *K*
p. 60, 5 not. κοίλοις] corr. ex κύκλοις 16 συμβαλέτω 23 *H*] *K*
p. 62, 11 συμβαλέτω τά] sic*
p. 64, 13 ante κατά del. κατὰ τὸ *Α*, καὶ ὃν μὲν ἔχει λόγον ἡ *ΑΛ* πρὸς *ΛΒ*, ἐχέτω ἡ *ΑΠ* πρὸς *ΠΒ*, ὃν δὲ ἡ *ΔΛ* πρὸς *ΛΓ*, ἡ *ΔΕ* πρὸς *PΓ*. ἡ ἄρα διὰ τῶν *Π*, *P* 20 αὐτῆς] αὐτοῖς 25 περιέχουσιν
p. 66, 13 *ΔP*] *ΔΕ*
p. 68, 3 *Δ*] *HΔ* 13 οὐ] om. 24 συμβαλλέτω — 25 *Γ*] om. 26 *ΔΕΚ*] *ΔΕΗ*
p. 70, 1 συμβαλέτω 18 post δίχα supra scr. καί m. 1
p. 72, 1 *ΘΛΜ*] *ΘΛΜΣ* 11 *ΟΡΓ* (pr.)] *ΘΡΓ*
p. 74, 25 πρός] om.
p. 76, 15 συμβαλέτω
p. 78, 26 συμβαλέτω κατά] sic*
p. 80, 6 *ΘΖΗ*] *ΘΗΞ* 26 *ΖΡΘ*] *ΖΘΡ*
p. 82, 13 *ΑΓ*] corr. ex *ΑΓΒ* 17 ἑκατέραν 23 συμβαλέτωσαν
p. 84, 1 *ΘΔ*] corr. ex *ΔΔ*
p. 90, 20 ἐπιψαύωσιν] corr. ex ἐπιψαύουσιν
p. 92, 7 δύο] τὸ *B* 15 συμπίπτει
p. 94, 9 *ΓΔ*] sic* 12 ἡ — 13 *AB*] sic*
p. 96, 4 οὖν] om. In fine Ἀπολλωνίου κωνικῶν δ̄.

qui hanc collationem perlustrauerit, statim intelleget, emendationes codicis c tam paucas tamque futiles esse, ut nullo negotio a librario coniectura inuentae esse possint; quare nihil

obstat, quominus putemus, c e V pendere. et hoc suadent errores, qui sequuntur:

I p. 74, 23 ἤ] om. V in extr. lin., om. c
p. 80, 5 τῆς] om. V in extr. lin., om. c
p. 88, 25 τομήν] τομ̂ V in extr. lin., c
p. 136, 27 παρά] π̈ V in extr. lin., c
p. 226, 6 τό] om. V in extr. lin., postea ins. c
p. 294, 16 ἡ (alt.)] om. V in extr. lin., om. c
p. 340, 24 ΘΥ] υ simile litterae ο V, ΘΟ c
p. 388, 28 τό (tert.)] om. V in extr. lin., om. c
p. 390, 6 ΗΞ] η ϛ̄ V, h. e. ΗΞ corr. ex ΗΓ; ΗΓΞ c
p. 436, 10 ἐλλεῖπον] λεῖπον initio lineae V, λεῖπον c.

iam de codice p uideamus et primum scripturas eius a meis discrepantes adferamus iis omissis, quae iam in adparatum criticum receptae sunt: Paris. 2342 (p)

I p. 2, 8 εὐαρεστήσωμεν] supra scr. εὐρω- 12 παραγενόμενος
p. 4, 25 δέ] δὲ περί
p. 6, 12 post σημεῖον del. ὃ καὶ τῆς 27 τῆς γραμμῆς] om.
p. 8, 3 εὐθεῖα] om. 18 συζυγεῖς — 20 παραλλήλους] mg. m. 1
p. 10, 10 πόρισμα] om. 15 β'] om. 21 τήν] τὴν κωνικήν 27 ἐπεζεύχθωσαν] corr. ex ἐπιζεύχθωσαν
p. 12, 4 ΑΖ] ΑΒ 5 ΒΓΔ] ΑΒΓ 12 ἐκβεβλήσθω — 13 ἐπιφανείας] mg. m. 1
p. 14, 23 τό] καὶ ἔστω τό 24 ἐστί] ἐστὶν ἡ ΑΖ 25 συμβαλέτω 26 ἔσται] ἔστω 27 τό] ἔστω τό
p. 16, 8 ἡ (alt.)] corr. ex αἱ τῇ] supra scr. 9 παράλληλος] παράλληλός ἐστιν 10 ΔΗ] τὴν ΔΗ, et similiter semper, ubi nihil adnotatum est 11 ΖΓ] ΓΖ 12 ΗΘ, ΗΕ] ΘΗ ΕΗ 13 ἀλλήλαις εἰσίν
p. 20, 1 ΕΖΔ] ΕΖ, ΖΔ, et ita semper, ubi nihil adnotatum est
p. 22, 11 ἐπ' εὐθείας] om. 17 ἄρα σημεῖα] σημεῖα ἄρα
p. 24, 1 ἤτοι] ἤ 11 αἰεί] ἀεί 27 δή] δέ 28 τι] τό
p. 26, 7 τομήν] om. 8 ἐπὶ τῆς] om. 30 τριγώνῳ ἐστί] om. ὀρθάς] ὀρθάς ἐστι
p. 28, 1 ἐστι πρὸς ὀρθάς] ὀρθή ἐστι 3 ὁ — 6 δή] om. 10 ἐστι πρὸς ὀρθάς] πρὸς ὀρθάς ἐστι 11 ΗΖ] ΖΗ 13 ἐστὶ πρὸς ὀρθάς] πρὸς ὀρθάς ἐστι 14 ἐστὶ πρὸς ὀρθάς] πρὸς

ὀρθάς ἐστιν 18 ἡ ΔΕ] οὐδέ 19 ἐστι πρὸς ὀρθάς] πρὸς ὀρθάς ἐστιν

p. 30, 5 προσεκβαλῆται 20 ἐκβαλῆται 24 ἐπεί] καὶ ἐπεί

p. 32, 1 ἤχθω] om. 4 ΚΛΜΝ] ΚΜΛΝ 9 ΚΛΜΝ] ΚΜΛΝ 21 ἀπὸ τῆς ΖΗ εὐθεῖαν] εὐθεῖαν ἀπὸ τῆς ΖΗ

p. 34, 1 ὑπεναντίως] ὑπεναντίως ἠγμένῳ 9 ΒΑ] ΑΒ 10 τε] om. 12 Α, Β, Γ] ΑΒ, ΒΓ τομῆς] om. 16 ΜΑ] ΚΜΗ 27 ΜΝ] ΝΜ 29 ἴση ἐστί] om. ΜΕΞ] ΜΕΞ ἴση ἐστίν

p. 36, 12 δή] δέ 16 Η, Θ] Ζ, Η 23 νεύει*) 25 ΔΖΕ] ΔΕΖ

p. 38, 15 τὸ Α σημεῖον κορυφή] κορυφὴ τὸ Α σημεῖον 22 τριγώνου] τριγώνου τοῦ ΑΒΓ 24 πεποιήσθω] -ή- e corr. ΒΓ] τῆς ΒΓ, et similiter semper ΒΑΓ] τῶν ΒΑ, ΑΓ, et similiter semper 26 ἡ] ἤχθω ἡ 28 ΜΝ] ΜΑΝ

p. 40, 9 τοῦ] τοῦ λόγου 10 ΒΓ] ΓΒ 11 ἐκ] ἔκ τε ΓΑ] ΓΑ λόγου 14 ΒΓ] ΓΒ ΜΝ] ΝΜ 15 ΝΑ] ΑΝ 17 ΝΑ] ΑΝ ἐκ] ἔκ τε 18 ΜΑ] ΑΜ ΑΖ] ΜΖ τοῦ] om. ΑΝ] ΝΑ 19 ΜΑΝ] mut. in ΜΑ, ΑΝ m. 1 ὡς] καὶ ὡς 20 οὕτω, ut semper fere ante consonantes 22 ὡς — 25 ΘΖΑ] τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΜΑ, ΑΝ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΘΖ, ΖΑ 25 τό] τῷ 26 ἄρα] supra scr. m. 1

p. 42, 15 μὲν οὖσα] μένουσα 19 τῶν τῆς βάσεως τμημάτων] τῆς βάσεως τῶν τμημάτων

p. 44, 4 τριγώνου] κύκλου comp. 9 ΒΓ] ΒΓ κατὰ τὸ Κ 24 ΡΣ — 26 ΜΝ] mg. 28 ΖΘ] ΘΖ

p. 46, 2 τε] om. τοῦ] τοῦ λόγου 3 καί — 4 ΚΒ] om. 12 ΣΝΡ] ΡΝ, ΝΣ 13 ΣΝΡ] ΡΝ, ΝΣ 15 ΖΝ] ΝΖ λαμβανομένης] -ης e corr. 19 ΣΝΡ] ΡΝ, ΝΣ ΞΝΖ] ΖΝ, ΝΞ 20 ΣΝΡ] ΡΝ, ΝΣ 21 ΞΝΖ] ΖΝ, ΝΞ ΞΝΖ] ΖΝ, ΝΞ ἐστι τὸ ΞΖ] τὸ ΖΞ ἐστι 22 ΞΖ] ΖΞ

p. 48, 4 δέ] om. 11 τῆς] om. 20 δύναται

p. 50, 3 οὖσαν 4 ἡ ΕΘ — 5 ἤχθω] supra scr. 10 ΕΘ] corr. ex Θ 12 ΘΕ] ΕΘ 13 Θ] Ν ΕΜ] ΜΕ 20 ἡ τομή — 21 ΑΜ] in ras.

p. 52, 7 ΜΞ (pr.)] ΜΝ 9 ΞΜΕ] ΝΜ, ΜΕ 10 ΞΜΕ] ΝΜ, ΜΕ 12 καί — 13 τῆς ΑΜ] om. 14 ΘΕ] ΕΘ 15 ΟΝ] ΕΞ 25 ἐπί] παρά 26 εὐθεῖαι

---

*) P. 36, 25 pro εὐθείᾳ scribendum εὐθείας; sic Vcp.

p. 54, 18 ἐπειδή] ἐπεί ὀρθάς] ὀρθάς ἐστι 19 ἑκατέρα] ἑκατέρα ἑκατέρᾳ

p. 56, 3 ΒΣΓ] ΒΓ, ΓΣ 4 ΟΤΞ] ΟΞ, ΞΤ 16 ΒΣΓ] ΒΓ, ΓΣ 24 ἴση — ΘΡ] ἡ ΘΡ ἴση ἐστί

p. 58, 1 ΞΤΟ] ΟΤ, ΤΞ 3 ΞΤΟ] ΟΤ, ΤΞ 5 ΞΤΟ] ΟΤ, ΤΞ 11 ποιήσῃ 25 ποιείσθω] πεποιήσθω *ΑΒ*] sic 26 τήν] om. 28 ΗΘ] e corr.

p. 60, 1 ΘΛ] ΘΚ παράλληλοι ἤχθωσαν τῇ ΘΔ 8 ΞΟ, ΓΠ] in ras. 10 τό] τῷ τῷ] mut. in τό 11 τό] τῷ τῷ] τό 13 ΤΠ] ΠΤ καί — ΤΛ] ἴση ἄρα ἔσται καὶ ἡ ΒΠ τῇ ΠΝ 15 ΟΤ] ΤΟ ἴσον ἐστί 16 ΤΥ] ΤΝ τῷ ΤΞ — 17 ἴσον] ἴσον ἐστὶ τῷ ΤΞ καὶ τὸ ΣΝ ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ ΤΞ 18 ΠΟ — 19 ὑπερέχει τῷ] om. 20 ΞΗ] ΗΞ 26 ΕΘΔ] ΕΘ, ΕΔ 27 ΗΞ] ΞΗ καί 29 ΑΒ] sic

p. 62, 1 τήν] om. τήν] supra scr. 5 πρός] om. 6 τουτέστι τό] οὕτω τὸ μέν 7 οὕτως τό] τὸ δέ 8 τουτέστι — ΟΣ] ἀλλ' ὡς ἡ ΠΓ πρὸς τὴν ΓΒ, οὕτως ἡ ΠΣ πρὸς τὴν ΣΟ 9 ΕΘΔ] τῶν ΠΣ, ΣΟ ΠΣΟ] τῶν ΕΘ, ΘΔ 14 δή] om. 20 τό] τῷ 21 τῷ] τό τό] τῷ 22 τῷ] τό 23 ΨΧ] ΧΨ ΑΞ] sic 25 ΒΧ] sic καί — 26 ΒΧ] om. 26 ΞΑ] sic ΧΞ] ΞΧ 27 ΧΒ] sic 28 ἐστιν ἴση] ἴση ἐστίν

p. 64, 3 ΔΘ] ΔΕ 6 παρατεταγμένως κατηγμένη 10 ἡ ΑΒ δίχα 11 παρατεταγμένως κατηγμένη 24 ΑΒ] sic, ut saepe post πρός 25 ΑΕ] ΕΑ

p. 66, 1 τήν] om. post ΛΑ magna ras. τήν] om. 4 ΒΛ] ΛΒ 5 ΝΛΒ] τῶν ΝΛ, ΛΒ (ΝΛ e corr.) 12 ἴση ἐστίν] ἐστιν ἴση 14 τῇ] ἡ ΗΘ τῇ

p. 68, 3 εὐθεῖα ἀχθῇ κατηγμένη 13 ΑΓ] ΓΑ 18 διόπερ] διόπερ καί 20 ἐάν] ἐὰν ἐν

p. 70, 5 ΕΖ] ΖΞ 9 Ε] om. 11 Ζ, Β] Γ μέρη

p. 74, 11 ΑΓ] ΓΑ 12 post ΑΒ add. καὶ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ, οὕτως ἡ ΓΑ πρὸς ΑΒ 13 τό (pr.)] τῷ 16 τό] τῷ 18 ΗΒ] ΚΒ ΚΗ] e corr. 19 ΗΒ] Η e corr. 20 ὡς ἄρα] ἔστιν ἄρα ὡς 25 ἐναλλάξ] ἐναλλὰξ ἄρα

p. 76, 9 τῇ] τῆς 16 ΑΒ] ΒΑ 20 ante μεῖζον add. μεῖζον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΕΑ τοῦ ὑπὸ τῶν ΖΒ, ΒΑ 21 post ΔΒ add. μείζων ἄρα καὶ ἡ ΓΕ τῆς ΔΒ

p. 78, 6 ΗΕ] ΕΗ ΔΓ] ΓΔ 8 ΒΗΑ — ὑπό] om. 12 μεῖζον τοῦ ὑπὸ ΔΚΓ 14 ΖΘ] ΘΖ 15 ΖΘ] ΘΖ

p. 80, 1 ΔΖ] ΖΔ ΔΖ] ΖΔ 16 ἐπεί] καὶ ἐπεί ἐστι

17 *ΗΖ*] *ΖΗ* 18 *ΕΖ*] *ΖΕ* 20 *ἐν*] om. 22 *μόνον*] om. 23 *ΑΒΓ*] *ΒΑΓ*

p. 82, 5 *ΘΓ*] *ΓΘ* 10 *κατά* — 12 *καί*] mg. 13 *Δ*] e corr. 20 *τῶν* — 21 *κατασκευασθέντων*] *καί* 23 *ἐπεὶ οὖν*] *καὶ συμπιπτέτω τῇ ΒΔ ἐκβληθείσῃ κατὰ τὸ Μ καὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως τῇ ἄνωθεν καταγραφῇ κατασκευασθέντων ἐπεί* 25 *ΜΓΔ*] sic 27 *ΗΕ*] *τοῦ ΗΕ* 28 *ΕΗ*] *τῆς ΗΕ*

p. 84, 19 *δύνανται*] *δύνανται αἱ καταγόμεναι* 22 *ἐπεί*] *καὶ ἐπεί* 23 *ΖΑΒ*] *τῶν ΒΑ, ΑΖ* *ἔστιν*] *ἔστιν ἄρα* *ΑΒ*] *ΒΑ* 26 *ΖΔ*] *ΔΖ* 27 *ἐπειδή*] *ἐπεί*

p. 86, 5 *ΒΑΜ*] *τῶν ΑΒ, ΒΜ* *ὡς*] *καὶ ὡς* 9 *ἴσον*] *ἴσον ἐστί* 10 *ΑΜ*] *ΑΒ* 12 *ΓΔ*] *ΔΓ* 18 *διάμετρος ἡ ΑΒ* 23 *συμπίπτει* 24 *ΑΒ*] *ΑΔ*

p. 88, 3 *ΗΝ*] *ΕΗ συμπεσεῖται ἄρα τῇ ΜΝ κατὰ τὸ Ν· παράλληλοι γάρ εἰσιν ἡ μὲν ΚΛ τῇ ΜΝ, ἡ δὲ ΚΘ τῇ ΕΝ*; deinde del. *καὶ ἐπεὶ παράλληλοί εἰσιν ἡ μὲν ΚΛ τῇ ΜΝ, ἡ δὲ ΚΘ τῇ ΕΝ* 4 *παράλληλοί εἰσιν* *ΚΛ*] *μὲν ΚΛ* 5 *ὅμοιον*] *ὅμοιον ἄρα* *ΚΘΛ*] *ΚΘ* 7 *ἐστίν*] *ἐστὶ καί* 8 *τῷ* — *ἐστί*] *ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΜΝ* 11 *ΒΛΑ*] *ΒΛ, ΛΑ* *ὡς*] *καὶ ὡς* 12 *ΑΜΒ*] sic 13 *καί ἐστιν*] *ἀλλ'* *ΛΚ*] *τῆς ΚΛ* 14 *καὶ ὡς* — 15 *ὀρθίαν*] supra scr. 21 *εὐθεῖα*] -*α* e corr.

p. 90, 1 *τεταγμένως*] *τετ*- e corr. 2 *κείσθω*] *ἔστω* *ΖΗ*] *ΗΖ* 4 *ΒΕΔ*] *τῶν ΒΕΔ* *καὶ ἐπεί ἐστιν*] *ἀλλ'* 9 *τό*] corr. ex *τῷ* 20 *ΔΓΕ*] *Ε* e corr. *ΓΔ*] *ΔΓ*

p. 92, 7 post *ΓΗ* add. *καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΒΖ, ΖΑ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ, οὕτω τὸ ἀπὸ τῆς ΖΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΗ* 11 *ΓΖ*] *ΓΒ* *ΒΓ*] *ΖΓ* 12 *τῷ*] *τό* *τό*] *τῷ* 13 *τῷ*] *τό* *τό*] *τῷ* 21 *προσεκβληθεῖσα*] *ἡ προσβληθεῖσα* 24 *ὄν*] om.

p. 94, 2 *ἀπό*] *ἀπὸ τοῦ* 13 *διελόντι* — 15 *ΑΘΒ*] om. 23 *τε*] *τε τοῦ* 27 *ἤχθω*] *κατηγμένην ἤχθω*

p. 96, 11 *οὖν ὡς*] om.

p. 98, 4 *τεταγμένως ἀπ' αὐτοῦ*] *ἀπὸ τοῦ Δ τεταγμένως* 14 *ἡ ΞΘ*] *οὕτως ἡ ΞΘ* 16 *ὡς*] *καὶ ὡς* 18 *ΑΘΞ*] *ΞΘ, ΘΑ*

p. 100, 9 *ΓΔ*] *ΓΔ οὕτω* 10 *ΓΔ*] *ΓΔ οὕτως* 16 *ΒΕΔ*] *τῶν ΒΕΔ* 22 *ἡ*] supra scr.

p. 102, 6 *καί*] bis 13 *ΓΕ*] *ΕΓ* 15 *ΕΓΖ*] *ΕΖΓ* 17 *ΗΖΘ*] *ΘΖΗ* 18 *ἐπιζευχθεῖσαι* — 19 *Μ*] *ἐπιζευχθεῖσα η ΓΗ ἐκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείας κατὰ τὸ Μ καὶ συμπιπτέτω τῇ ΒΚ ἐκβληθείσῃ κατὰ τὸ Μ καὶ προσεκβεβλήσθωσαν αἵ τε ΑΛ καὶ ΓΔ κατὰ τά* 26 *ΑΝ*] *τὴν ΟΝ*

p. 104, 5 *MB*] *MΔ* 6 ἐστί] om. 8 *BHA*] τῶν *BHA* τὸ ἄρα] ἄρα τό 24 τῆς (pr.)] om.

p. 106, 2 *HE*] *HΣ* 4 δυοῖν 7 εἰς] καὶ εἰς

p. 108, 5 ἔστω] ἔσται 9 τά] ἔσται τά ἐστιν] om. 25 τῆς (pr.)] om.

p. 110, 8 *ΔEZ*] τῶν *EΔ*, *ΔZ* 10 *ΓΔ*] *ΔΓ* 11 *ΓE*] *E* 13 ἡ *AΔ* — 14 πρὸς *EB*] lacuna 18 *ZΔ*] *BΔ* 23 ἴσον] ἴσον ἐστί 24 ὡς] om. 25 καί — 26 ὀρθίαν] om. 28 ἡμίσεια — *AB*] postea add. mg.

p. 112, 1 ὡς] καὶ ὡς 2 *BZ*] *ZB* 7 *ZE*] *EZ* 8 *ZE*] *EZ* 10 λοιπῷ — 11 *ΔÊZ*] ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν *BE*, *EA* ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ὑπὸ τῶν *ΔE*, *EZ* 12 ἀλλ' ὡς] ὡς δέ *ΓE*] *EΓ* 13 ὡς] καὶ ὡς 17 συμπέσῃ 21 post τομῆς del. ἴσον περιέξει τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας 26 πλευρὰ τοῦ εἴδους

p. 114, 3 τῆς] supra scr. 4 παράλληλος — 5 *ΘE*] καὶ ἐφαπτομένη τῆς τομῆς κατὰ τὸ *E* καὶ τῇ *AB* παράλληλος ἔστω ἡ *EΘ* 10 ἀλλ' — 11 ὀρθίαν (pr.)] ἀλλ' ἔστιν ὡς ἡ πλαγία πρὸς τὴν *BA* ἡ *ΓΔ* πρὸς τὴν ὀρθίαν mg. 12 τά] τὰ τούτων 17 ἐκ τοῦ] om. 19 ἐκ] ἔκ τε 20 ἐκ τοῦ] om. 23 ἐκ] ἔκ τε ἐκ τοῦ] om. 25 ὡς] καὶ ὡς 27 ἄρα ἐστίν] om.

p. 116, 5 καί — 6 πρὸς τό] τὸ δέ 8 *ΘE*] *HE* 10 *ZΘH*] τῶν *ZΘ*, *ΘH*, alt. *Θ* corr. ex *H* 11 ὡς] καὶ ὡς 19 *ZHΘ*] τῶν *ZΘ*, *ΘH* 20 τό — 21 *ΓHΔ*] om. 23 *HΓ*] *ΓH* *ΓΘ*] *Θ* sequente lacuna 24 διπλᾶ] διπλάσια comp. τῆς] τῆς μέν 26 ὡς] καὶ ὡς 27 *ΓZΔ*] *ΓZ*, *ZΔ* *ΔΓ*] *ΓΔ* *ΓΘ*] *Θ* sequente lacuna 28 *ΔΘ*] *ΓΘ* *ΘΓ*] *ΘΔ* ὅπερ — 29 δεῖξαι] om.

p. 118, 1 *EZ*] *AZ* 2 τομῆς] τομῆς κατὰ τὸ *E* 3 *ZΘH*] τῶν *ZH*, *HΘ* 9 ἐστιν] εἰσιν 14 ἐκ] om. 21 ἐκ] om. 22 *EΔ*] *E* e corr. 26 τῷ ὑπὸ *ΓE*, *H*] τῷ ὑπὸ τῶν *EΓ*, *H* in ras. 27 τουτέστιν — *EΓ*] om.

p. 120, 2 *ΓE*] τῶν *EΓ* 9 *ZE*] *Z* 18 τὸν συγκείμενον λόγον] λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον 19 ἐκ] om. 21 περιφέρεια] comp. postea ins. 23 ἤχθω ἐφαπτομένη 24 *ZH*] *HZ* 26 *ZH*] *HZ*

p. 122, 3 τὸ ἀπό] τήν 7 ἐκ (alt.)] om. 8 *HA*] *AH* 13 ἐκ] om. *HΘ*] *ΘH* 21 τὴν λοιπήν] λοιπὴν τήν*) ἐκ] om.

p. 124, 6 *ΓΔ*] *ΔΓ* 7 λόγον ἐχέτω 8 ἐκ] om. 15 ἡ

---

*) In adnotatione critica litterae p et c permutandae.

*ὀρθία* — *ΓΘ*] om. 23 *ἐκ* (alt.)] om. 25 *ἐκ*] om. 27 *ἐκ*] om. 28 *ΓΔ*] *ΔΓ*

p. 126, 1 *τῆς* (alt.)] om. 2 *λόγῳ*] om. 3 *ΓΗ*] *ΓΗ οὕτω* 4 *ὡς*] *καὶ ὡς* 7 *ὡς*] *καὶ ὡς* 8 *ἐναλλάξ*] *καὶ ἐναλλάξ* 11 *ΖΑ*] *Α* e corr. 14 *ΑΖ*] *τὸ ΑΖ* 16 *μετά*] in ras. 17 *ΑΕ* (pr.)] *ΕΑ* 18 *ΕΑ*] *Α* e corr. *τά*] seq. ras. 2 litt. 21 *ὡς*] *καὶ ὡς* 22 *ὅμοιον*] *τὸ ὅμοιον* 26 *οὖν*] om. 27 *ὑπό*] *ἀπὸ τῶν* 29 *ΕΑ*] *ΑΕ*

p. 128, 2 *ἄρα*] *ἄρα οὖν* 5 *ὅμοιον*] *τὸ ὅμοιον* 8 *ὅμοιον*] *τὸ ὅμοιον* 9 *μετά* — 10 *ἄρα*] *τὸ ἀπὸ τῆς ΔΕ ἄρα εἶδος τὸ ὅμοιον τῷ ΑΖ μετὰ τοῦ ΔΗ* 12 *παραβολῆς*] *ἐν παραβολῇ* 23 *τυχόντος σημείου*

p. 130, 9 *ΕΔΖ τρίγωνον*] in ras. 10 *ΖΗ*] *ΗΖ* 11 *ΑΘΓ*] *ΑΓΘ* 14 *ἐστί*] *καί* 24 *κατηγμένην ἀπὸ τῆς ἁφῆς*

p. 132, 2 *ὁμοίῳ*] *τῷ ὁμοίῳ* 9 *Β*] *Β τε* 10 post *τριγώνῳ* add. *τουτέστιν ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς μεῖζόν ἐστι τὸ ΓΜΗ* (*ΓΜΚ*?) *τρίγωνον τοῦ ΓΑΒ τριγώνου τῷ ΘΗΚ τριγώνῳ ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως καὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας ἔλασσόν ἐστι τὸ ΓΜΚ τρίγωνον τοῦ ΓΑΒ τριγώνου τῷ ΚΗΘ τριγώνῳ* 14 *ἐκ*] *ἔκ τε* *καί*] *καὶ τοῦ* 17 *ἐκ*] *ἔκ τε* 18 *καί*] *καὶ τοῦ* 21 *ΗΘΚ*] *ΗΘΚ τριγώνῳ* 22 *τά*] om.

p. 134, 1 *τομῆς*] *τῆς τομῆς* 6 *τεταγμένως*] *κατηγμένως* 9 *κέντρον*] comp. e corr. *ὁμοίῳ*] *τῷ ὁμοίῳ* 14 *ὡς ἡ ΓΕ*] *ἡ ΖΓ ἐπὶ τὸ Ε* 15 *παράλληλος*] *παράλληλος ἤχθω* 18 *ΓΜΘ*] *ΘΓΝ* *ΓΒΑ*] *ΒΓΑ* 24 *ΔΕ*] *ΕΔ* 26 *ΜΘ*] *ΝΘ*

p. 136, 5 *τῇ*] corr. ex *ἡ* 17 *τρίγωνον*] *τοῦ* 20 *ἐπί* — 23 *τομῆς*] om. 25 *δευτέρα* — *ΘΔ*] om. 26 *ΓΜΑ*] *ΜΓΑ* 27 *ἐπιζευχθεῖσα*] *ἐπεζεύχθω* 28 *ἐκβεβλήσθω*] om.

p. 138, 4 *μετά*] *τὸ ΒΕΖ τρίγωνον μετά* *ΖΗΘ*] *ΘΗΖ* 7 *ΓΜ*] *ΑΓΜ* 11 *τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον* 12 *ἐκ*] *ἔκ τε* *τῆς*] *ὃν ἔχει ἡ* *καί*] *καὶ τοῦ* *τῆς ὀρθίας*] *ὃν ἔχει ἡ ὀρθία* 21 *ἤτοι τοῦ ΓΔΘ*] om. 22 *διαφέρει* — p. 140, 1 *ΓΔΑ*] bis 23 *ἄρα*] *ἄρα ἐστί*

p. 140, 1 *τριγώνῳ*] om. 4 *τό* (alt.)] om. 20 *ἐστὶν ἴση*] *ἴση ἐστίν* 23 *ΒΘ*] *ΘΒ* *ΑΜΔ*] *ΑΜ*

p. 142, 2 ante *ἐστίν* del. *ἴσον* 5 *ΑΝ*] *ΝΑ* 15 *τυχόν*] *τυχὸν σημεῖον* *σημεῖον*] om. 16 *παράλληλος*] *τῇ ΔΕ παράλληλος* 18 *ΒΑ*] *ΑΒ*

p. 144, 2 *ἴσον ἐστί* 4 *λοιπῷ*] om. 11 *τομῇ*] om. 15 *ΑΓ*] *ΑΓΕ* 16 *ΑΚ*] *ΚΑ* 19 *ΕΔ*] *ΔΕ* 20 *ΕΔ*] *ΔΕ* 21 *ΝΗ*] *ΗΝ* *ΒΝΗ*] *ΒΗΝ*

p. 146, 5 κατηγμένη 10 ἁφῆς] τομῆς 16 ZB] BZ 21 τῆς H καὶ τῆς] τῶν H 26 ἴση ἐστί] ἐστιν ἴση ἐστιν ἴση] ἴση ἐστίν

p. 148, 1 ἴσον ἐστί 10 τό] οὕτω τό 12 τό (pr.)] οὕτω τό ὡς] καὶ ὡς 14 post ἐναλλάξ add. ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΚΛ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν Η, ΔΛ τὸ ὑπὸ τῶν ΚΛ, ΛΝ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΔΛ

p. 150, 11 ΓΕ] Ε e corr. 14 ΕΓ] Γ 22 καί] bis ΘΚ] ΚΘ 25 ΛΡΝ] ΛΝΡ 28 ΕΓ (alt.)] Γ in ras. 29 ΚΓ] ΓΚ

p. 152, 1 ante ΕΗ ras. 1 litt. 6 ΓΔΕ] ΔΓΕ 14 τῷ] τό 19 ΕΣ — 20 πρός] om. 21 ΞΜ — πρὸς ΕΔ] in ras. 22 ΕΣ] ΣΕ 23 ΕΣ] ΣΕ 24 ΕΔ] ΔΕ 27 ὡς] καὶ ὡς 28 ΕΣ] ΣΕ ΜΕ] ΕΜ 29 ΕΔ] ΔΕ

p. 154, 3 ΕΔ] ΔΕ ΜΕ] ΕΜ 21 ἠγμένην] om. 23 πορισθεῖσαν

p. 156, 12 τῆς ΑΖ τομῆς ἐφαπτομένη 16 καί (pr.)] om. 27 ὑπερβάλλοντα

p. 158, 1 συμφανές] συμφανὲς ἔσται 2 διάμετρον] supra scr. comp. 6 διότι] ὅτι 10 χωρία — 13 συμπαραβαλλομένων] in ras. 12 διότι] ὅτι 26 τῷ] δεδομένη τῷ

p. 160, 5 ΑΒ] ΒΑ ΓΔ] ΓΑ 6 μέρος τέταρτον 7 εἰλήφθω] ἔστω 10 τό — τετραπλάσιον] τὸ ἀπὸ τῆς Θ ἄρα ἔλαττόν ἐστιν ἢ τετραπλάσιον mg. 16 τὴν δέ] τῇ δέ τῇ ΖΕ] τὴν ΖΕ 21 δέ] δή

p. 162, 8 ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ] in ras. 10 ἥ] ἡ ΜΝ 12 ΜΖΝ] ΜΝΖ 20 ΖΚ] ΖΗ 23 ΑΖΚ] ΑΖ, ΖΗ 26 τῶν] πάλιν τῶν

p. 164, 7 τό] τῷ 8 τῆς] καὶ τῆς 9 μεγέθει] μεγέθει δεδομένης 20 τρίγωνον — 22 ΖΑ πρός] mg. 21 ΕΑ] ΑΕ 23 ΑΗ — ἄρα] in ras. 24 ΑΕ] ΑΘ

p. 166, 28 τὸ ἐν] τῷ ἐν

p. 168, 3 τοῦ Ε] τοῦ Α 4 ἐπί] ἡ ΕΚ ἐπί 9 ἡ ΜΖ] om. ΖΒ] ΒΖ 10 ἡ] ἤχθω ἡ 13 ΞΒΖ] mut. in ΖΒΞ ἐστιν ἴση] om. ΞΒΖ] ΖΒ, ΒΞ 16 ΒΖΞ] ΖΒΞ 17 ἔσται] ἔστω 18 ΒΖ, ΖΞ] ΖΒ, ΞΖ 20 ἔσται] corr. ex ἔστω 24 κύκλος] κύκλων 27 ΖΗΘ] ΖΘ

p. 170, 2 ἐπιπέδῳ — 3 τέτμηται] ἐπιπέδῳ τῷ, tum post lac. τέτμηται 4 τῇ] οὖσαν τῇ 5 ΗΖΘ] ΖΗΘ 7 ἔσται] ἐστίν 10 εἰσι] ἔσονται 16 ΓΒ] ΒΓ 18 καί] καὶ τοῦ 22 ἐκ] ἔκ τε

p. 172, 3 εὐθεῖαι] δύο εὐθεῖαι *AB*] *BA* 4 τῇ ὑπὸ τῶν] ἡ ὑπό 14 *AΔ*] *ΔA* 16 *A*] *A* τῇ *KZ* τῇ *KZ*] om. 22 ἔχουσαι πλάτη 26 *ZΔΘ*] τῶν *ZΔ* (ex *ZΘ*) *ΔΘ* 27 καί — p. 174, 3 *ΓA*] ras. 15 litt., postea add. mg.

p. 174, 1 *ΓA*] *AΓ* 4 ἐκ] ἔκ τε 5 ἐκ] om. 11 ὃν ἔχει η] τῆς ἡ] τοῦ τῆς 16 -ρήσθω — 18 πρὸς *HA*] ras., postea add. mg. 18 ἡ *OA* πρός] ἡ *ΘA* πρός ins. in ras. ὡς] καὶ ὡς 19 *AΘ*] *A* e corr. *OA*] *ΘA*

p. 176, 6 *AB*] *BA* 21 ἡ] ἤχθω ἡ 22 *AB*] *BA* 23 *AB*] *BA* 25 *AZ*] *ZA* 26 *ZA*] *ZA* ἐκβληθείσης 28 *HA*] *KA*

p. 178, 1 *AΔ*] *AZ* 2 *ΔZB*] *ΔBZ* 3 *ZΔA*, *ZAΔ*] *ZAΔ*, *AΔZ* 4 τῇ ὑπό] bis, sed. corr. 10 καί — ἴση] om. 12 *ΘHZ*] *ZHΘ* 13 δὴ ὁ] e corr. 15 *ΘHZ*] διὰ τῶν *Θ*, *H*, *Z* 17 *HΘZ*] *H*, *Z*, *Θ* 18 *HΘZ*] *H*, *Z*, *Θ* 19 ἡ (alt.)] καὶ ἡ

p. 180, 10 *AH*] *AK* 12 *HAΘ*] τῶν *KA*, *AΘ* καί 13 *HAΘ*] τῶν *KA*, *AΘ* 14 ὡς — 15 θεωρήματι] mg. 17 ἡ *AB* ἐλάσσων] ἐλάσσων ἡ *BA* 22 τὸ] τῷ ὥστε — τήν] ἔστω δὲ καὶ ἴση ἡ 24 ὡς] in ras. *AΓ*] *ΓA* 27 *ΔZ*] *ZΔ*

p. 182, 1 post *ΔA* del. τῷ δὲ ἀπὸ τῆς *ZΔ* 3 *ΔA*] *A* e corr. τό] τῷ τῷ] τό 4 *EΔZ*] τῶν *ZΔ*, *ΔE* *AΔ*] τῆς *ΔA*, *A* e corr. 6 τῆς] e corr. 9 *ΔA*] *A* e corr. 10 *ΔB*] e corr. 12 ἀπὸ *ZΔ* — 14 ἀπό] mg. 14 *ΔZ*] *ZΔ* 22 τήν] om. 23 ἐκβεβλήσθωσαν] ἐκβεβλήσθωσαν ἡ μὲν *AZ* ἐπὶ τὸ *A* ἡ δὲ *EZ* ἐπὶ τὸ *Δ*

p. 184, 5 τῷ] τό *ΘZA*] τῶν *ΘA*, *ZA* 10 ἀλλ' — 14 *AHE*] bis, sed corr. 11 ἐκ] ἔκ τε 25 εὐθειῶν] εὐθειῶν πεπερασμένων πεπερασμένων] κειμένων 27 κορυφαί

p. 186, 4 εὐθεῖαι] εὐθεῖαι πεπερασμέναι 5 πεπερασμέναι] om. 10 ὑπερβολή] ὑπερβολὴ ἡ *ABΓ* *BE*] *EB* 11 *ΘB*] *BΘ* 12 *BE*] *EB* 13 καί — *ABΓ*] om. 16 μέν] μὲν πλαγία 19 δή] δέ *B*, *E*] *ABΓ*, *ΔEZ* ἀντικείμεναί εἰσιν 20 αἵ] om.

p. 188, 10 *AΓ*] *AΓ* *ΓA*] *ΓA* 14 *ΓA*] *ΓK* ἐκβαλλομένην τῇ (pr.)] om. 17 κατηγμένη 18 *ΔE*] τῶν *EΔ* 19 *ΔZ*] *ZΔ* 24 *ΔE* ἐκβαλλομένην 25 *ΞEO*] *OEΞ* τομῶν

p. 190, 3 ὅπερ — ποιῆσαι] om. 4 αὗται αἵ] αἱ τοιαῦται In fine: τέλος τοῦ α̅ τῶν τοῦ Ἀπολλωνίου κωνικῶν

p. 192, 1 δεύτερον 11 αὐτῷ] om. 20 *B*] *BE* τετάρτῳ] τετάρτῳ μέρει 21 *BE*] *ΔE* ἐπιζευχθεῖσαι] om.

p. 194, 1 αἵ] om. 7 μὲν ἀπό] μὲν τῆς 9 *ΔB*] τῆς

*ΒΔ* 11 *ΘΗ*] in ras. 25 καὶ αἱ — 26 παράλληλοι] om. 27 τέμνεται] τέτμηται 28 τό] τὸ ἄρα

p. 196, 9 *ΛΚ* — 10 *ΛΗ*] sic*) 10 καί] om. ὡς — 11 *ΛΗ*] etiam in mg. 11 τὸ ὑπό — 13 οὕτως] mg. 13 ἀφαιρεθέν (pr.)] in ras. 16 *ΔΒ*] τῆς *ΒΔ* ἄρα] ἄρα ἐστί 17 *ΔΒ* corr. ex *ΒΔ* μεῖζον — 18 δέδεικται] δέδεικται γὰρ αὐτοῦ μεῖζον τὸ ὑπὸ τῶν *ΜΚ*, *ΚΗ* 21 ἐφάπτηται] ἐφάπτηται κατὰ κορυφήν 24 ἔσται] ἐστί 27 *ΖΕ*] *ΕΖ*

p. 198, 4 *ΕΒ*] *ΒΕ* 14 *ΖΕ*] *ΕΖ* 15 ἡ — 16 ἀσυμπτώτοις] om. 29 αὐτῆς] αὐταῖς

p. 200, 1 δύο] αἱ δοθεῖσαι δύο *ΑΓ*] *ΓΑ* 2 τήν] om. 3 *Δ*] *Δ* ἐντὸς τῆς ὑπὸ *ΓΑΒ* γωνίας *ΓΑΒ*] *ΑΓ*, *ΑΒ* 18 *ΑΒ*] *ΒΑ*

p. 202, 5 *ΕΑ*] *ΕΑ* ἴση ἐστίν 20 τῇ] ἡ 22 ἡ] τῇ 23 *ΖΗ*] *ΗΖ* 24 ἐστίν] om. *ΗΕ*] *ΕΗ* 26 *ΑΒ*] *ΒΑ* ἐκβαλλομένη

p. 204, 8 εὐθεῖα] om. 11 ἡ] ἤχθω ἡ τετμήσθω] -μή- e corr. 13 μή — δυνατόν] in ras. ἀλλά] ἀλλ' 16 ἔσται] ἐστι 23 *ΕΔ*] *ΔΕ* 24 *ΑΒΓ*] *ΑΒΓ* τομῇ

p. 206, 1 διάμετρος ἄρα] ἡ *ΔΗ* ἄρα διάμετρος 4 *ΚΘ*] *ΘΚ* *ΚΘ*] *ΘΚ* 5 ἄρα] ἄρα ἐκβληθεῖσα 7 συμπιπτέτω — Ζ] om. 23 τομῆς] τομῆς κατὰ τὸ *Ε* ἄρα ἅπτεται

p. 208, 4 *ΔΕ*] *ΕΔ* 18 *ΔΗ*] *ΗΔ*, *Η* e corr. 19 *ΑΗ*] *ΗΑ*

p. 210, 4 τῷ] ἴσον τῷ 5 ἴσον — *ΒΑ*] om. 6 *ΖΓΔ*] *ΔΓ*, *ΓΖ* 15 *ΓΑ*] *ΑΓ* 21 συμπεσεῖται — καί] om. 24 δή] δέ

p. 212, 5 πρός (pr.)] bis *ΗΚ*] *ΚΗ* 7 καί] καὶ τοῦ 8 τοῦ] τῆς 11 ἐναλλάξ] καὶ ἐναλλάξ 12 τῷ] corr. ex τό 14 *ΑΒ*] *ΒΑ*

p. 214, 3 τό] corr. ex τῷ 7 *ΑΗ*] *ΑΚ* *ΕΔ*] *ΔΕ* 8 *ΗΚ*] *ΖΚ* 16 ἧς] αἷς 19 καὶ εἰλήφθω] om. 22 τῷ] corr. ex τό 25 *ΓΗΘ* — 26 *ΔΚΛ*] τῶν *ΛΚ*, *ΚΔ*

p. 216, 3 συμπιπτέτω — *Μ*] om. 4 ὅτι] om. 5 καί (pr.)] om. 6 *ΓΑ*] *ΑΓ* 22 *ΓΗ*] *ΗΓ*

p. 218, 4 πόρισμα] om. 17 *ΖΒ*] *Β* e corr. 18 τετάρτῳ] τετάρτῳ μέρει 19 ἄρα] ἄρα εἰσίν 21 *ΓΕ*] *ΕΓ* 25 *Β*] *Β* τομῇ 26 *ΖΓ*] *ΓΖ* 27 εἰσιν] εἰσιν αἱ

p. 220, 15 *ΚΘ*] *Θ* e corr. 16 τῇ] τῇ *Α* 21 καί] om. 22 ἐστιν ἴσον] ἴσον ἐστί καί] καὶ διὰ τοῦτο *ΚΜ*] *ΚΜ* ἴση ἐστί

---

*) Nisi quod hic quoque ut semper fere articulus additur.

p. 222, 2 ΘΒΚ] ΘΒΗ 8 τῶν ἀπό] τὸ ὑπό 13 εἰσιν] εἰσιν αἱ 22 εὐθεῖα] εὐθεῖ 26 σημεῖον] om. ΚΛ] ΚΑ?

p. 224, 12 ΕΓΖ] ΓΕΖ 17 Α, Β] om. 20 ἄρα] ἄρα ἐστίν καί — ΓΖ] om. 21 ἡ] ἄρα ἡ ἐστιν ἴση] ἴση ἐστίν

p. 226, 9 ΘΗ] ΗΘ 10 ΘΗ] ΗΘ ΧΕ] ΕΧ ΕΞ] ΖΞ? 11 ΗΛ] ΚΛ? ΓΡΠ] ΠΡΓ 17 ΕΚ] ΚΕ 19 ΚΕ] ΚΘ 20 ΚΕ] ΚΘ ΗΛ] ΚΛ? 21 ὃν ἔχει ἡ] τῆς 22 καὶ ἡ] καὶ τῆς 26 λόγος] om. λόγῳ] om. 27 ΧΛ, ΛΗ, ΗΧ] ΗΛ, ΛΧ, ΧΗ, ΧΗ, alt. ΧΗ del.

p. 228, 4 ἕξει] ἔχει 12 καταγόμεναι] om. Δ] Η 15 τῆς ΤΧ καὶ τῆς] τῶν ΤΧ 18 δέ] δή 19 ΧΓ] τῆς ΓΧ ἀλλ' — 20 τουτέστι] om. 21 ΕΖΧ — 23 τρίγωνον πρὸς τό] om. 24 ΗΘΧ] ΧΗΘ

p. 230, 5 post ΕΖ del. παράλληλοι γάρ· καὶ ὡς ἄρα ἡ Σ πρὸς τὴν ΘΗ, ἡ ΧΕ πρὸς ΕΖ 7 πρός] bis, sed corr. 8 καί — 10 ΧΕΖ] om. 10 ἐναλλάξ] ἐναλλὰξ ἄρα ΗΧ] ΧΗ 11 ΕΧ] τῆς ΧΕ ὑπό (pr.)] ἀπὸ τῆς ΖΕΧ] τῶν ΧΕ, ΕΖ 25 αἱ] om.

p. 232, 2 πρὸς τῇ] παρὰ τήν 4 πρὸς τῇ] παρὰ τήν 11 ταῖς] corr. ex τῆς ἀσυμπτώτοις] -οις e corr. 12 τῶν (alt.)] om. 13 post ἀπό del. τοῦ κέντρου 17 ΧΕΖ, ΧΗΘ] ΕΧΖ, ΗΧΘ 18 ΧΓΔ] ΓΧΔ 19 ΘΕ] ΘΚΕ 24 ἐστιν 26 ΑΒ, ΓΔ ἄρα] ἄρα ΑΒ, ΓΔ

p. 234, 5 τις] εὐθεῖα 11 ἔστω] om. 19 ὑπό (pr.)] ὑ- e corr. 24 συμπτώσεων (ως supra scr.) 27 ΓΔ] ΔΓ 28 συμπτώσεως

p. 236, 1 ἐκβαλλόμεναι] ἐκβαλλόμεναι αἱ ΑΒ, ΔΓ 4 μόνον] om. 6 δύο] δυσίν 7 ΒΑ] ΑΒ 11 ἑκατέρας 13 συμπτώσεως 20 ἑτέρας] ἑτέρας συμπτώσεως 27 ΑΖ] ΑΞ ΑΘ] Α e corr.

p. 238, 1 γωνίαι] δύο γωνίαι 10 εἰ γὰρ δυνατόν] ἔστωσαν 11 αἱ ΓΔ, ΕΖ] τέμνουσαι ἀλλήλας οὖσαι] αἱ ΓΔ, ΕΖ. λέγω, ὅτι οὐ τέμνουσιν ἀλλήλας δίχα. εἰ γὰρ δυνατόν

p. 240, 3 ἐστιν] ἐστι τῆς τομῆς τῆς τομῆς] om. 4 κατά] τῆς τομῆς κατά 6 ΒΖ] supra Β scr. Ε 10 ΚΘΛ] ΘΛ in ras. 14 κη'] corr. ex κζ' 15 ἐὰν ἐν] corr. in scrib. ex ἐάν 18 τομῇ] τομῇ ἢ κύκλου περιφερείᾳ 26 τῇ] καὶ τῇ 28 ΕΔ] ΔΕ

p. 242, 2 ἔσται] ἐστι 11 ὅτι] ὅτι ἡ ΑΔ 13 εἰ — 15 Ζ (pr.)] in ras. 16 ἐπεί] καὶ ἐπεί 17 οὖν — 24 ΘΚ] διάμετρός ἐστιν ἡ ΕΔ καὶ τέμνει τὴν ΖΗ κατὰ τὸ Θ, ἡ ΖΗ ἄρα δίχα τέμνεται ὑπὸ τῆς ΕΔ κατὰ τὸ Θ. ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ κατὰ τὸ Α ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστι τῇ ΒΓ, καί ἐστιν ἡ ΖΗ τῇ ΓΒ

*παράλληλος, καὶ ἡ ZH ἄρα παράλληλός ἐστι τῇ κατὰ τὸ A ἐφαπτομένῃ, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ ZK τῇ KH ἐστιν ἴσα.* (β α supra scr.) *ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ZΘ τῇ ΘH ἴση* 24 *ἀδύνατον*] *ἄτοπον*

p. 244, 7 *BA*] *AB* 10 *ἐστὶν ἴση*] *ἴση ἐστίν* *ΔΓ*] *BΓ* 18 *ἀδύνατον*] *ἄτοπον* 21 *BA*] *AB* 23 *γωνίας*] *γωνίας τὸ κέντρον* 24 *ὑπόκειται τὸ A*

p. 246, 5 *ἐπιζευγνυμένη*] bis, sed corr. *πιπτέτω*] *ἐπὶ τὸ B πιπτέτω* 11 *καί*] om. 12 *ἐστιν ἄρα*] *ἄρα ἐστίν* 15 *καί*] *καὶ διὰ τοῦ H* *ἤχθω*] om. 18 *ΓΔ* (alt.)] *Δ* e corr. 25 *τὴν τομὴν γωνίας*] om. 28 *καί*] om.

p. 248, 6 *ZH*] *ZK* *ἤτοι*] *ἤ* 9 *λγ'*] $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\lambda\gamma}$ mg.

p. 250, 3 *τῇ*] supra scr. post *τομῇ* del. *ἤχθωσαν γὰρ ἀσύμπτωτοι* 9 *λδ'*] $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\lambda\delta}$ mg., et sic deinceps 25 *AB*] *AH* 28 *ἡ*] om.

p. 252, 6 *τῇ* — 8 *παρά-*] mg. post ras. 8 *-λληλος*] in ras. 9 *παράλληλος* — 11 *ἄρα*] bis, sed corr.

p. 254, 1 *ἐστιν ἴση*] *ἴση ἐστίν* 6 *ἐστι*] *ἔσται* 22 *ZΓ*] *ΓZ* 23 *ἄρα*] *ἄρα ἐστί* 24 *ZH* (alt.)] *HZ* 28 *ἐπιψαύουσαι συμπίπτωσιν*

p. 256, 7 *δίχα*] *ἡ ΓΔ δίχα* 11 *ἔστω γάρ*] *εἰ γὰρ μή, ἔστω* 15 *AB*] corr. ex *AΔ* 19 *ἄρα*] *ἄρα ἐστί* *HK*] *HX* 20 *ὥστε καὶ ἡ HK*] *ἐδείχθη δὲ ἡ AH τῇ HB ἴση· ἡ HX ἄρα*

p. 258, 7 *οὐκ ἄρα ἄνισος*] om. 8 *τῇ ZΔ. ἴση ἄρα*] *ἄρα ἴση ἐστὶ τῇ ZΔ* 11 *συμπίπτωσιν* 22 *ZΘ*] *ΘZ* 23 *ZΘ*] *ΘZ*

p. 260, 1 *τῇ*] *διὰ τοῦ X τῇ* 2 *καί*] *καὶ ἐπεί* 4 *ΓE*] *EΓ* 7 *μέν*] om. *ZE*] *EZ* 8 *διὰ τοῦτο*] *ἡ ΘZ ἄρα ἡ ZΘ*] om. 9 *HΘ*] *ΘH* 10 *ZΘ*] *EZ* 19 *τό*] om. 22 *ἡ ἄρα* — 23 *EX*] om. 24 *τῆς ΘK*] bis, sed corr. 25 *EX* — 26 *τῇ*] om. 27 *ὅπερ ἄτοπον*] om.

p. 262, 4 *ἀντικειμέναις κατὰ συζυγίαν* 14 *τό*] *ἔστω τό ἔστω*] om. 15 *καί*] *καὶ διὰ τοῦ X παράλληλος ἤχθω* 16 *ΘH*] *HΘ* 18 *ὁμοίως* — 19 *διάμετροι*] om. 28 *ἡ*] *δύο εὐθεῖαι ἡ*

p. 264, 5 *τὰ E, Z καί*] in ras. *ZE τῷ*] *EZ κατὰ τό* 7 *XH*] *HX* 11 *ἡ*] *ἐστιν ἡ* 13 *A*] *A ἄρα* 16 *ἐπί* — 17 *XA*] *XA ἐπιζεύγνυται ἐπὶ τὴν ἁφήν* 17 *παρά* — *ΓX*] *XΓ ἦκται παρὰ τὴν ἐφαπτομένην* 18 *XA, ΓX*] *AX, XΓ* 22 mg. *ἀνάλυσις* 27 *BΔ, EA*] *AE, BΔ*

p. 266, 1 mg. *σύνθεσις* 12 *ὑπόκειται*] *ὑπόκειται ἐνταῦθα*

τὸ Ε 15 mg. ἀνάλυσις 25 ἐστίν — τῇ] ἔσται τῇ ΕΔ ἡ 27 ΓΔ] ΔΓ ΓΔ] ΔΓ 28 mg. σύνθεσις

p. 268, 1 Α] Α σημεῖα 2 ἐπ' αὐτήν] ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὴν ΑΒ ΒΕ] ΕΒ 6 τῷ] κατὰ τό τῇ ΑΒ παράλληλος ἤχθω] διὰ τοῦ Δ παράλληλος ἤχθω τῇ ΑΒ 13 εὕρηται 16 τέμνει — δίχα] δίχα τεμεῖ καί ἄρα] om. ἐστίν] ἔσται 17 ΒΕ] ΕΒ 24 τό] ἔστω τό 26 ΚΑ] Α e corr. 27 ἄρα] ἄρα καί ΓΚ] ΚΓ

p. 270, 15 ἐπεζεύχθω — καί] om. 21 δύο ταῖς] δυσὶ ταῖς 22 τῇ] βάσει τῇ

p. 272, 4 τῇ (alt.)] ἡ 10 ΓΚ] τῆς ΚΓ 11 ΓΚ] τῆς ΚΓ 12 ΑΚ] τῆς ΚΑ ΚΣ, ΣΑ] ΑΣ, ΣΚ 13 ΡΚ] ΡΚ ἴσα ἐστί ἐστιν ἴσα] om. 16 ΜΡΝ] τῶν ΝΡ, ΡΜ 17 ΜΣΝ] τῶν ΝΣ, ΣΜ ΣΚ] ΚΣ in mg. ras. magna ἴσον] ἴσον ἐστί 18 ΜΡΝ] τῶν ΝΡ, ΡΜ ΡΚ] ΚΡ 19 ΜΣΝ] τῶν ΝΣ, ΣΜ ΣΚ] τῆς ΚΣ 20 διαφέρει] ὑπερέχει διαφέρει] ὑπερέχει 21 ΜΡΝ] τῶν ΝΡ, ΡΜ ΜΣΝ] τῶν ΝΣ, ΣΜ 22 διαφέρει] ὑπερέχει διαφέρει] ὑπερέχει 24 ΣΑ] τῆς ΑΣ ΜΡΝ] τῶν ΝΡ, ΡΜ 25 ΜΣΝ] τῶν ΝΣ, ΣΜ 26 ΜΡΝ] τῶν ΝΡ, ΡΜ

p. 274, 2 ΑΓΜ] ΓΑΜ 16 ἴση ἐστίν] ἐστιν ἴση

p. 276, 3 ΒΕ] ΕΒ 5 ΑΕ (alt.)] ΕΑ 6 τό (pr.)] om. 13 ΖΗ] ΗΖ 18 οὕτως] δὴ οὕτως 19 ἡ ΖΗ ἴση] ἴση ἡ ΗΖ 22 mg. μθ μ seq. ras. ὁ] ἡ 24 τομῆς] γραμμῆς comp. 25 τῶν] om. 28 τῆς] om.

p. 278, 13 οὕτως] δὴ οὕτως 20 οὕτως] om. 21 ΒΓ] ΓΒΔ 23 ΑΗ] ΔΑ, deinde del. θέσει δὲ καὶ ἡ τομή 25 ΓΗ] ΓΒ

p. 280, 2 τῶν] om. 8 ΜΝ] ΝΜ 14 Α] Η 17 καί — κείσθω] ἐπὶ τὸ Ν καὶ κείσθω τῇ ΑΘ ἴση ΘΝ] e corr. 27 καί (pr.)] om.

p. 282, 2 ΔΘ] ΘΔ ἐστί] om. 8 ΑΒ] ΒΑΗ 13 ΖΑ] ΖΑ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ε 17 γωνίαν — τόπῳ] ἑξῆς γωνίαν 18 τομήν] τομὴν τόπῳ 21 δή] δέ 28 ΑΚ] ΚΑ 29 ΚΘΑ] ΚΘ e corr.

p. 284, 1 πρὸς τῇ] παρὰ τήν 8 δή] e corr. 12 τῷ] κατὰ τό 13 καί — 14 κείσθω] ἐπὶ τὸ Η καὶ κείσθω τῇ ΒΘ ἴση 18 ΚΑ (alt.)] Α e corr. 20 τῶν ΖΘΠ] τῷ ὑπὸ τὴν ΖΘΠ τὸ σημεῖον 21 ἔσται] συσταθῆναι 25 mg. ν, να τῶν — ἔστω] ἔστω δή

p. 286, 5 ἤχθω] ἤχθω ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸν ΒΓ ἄξονα ΑΔ]

$\Delta$ e corr. 6 *καί* — 8 *AH*] mg. postea add. 17 *ὡς ἡ*] corr. ex *ἡ* *NK*] *HK* 18 *NM*] e corr. *KN*] *NK* 25 *ν′*] $\overline{\nu\alpha}$, *νβ*

p. 288, 5 *ΓΔ*] *ΔΓ* 6 *BΔΓ*] *BΔ* *BΓ*] *ΓB* 8 *τῆς δὲ BΔ*] *τῇ δὲ ΔB* 18 *EZ*] *ZE* *κάθετος*] *ἀπὸ τοῦ E τῇ ZH πρὸς ὀρθάς* 19 *δίχα ἡ ZH*] *ἡ ZH δίχα* *τῷ*] *κατὰ τό* 20 *ΘE*] *EΘ* *τῶν*] om. 21 *τῶν*] om. *BΓ*] *ΓB* 22 *ΓΔ*] *ΔΓ* 23 *ΓΔ*] *ΔΓ* 24 *τῶν*] om. *τῇ*] *γωνία τῇ* *τῶν*] om. 25 *ἴση ἐστίν* 29 *οὕτως*] om. *τήν*] om.

p. 290, 1 *Z*] *πρὸς τῷ Z* 2 *Δ γωνίᾳ*] *πρὸς τῷ Δ* 3 *νβ*, *νγ* *ἡ*] *δὴ πάλιν ἡ* 13 *πρὸς τῷ X*] *ὑπὸ ΓXE* *XE*] *EX* 14 *ΓX*] *XΓ* 15 *ἡ ΓX*] *ἐστὶν ἡ XΓ* 20 *Z*] *P* *ZΔE*] *PΔE* 22 *γωνίαν ὀξεῖαν* 25 *δοθεῖσα*] *δοθεῖσα τομή* 27 *τῶν*] om. *τῶν*] om. 29 *HΘ*] corr. ex *ΘZ*

p. 292, 5 *τήν*] om. 6 *πρὸς AZ ἄρα*] *ἄρα πρὸς AZ*

p. 294, 4 post *XEΔ* del. *πρός* *HK*] corr. ex *EΓ* *δι’* — 6 *MKΘ*] om. 10 *πρὸς τῷ Δ*] *ὑπὸ ΓΔE* 12 *νδ*, *νε* *ἡ*] *δὴ ἡ* 14 *ταὐτά*] *τὰ αὐτά* 17 *τῶν*] om. 19 *ΓX*] $\overline{\chi}$ 20 *δή*] *δέ*

p. 296, 2 *EX*] lacuna 5 *ἡ*] *δὲ ἡ* 8 *τῶν*] om. 9 *ZH*] *HZ* 11 *KZ*] *ZK* 12 *ἔστω*] om. *τό*] *ἔστω τό* 13 *τῶν AXΓ*] *AΓX* 16 *τῶν* (alt.)] om. 18 *καί*] om. 19 *ZΘ*] *ΘZ* 21 *οὕτως τό*] *οὕτω τό*, *τ* corr. ex *σ* 23 *ὡς*] *ἔστιν* 24 *HΘK*] *τῶν KΘ*, *ΘH* 25 *οὕτως*] om. *KΘ*] *K* e corr. 27 *ZΘ*] *ΘZ* *EΓ*] *E* e corr. 28 *οὕτως*] om. *τήν*] om.

p. 298, 2 *γωνίᾳ* — *ἴση*] *ἴση ἐστίν* 4 *να′*] *νδ*, *νε* 9 *ἡ Θ*] *ἡ HΘ* 17 *AΔ*] *ΔA* 23 *ἴσην*] *ἴση* 24 *ἡ EΓ*] om. *Θ*] *πρὸς τῷ Θ* 25 *ἴση*] *ἴση ἐστί* *EΓΔ*] *ΔΓE* 26 *Θ*] *πρὸς τῷ Θ* *ἄρα*] *ἄρα γωνία* *EΓΔ*] *ΔΓE* 27 *νϛ*, *νζ*, *ζ* in *ε* mut. *ἔστω*] *ἔστω δή* 28 *ET*] *EΓ*, *Γ* e corr.

p. 300, 4 *EHΔ*] *τῶν ΣH*, *HΔ* 13 *τόν*] corr. ex *τοῦ* 15 *ZK*, *KΘ*] *KΘ*, *KZ* 19 *EΓH*] *EΓK* 20 *τὸ ZΘK τῷ*] *τῷ ZΘK τό* 21 *ΘZK γωνία*] *ZKΘ* *ΓEΔ*] *EΓΔ* 25 *τῷ*] *ἔστω* *XΨ*] *ΨX* 26 *τετμήσθω δίχα*

p. 302, 2 *τῇ Ω ἴσην*] *ἴσην τῇ Ω* 14 *XΦ*] *ΦX* *ἡ*] e corr. 15 *MAK*] *τῶν MA*, *AK*, alt. *A* e corr. 16 *AK*] *τῆς KA καί* 17 *AK* (pr.)] *KA*

p. 304, 1 *AK*] *AH* 11 *Z*] *πρὸς τῷ Z* *E*] *ὑπὸ TEA* 16 *ΓH* — 17 *ἀπό*] om. 20 *ZKΘ*] *ZΘK* 25 *νβ′*] *νζ*, *νϛ*

p. 306, 11 *ZE τῇ AB*] *AB τῇ ZE* · 15 *AΓB*] *AΓB γωνία* 17 *ἐστιν*] om. 18 *AB*] *BA* 21 *K*] *H* 23 *τὸ ἀπὸ*

*EK* — 24 *EΓ*] om. 25 post *EΓ* del. *τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ* 26 *KZ*] *EZ* *οὐκ* — 27 *KZ* (alt.)] om.

p. 308, 5 *η NΞ πρὸς ΞΜ*] om. 6 *ΥΜ*] *ΥΚ* 9 *ΡΣ*] *ΡΣ ἐπὶ τὴν ΞΧ* 10 *ΟΝ*] *ΝΟ* 17 *ΥΣ*] *ΣΥ* 18 *ἡ*] *ἡ ἄρα* 20 *ΤΟ*] *τὸ ΟΤ*

p. 310, 1 *ΥΞ*] *ΞΥ* 7 *ὑπὸ*] *ἀπὸ τῶν* 9 *ΜΞΝ*] *τῶν ΝΞ, ΞΜ*, alt. *Ξ* corr. ex Z 14 *ἴση*] om. 19 *νγ'*] *νζ, νη* 20 *ἥτις* — 21 *ἁφῆς*] bis, sed corr. 23 *εἶναι*] in ras.

p. 312, 8 *ἄρα*] *ἄρα ἐστίν* 10 *ΓΑ*] *ΑΓ* 13 *γωνίᾳ*] om. 14 *ἐστίν* — 15 *Υ*] *τῇ Υ ἴση ἐστίν* 18 *κύκλος*] *σ∸ο^{ος}* (*διάμετρος*) 27 *ΟΜ*] *ΜΟ*

p. 314, 2 *ΝΟ*] *τῆς ΟΝ* *τό*] *τῷ* 3 *τῷ*] *τό* corr. ex *τῷ* *τό*] *τῷ* *τῷ*] *τό* corr. ex *τῷ* 4 *τῷ*] *τό* 8 *τετμήσθω δίχα* 12 *τήν*] om. 14 *ϛΑ'*] $\overline{\text{ϛα}}$ *ΦΝ*] *ΦΥ* 15 *Α'ϙ*] *ϙα* 16 *Α'ϙ*] *ϙα* 18 *παράλληλος* — *ΦΨ*] *παράλληλοι ἤχθωσαν τῇ μὲν ΟΠ ἡ ΙΞ τῇ δὲ ΝΡ ἡ ΞΥ καὶ ἔτι τῇ ΟΠ ἡ ΦΨ* 19 *Α'ϙ*] $\overline{\text{ϙα}}$ *ἡ* (alt.)] *οὕτως ἡ*

p. 316, 1 *ΣΞ*] corr. ex *ΕΞ* *ϛΑ'*] *ϙα* 2 *καί* — 3 *ΞΣ*] mg. 6 *Ε σημείῳ*] *πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Ε* 10 *ΑΕΚ*] corr. ex *ΑΕΖ* 11 *ΞΣΠ*] *ΞΣΠ τρίγωνον* 12 *ΚΕΑ*] *ΚΑΕ* 15 *ΣΞΠ*] *ΞΣΠ*, *Σ* e corr. 16 *τῷ*] *τό* *τὸ ΜΞΠ*] *τῷ ΞΜΠ* 21 *ΗΘ*] *ΗΘ ποιοῦσα* 22 *ποιοῦσα*] om. 23 *ὅπερ* — 24 *ποιῆσαι*] om. In fine: *τέλος τοῦ* $\overline{\beta}$ *τῶν κωνικῶν*

p. 318, 7 *ΒΔ*] *ΔΒ* 10 *ΓΒ*] *ΓΔ* 13 *ΕΒΓ*] *ΓΕΒ τριγώνῳ* 14 *ΒΔ*] *ΔΒ* 16 *ΑΔΒΖ*] *ΑΒΔΖ* 18 *ἴσον ἐστί*] om. *τριγώνῳ*] *τριγώνῳ ἴσον ἐστίν*

p. 320, 5 ante *ΖΗ* del. *ΗΒ* 8 *ΔΗΒ* (pr.)] *τὸ ΔΗΒ*

p. 322, 12 *περιφερείας*] *τοῦ κύκλου περιφερείας* 16 *γάρ*] *δή*

p. 324, 1 *τό*] *τῷ* *τρίγωνον*] *τριγώνῳ* 2 *τῷ*] *τό* *τετραπλεύρῳ*] *τετράπλευρον* *τό*] *τῷ* *τῷ*] *τό* 4 *τὸ ΓΗ* — *τετραπλεύρῳ*] bis *ΜΠ*] *ΠΜ* 18 *ΒΔ*] *ΔΒ* 19 *ΒΔΖ*] *ΒΔΖ τριγώνῳ* 23 *ἂν εἴη*] *ἄρα ἐστὶ καί*

p. 326, 12 *Α, Β*] *ΑΑ, ΒΗ* 13 *ΔΖ*] *ΖΔ* 14 *ΓΔ καί*] *ΓΔ ἐπιζευχθεῖσα* 15 *αἱ*] *ἔτι αἱ* 16 *τῆς τομῆς*] *μιᾶς τῶν τομῶν τῆς ΒΗ* 18 *ΗΜ*] *ΗΜ καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΖΔ ἐπὶ τὸ Κ* *ΚΘΔ*] *ΚΔΘ τριγώνου* 24 *ΜΗΘ*] *ΜΗΘ τρίγωνον* 26 *καί* — 27 *τετραπλεύρῳ*] om.

p. 328, 4 *ταῖς ἐφαπτομέναις*] om. 10 *καί*] comp. in ras.

12 τῆς] τῆς *AB* 14 ἐστὶν ἴσον] ἴσον ἐστίν 15 οὖν] γάρ εἰσιν 20 ἐφ'] ἀφ'

p. 330, 6 ἴσον ἐστίν 13 *TK*] *ΓK* τό] supra scr. 20 τό] τῷ τῷ] τό 21 τό] supra scr.

p. 332, 3 *ΞBΔ*] *ΞΔB* *ΘBZ*] *BΘZ* post ἐναλλάξ add. ὡς τὸ *ΓTA* πρὸς τὸ *ΞΔB* τὸ *AΘH* πρὸς τὸ *BΘZ* 4 *AHΘ*] *AΘH* *ΘZB*] *BΘZ* *TAΓ*] *ΓTA* *ΔBΞ*] *ΞΔB* 6 ἴσον] corr. ex ἐστιν τῷ] ἐστι τῷ 10 *AEZ*] E e corr. ἴσον] ἐστιν ἴσον 15 τὸ μέν] μὲν τό 18 ἐστί] ἔσται 21 τὸ δὲ *AEZ*] postea ins. 22 καί — τετραπλεύρῳ] mg. ἴσον] ἴσον ἐστί 23 *KΓ*] *KMΓA*

p. 334, 4 μεῖζόν ἐστι τό] bis 5 *TΩA*] *TΩAT* 6 δέ] δή 7 μεῖζον — 10 τό τε] in ras. 8 *AEZ*] *EZΩ* 10 *TET*] *TTE* 11 *TΩA*] *TΩA* 12 μετά] μεταξύ 14 *KΞETX* 18 ἐφ'] e corr.

p. 336, 1 ἐπεξεύχθω 6 *AΔ*] *AB* *EΘ*] *EΘH* 14 *BMZ*] *BZM* 15 καί] om. διαφέρει τοῦ *AKA*

p. 338, 18 γάρ] om. 19 ἐφάπτεται] -ε- e corr. 24 *KΘH*] τῶν *KH*, *HΘ* 25 *BΘ*] τῆς *BΘ* e corr. *KΘ*] *HΘ* ἡ *BΘ* — 26 πρός (alt.)] mg. 26 *HΘ*] *ΘH* *KΘ*] *KB*

p. 340, 2 *ZΘ*] *ΘZ* *HΘ*] *ΘH* 4 *BΘZ*] *AΘZ* 15 *ΞPΣ*] *PΞΣ* 16 *ΞΣT*] *ΣTΞ* τριγώνου 17 *ΘBZ*] *BΘZ* 24 ὃν ἔχει ἡ] τῆς ἐκ] om. τοῦ πρός — 25 πλευρά] πλαγία πλευρὰ τοῦ παρὰ τὴν *AM* εἴδους

p. 342, 1 πρὸς τῇ] παρὰ τήν post εἴδους del. πρὸς τὴν ὀρθίαν, ἀλλ' ὡς ἡ *AT* πρὸς *TH*, ἡ *ΞT* πρὸς *TΣ* πλαγία] πλαγία πλευρά 2 πρὸς τῇ] παρὰ τήν 3 συνημμένον] συγκείμενον 4 ὃν ἔχει ἡ] τῆς τουτέστιν ἡ] τουτέστι τῆς 5 *TO*] *TΘ* πρὸς τῇ] παρὰ τήν 8 *ΞTΣ*] *TΞΣ* 24 σημεῖόν τι] τυχὸν σημεῖον 26 *ΘAZ*] *ΘZA*

p. 344, 1 ante *BT* del. *AE* διὰ τοῦ *BT*] *B* e corr. 10 *BT*] *BΓ* 12 ἡ *TB*] bis 13 καί] e corr. 20 τό] τῷ τῷ] τό *MN*] *MN* τῷ δέ seq. lac. 23 τὸ ἀπὸ *HΘ*] om. 24 ἐναλλάξ — 25 *ΓBΘ*] om. 27 *HΘI*] *KΘI* 28 *ΔBE*] δὲ *ΔBE*

p. 346, 1 *ΓBΘ*] *B* e corr. 2 *IΘH*] *H* e corr. 3 *ΘB*] e corr. 5 *ΠM*] *MΠ* 6 *TB*] *ΓB* *ΞH*] *ΞN* 9 *ΞH*] *ΞN* 12 συνημμένον] συγκείμενον 13 τε] om. ὃν ἔχει ἡ] τῆς καί — 15 *ΞH*] postea ins. 13 ἡ] τῆς 14 τουτέστιν ἡ] τουτέστι τῆς 19 ἴσης] ἴση γαρ

p. 348, 12 *ΓB*] *BΓ* 17 παράλληλος] παράλληλος ἤχθω

18 φανερόν] φανερὸν οὖν 28 ὑπό] ἀπό 29 ΔΛ] ΛΔ τετράπλευρον

p. 350, 1 τρίγωνον — πρὸς τό] mg. 2 ὡς] postea ins. 7 ὡς] ἄρα ὡς 9 ΛΗΕ] ΛΕΗ 11 τό — ἐναλλάξ] lacuna 17 γραμμήν] τομήν 21 κατά] ἀλλήλαις κατά 26 διάμετροι] corr. ex διάμετρος comp.

p. 352, 1 ΔΞ] ΔΘ 2 ἐστιν ἴση] ἴση ἐστίν 3 ΗΔ] Δ e corr. 5 ΚΖΕ] ΖΚ, ΚΕ 17 ὅλον] om. ΜΕΙ] ΙΕΜ 18 ΙΜΕ] ΙΕΜ 20 οὕτως] om. 21 πρός — 22 ὑπό] in ras. 22 ΖΞ] e corr. 23 ΖΞ] ΞΖ 24 ΞΖ] ΖΞ οὕτως] om. 25 ΓΠΒ] ἀπὸ τῆς ΓΠ 26 ΓΠΒ] τὸ ΓΠΒ

p. 354, 1 ΚΖΕ] τῆς ΚΖ 24 ΔΞΟ] ΔΟΞ 25 πρὸς τὸ ΕΟΛ] om. 26 ΞΔΟ τρίγωνον] ΔΟΞ 29 ΟΕ] ΕΟ

p. 356, 1 τρίγωνον] om. 2 ΒΓ πρὸς τό] om. 7 οὕτως] om. 19 κέντρον — 21 ΑΖΔ] om.

p. 358, 1 ΑΖΣ — 2 ἄρα τό] postea ins. m. 1 1 τρίγωνον] τετράπλευρον 3 ΗΛΙ] τῶν seq. lac. 5 ΜΛΞ] ΜΞ, ΞΛ 10 παρὰ τὴν τάς] in ras. 15 τό] οὕτω τό 16 εὐθειῶν] εὐθείας 17 ἀπολαμβανομένης] corr. ex ἐφαπτομένης τετράγωνον 21 διά] e corr. 24 ΖΛ] ΖΛ οὕτω ΚΛΞ] τῶν ΛΚ, ΚΞ 26 ἀπό] διά

p. 360, 2 ΚΛΞ] τῶν ΛΚ, ΚΞ 4 ΒΡΖ] ΒΖΡ 5 ΛΛΝ] ΛΛΗ 6 ὑπὸ ΒΖΔ] ἀπὸ ΒΖ 7 ΚΛΞ] τῶν ΛΚ, ΚΞ 8 ΛΖΘ] ΛΖΘ τρίγωνον τό (pr.)] om. 9 ΖΛ] Λ e corr. 10 ΚΛΞ] τῶν ΛΚ, ΚΞ ΛΛ] ΛΑ 19 πρός — 20 συμπτώσεως] om.

p. 362, 1 ΚΟΦΙΧΩΨ 5 καί] καὶ ὡς 6 ΞΟΨ καί] ΞΟΨΛ τετράπλευρον ΞΗΜ] ΞΗΜΛ τετράπλευρον 7 ΞΟΨ] ΞΟΨΛ 8 ΞΗΜ] ΞΗΜΛ 9 ΝΟΗ] τῶν ΝΜ, ΜΟ 11 ΗΟΨΜ] Μ e corr. 12 ΚΟΡΤ] ΚΟΡΠ 13 ΒΖ] τῆς ΔΖ e corr. 24 τῇ] e corr. 26 τῶν τομῶν] τῆς τομῆς 27 τῶν — συμπτώσεως] om. lacuna magna relicta

p. 364, 2 αἱ] παράλληλοι αἱ παράλληλοι ἔστωσαν] om. 3 ἡ μὲν ΕΞΗ] om. παρά] παρὰ μέν 4 ἡ δέ] ἡ ΕΞΗ, παρὰ δὲ τὴν ΑΓ ἡ παρὰ τὴν ΑΓ] om. 5 τό] οὕτω τό 7 διά — ΑΓ] παρὰ τὴν ΑΓ διὰ τῶν Η, Ξ ΞΝ, ΗΖ] ΗΖ, ΞΝ, Ζ e corr. 8 post ΒΔ ras. 2 litt. 9 μέν] μέν ἐστιν 10 ΗΖ] Ζ e corr. 11 ὡς] om. 19 ἄρα] ἡ ἄρα 25 ἀχθῶσι] in ras. 26 καί] κατά comp.

p. 366, 5 κατά] bis, sed corr. 8 ἐπιζευχθεῖσαι καί] om. 9 τοῦ] τῶν 14 ΣΤ] ΟΤ 15 ἀπό — ΟΤ] ἡ ΟΤ

διὰ τοῦ *O* 21 *ΠΤΣ*] *T* e corr. 22 *ΘΞΣ*] τῶν *ΘΣ*, *ΣΞ* 25 *EA*] *ΣA* 27 δέ] δὲ καί τρίγωνον] om.

p. 368, 1 *EA*] corr. ex *EΔ* 10 τῇ — 12 παραλλήλου] mg. 12 τῇ ὀρθίᾳ] etiam in mg. 20 *TET*] *HET* 21 ὅ] ὅν 27 *EA*] e corr.

p. 370, 1 *ΣAΦ*] τῶν *ΓA*, *AΦ* 5 *AE*] *EA* 7 ὁ] καὶ ὁ 8 τὸ ἀπὸ *AE* — 9 *ΔE*] mg. in ras. 10 *AE*] *EA* 11 *AE*] *EA* 12 τῷ (alt.)] τό 13 ἐστί] om. *KZΘ*] *KZ*, *ZΘ* *AΘZ*] τῶν *AΘ*, *ΘΞ* 14 ὡς — 16 *AΘZ*] mg. in ras. 16 *AΘZ*] τῶν *AΘ*, *ΘΞ* mg. λείπει ἄλλο πάλιν 19 *ZΞA*] τῶν *ΞZ*, *ΞA* 20 *KΞΘ*] τῶν *HΞ*, *ΞΘ* *KZΘ*] τῶν *KΞ*, *ΞΘ* corr. ex τῶν *KZ*, *ZΘ*; deinde rep. καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν *KZ*, *ZΘ* 23 *AΞZ*] τῶν *AΞ*, *ΞΔ* ἀπό — 24 τῷ] om. 25 *AΘZ*] τῶν *AZ*, *ZΔ*

p. 372, 1 τό (tert.)] corr. ex τῷ 4 ἔστω δέ] ἀλλ' ἔστω δή *ΣEK*] *ΣET* 8 *ΠMN*] τῆς *ΠM*, *MN* 10 *AΘZ*] τῶν *ΘA*, *AZ* 11 *ΠΞN*] τῶν *TΞ*, *ΞN* 13 ante δεικτέον lacuna 17 μετά — 18 *KΞΘ*] om. 19 τό (alt.)] τοῦ 27 τό] τῇ post *OΞN* lacuna 8 litt.

p. 374, 3 τῆς — τετραγώνῳ] om. 10 τό — 13 πρός] mg. 12 *AΞΣ*] *AΞ*, *ΞΣ* 14 *ΣTA*] τῶν *NΣ*, *ΣO* 19 ὅτι] om. 25 ὅ] ὅν 27 ἀπό (alt.)] supra scr.

p. 376, 2 post *PΞH* add. πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν *KΞ*, *ΞΘ* μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς *AE* 4 πρός — 5 *AE*] om. 13 ὑπό (pr.)] ἀπὸ τῶν 14 κζ'] corr. ex $\overline{\kappa\eta}$

p. 378, 10 καί] om. 15. ὅμοιον] τὸ ὅμοιον 18 ὅμοιον] τὸ ὅμοιον 21 ὅμοιον] τὸ ὅμοιον *BΞΔ*] *BΞ*, *ΞΔ* 24 *NΘ*] *Θ* e corr. 28 ἐστι] εἰσι

p. 380, 1 εἴδη] εἴδη ἄρα τῇ] τῷ 4 *ΞEA*] τῶν *ΞE*, *EA*, *A* e corr. 9 ὁμοίως — 11 *BE*] om. 11 *BAΔ*] τῶν *BA*, supra scr. *AΔ* 12 *AE*] $\overline{EA}$ 14 *ΓA*] *AΓ* 16 προλαμβάνοντα 19 κη'] corr. ex $\overline{\kappa\vartheta}$

p. 382, 4 διάμετροι δὲ αὐτῶν] ὧν διάμετροι 13 *Z*] *Ξ* 22 μετά] in ras. τοῦ (pr.)] corr. ex τό 29 ἀπὸ *ZΘH* — p. 384, 2 *ZΘH*] mg. 29 *ZΘH*] τῶν *ZH*, *HΘ*

p. 384, 2 *ZΘH*] τῶν *ZH*, *HΘ* τὰ ἀπὸ τῶν *ZH*, *HΘ* 21 ὅτι] οὖν ὅτι *ΞHO*] τῶν *ΞN*, *NO* 23 τουτέστι τὸ δίς] postea ins. m. 1 ὑπό] ὑπὸ τῶν supra scr. 26 τῶν — ὑπερέχει] ὑπερέχει τῶν ἀπὸ τῶν *ΞH*, *HO*

p. 386, 2 *ΞHO*] τῶν *ΞH*, *HO* corr. ex τῶν *ΞHO* *EA*] τῶν *AE* 8 τό (pr.)] τά 12 *AΔΓ*] *AΔ*, *ΔΓ* συμπίπτουσαι κατὰ

τὸ Δ αἱ] supra scr. 21 ΘΒ] ΒΘ 22 τήν — 23 πρός] mg. 23 ἀλλ' — 24 ὀρθίαν] om. 26 ἐστί] om.

p. 388, 5 τοῦ — ἐστί] mg. τῷ] in ras. 7 εἰσι παράλληλοι 17 ΑΓΒ] ΑΓ, ΒΓ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Γ ΑΒ] ΒΑ 18 ΖΕ] ΕΖ 19 ΖΕ] ΕΖ 20 ἴση] ἴ- corr. ex ε 25 ΝΕΚΜ] ΕΝΚΜ 26 ΓΔ] ΕΔ

p. 390, 12 μέν] om. 19 διά — 20 τῆς] in ras. 26 ΓΑ] ΑΓ ἐπί] ἡ ΖΔ ἐπί

p. 392, 1 ΚΑ] ΘΑ 2 ΘΑ] ΑΚ 3 διά] γὰρ διά Β, Δ] Δ καὶ Β 6 ΗΜΒ] τῶν ΒΜ, ΜΗ 7 ΔΒ] Β e corr. 11 ΖΘ] ΞΘ 27 ΔΗ] ΔΗ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Η 29 ΘΗ] ΗΘ

p. 394, 1 ὅτι] ὅτι ἡ ΑΔ 3 ΑΜΝ] ΑΜΝ συμπίπτουσα τῇ ΓΖ (in ras.) κατὰ τὸ Ν 8 ὑπὸ ΒΞΕ] ἀπὸ τῆς ΞΕ 11 τό] τῷ τῷ] τό 12 τό] τῷ τῷ] τό 14 ΜΠ] ΠΜ ΑΘΗ] τῶν ΗΘ, ΘΑ 17 τοῦ] supra scr. ἴσον ἄρα] in ras. 18 τό — 19 ἄρα] mg. 18 τοῦ] om. 19 εὐθεῖα] ἡ ἡ ΑΗ] ΗΑ δίχα εἰς μὲν ἴσα] om. 20 ΜΠ] ΠΜ

p. 396, 10 Β] corr. ex Γ ΔΕ] ΕΔ ΒΚ] ΚΒ 13 ΓΚ] ΚΓ 15 ΓΗ] ΗΓ ΑΓ] ΓΑ 16 τῆς] τῇ ΓΗ τῆς ΑΓ] ΗΓ τῇ ΓΑ 20 ἀχθῇ τις εὐθεῖα 22 εὐθείας] εὐθείας πρὸς ἄλληλα 23 γάρ — ὑπερβολή] ὑπερβολὴ ἡ ΑΒ 25 ΓΑΔΖΗ] ΓΑΔΖΗ 27 ΑΔ] ΔΑ

p. 398, 1 ΖΥ] ΥΖ 4 ΔΣ] ΔΣ ἐστιν ἴση 5 ἴση] ἴση ἐστίν ΔΥ] ΥΔ 6 ΔΥ] ΥΔ 11 ΚΝ] τὸ ΚΝ ut saepius 12 ΔΒ] ΒΔ 13 ΔΟ] ΔΕ 15 τὸ ΔΜ] τὸ ΑΜ e corr. 17 τῷ] corr. ex τό

p. 400, 2 ἁφῆς] om. 12 ἤχθω] om. 13 ἡ ΚΒΛ] ἤχθω η ΛΒΚ οὕτως] om. 18 ἡ ΔΘ — 19 ΗΘ] om. 23 τὸ ΓΘ] ΓΘ 24 τό] om. 26 ἴση ἐστίν] e corr. 28 ἴσον (pr.)] ἴσον ἐστί

p. 402, 1 ΡΗ] ΗΡ 2 ΒΓ] ΘΒ 3 ΑΘ] τὸ ΑΘ 4 ΓΘ] τὸ ΓΘ 12 τις] τις εὐθεῖα 15 τῆς] τῆς ἐπί 18 ΓΖ] ΖΓ ἡ ΖΕ — p. 404, 3 ΓΔ] bis

p. 404, 1 τὰς ΑΘ, ΑΓ] μὲν τὴν ΑΘ 2 ΔΠ — ΝΔΟ] ΛΖΚΜ, ΝΔΟ, παρὰ δὲ τὴν ΑΓ αἱ ΖΡ, ΔΠ 3 ΖΓ] Γ e corr. ΑΖ] corr. ex ΑΞ 10 ΔΠΟ] ΔΟΠ

p. 406, 2 ἐπί] om. ἐπιζευγνυούσης 3 ΒΓ] ΓΒ 12 ἀπό] διά 14 ΔΘΗΞΝ] ΔΗΞΝ 18 ΑΔ] Α e corr. 22 τὸ ἀπὸ ΖΟ — 23 ὡς] om.

p. 408, 8 Δ] Ε 9 ΕΗ] ΕΖ 12 ΕΘΣΚ 13 ΖΡ] ΖΡ ἐκβεβλήσθω δὲ καὶ ἡ ΑΔ ἐπὶ τὸ Σ 17 ΖΜ] Ζ e corr. ΞΜ] ΜΞ ΘΕ] τῆς ΕΘ 18 ΜΖ] τῆς ΖΜ ἀπὸ

*ΘΣ* — 19 *MZ τό*] om. 19 *EΘΠ*] *ΣΘΠ* 21 *ΞM*] *τῆς MΞ* 22 *EΘΠ*] *EΘ* 24 *AΞN*] *AΞM* 26 *τό* (pr.)] *ὡς τό*

p. 410, 1 *KA*] *τῆς AK* 2 *ἀπὸ EH*] *EH* *ZH*] *τῆς HZ* 17 *ἐπεζεύχθωσαν* *ἡ*] *αἱ* 18 *ἡ ΓΔE*] *ΔΓE* *EB*] corr. ex *B* *ἀπό*] *διά* 19 *ἀπό*] *διά* 20 *ὡς* — *ΔE*] *διήχθω τις εὐθεῖα τέμνουσα ἑκατέραν τῶν τομῶν καὶ τὴν ZH ἐκβληθεῖσαν ἡ ΘEKA* 25 *KΠ*] *ΠK*

p. 412, 2 *KEO*] *KOE* 8 *καί*] in ras. 11 *μετά*] bis, corr. m. rec. *τρίγωνον*] om. 12 *τριγώνου*] om. 13 *τρίγωνον*] om. 14 *τρίγωνον*] om. 15 *τρίγωνον*] om. 16 *τρίγωνον*] om. 17 *ΠΔO*] *ΔΠO* 18 *MN πρὸς τὸ ἀπό*] om. 21 post *ΞA* del. *πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΞA* 24 *AK*] *τῆς AK* e corr.

p. 414, 5 *τὸ H*] e corr. 12 *ἐρχέσθω*] *ἐρχέσθω δή* 15 *AΓ*] *ΓA* *διὰ μέν*] *μὲν διά* 18 *διάμετρος* — 19 *ἐπεί*] bis, sed corr. 23 *ἔστιν*] *ἔστιν ἄρα* 27 *διπλασία*] *διπλῆ* 28 *AΓ*] *ZΓ* *ΓΞ*] *ΓE* *EΓ*] *ΞΓ* *ΓZ*] *ΓA*

p. 416, 1 *καί*] *καὶ ἀνάπαλιν ὡς ἡ EΓ* (*E* e corr.) *πρὸς ΓZ, ἡ AΓ πρὸς ΓΞ* *EΓ*] *ΓE* *AΞ*] *AΞ καί* 3 *AN*] *NA* 6 *AΔ*] *AΔ καί* 13 *AΞ*] *ΞA* 14 *AΔ*] *ΔA* 15 *ΓΞ*] *Ξ* e corr. 18 *καὶ ἡ ΓZ*] *ἐδείχθη δὲ καί, ὡς ἡ ΓΞ πρὸς ΞA, ἥ τε ΓZ* 23 *παρά*] *δύο εὐθεῖαι παρά*

p. 418, 1 *ΔB*] *BΔ* 17 *AB*] *AM* 20 *ZA* (pr.) — *KZ*] mg.

p. 420, 1 *ἡ BZ*] e corr. 7 *τῷ*] *τῷ ἀπὸ τῆς ZH τῷ* 25 *ἴση*] *ἴση ἐστίν* 26 *διπλῆ*] *διπλῆ ἐστι* 28 *ἐστι* — p. 422, 1 *τετραπλάσιον*] mg.

p. 422, 1 *τό*] *καὶ τό* *ABN*] *τῶν AB, BN, N* e corr. 11 *ἥ* (pr.)] om. 12 *ΓAZ, EBH* 13 *ZH*] *HZ* 16 *ἴσον*] *ἴσον ἐστί* 20 *ZH*] *HZ* 23 *AZ*] *ZA* 24 *ὡς*] supra scr.

p. 424, 12 *ποιοῦσι*] *ποιήσουσι* 16 *BΔ*] e corr. *ΓEΔ*] *ΓΔE* 18 *τό* (pr.)] *τό τε* 20 *γωνία* — 21 *ἐστιν*] *ὀρθαί εἰσιν* 25 *ἐστί*] om. 29 *ΓAZ*] *ZAΓ* *AΓZ*] *AZΓ*

p. 426, 1 *AZΓ*] *AΓZ* 3 *λοιπή*] *ὅλη* 6 *ἡ καταγραφὴ τοῦ σχήματος ὁμοία τῇ ἄνωθεν* mg. 11 *ὀρθή*] om. 12 *κύκλος*] postea add. comp. 20 *ἴση*] om. *AΓZ*] *AΓZ ἐστιν ἴση* 21 *BΔH*] *BΔH ἴση ἐστίν*

p. 428, 7 *ἴση*] *ἴση ἐστίν* 13 *AΘΔ*] *AΘΔ τριγώνῳ* 16 *ΔΘ*] e corr. 19 *τῷ*] *τοῖς* 20 *ΓZ*] *ZΓ* 22 *ΓA*] *ΓA καί* 24 *καί* — *KA*] om. 27 *KA*] *τὴν KA* 28 *ΔE* (alt.)] *ΔH*

p. 430, 13 *αὐτῷ*] *αὐτῷ εἰσι* 15 *ἴση*] *ἐστιν ἴση* 23 *BΘ*] *ΘB* 25 *ὀρθή*] *ὀρθή ἐστιν*

p. 432, 2 *ΒΔΗ*] *ΗΔΒ* 3 ὑπό (alt.)] corr. ex ἀπό 6 ν′] corr. ex μ̄

p. 434, 1 ἴση] ἴση ἐστίν ἴση] ἴση ἐστί 2 ἡ δέ — 3 τῇ ὑπὸ *ΕΜΗ*] ἀλλ' ἡ μὲν ὑπὸ *ΓΕΖ* ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ *ΕΜΗ*, ἴση δὲ καὶ ἡ ὑπὸ *ΔΕΗ* τῇ ὑπὸ *ΜΕΗ* 4 καί] om. 8 ἴση ἡ *ΘΑ*] ἡ *ΑΘ* ἴση 21 τὴν γραμμήν] μίαν τῶν τομῶν τὴν *Β ΖΔ*] *ΔΖ* 22 ὑπερέχει] μείζων ἐστί 23 ἤχθω] ἤχθω γάρ 28 ἴση] ἴση ἐστίν

p. 436, 1 ἐστιν ἴση] ἴση ἐστίν 2 *ΖΕ*] *ΕΖ* ἐστι διπλῆ] διπλῆ ἐστι 13 *ΑΒ*] *ΑΒ* κέντρον δὲ τὸ *Η* 15 *ΑΔΒ*] *ΒΔ*, *ΔΑ* 16 *ΓΕΔ* (pr.)] *ΓΕ*, *ΔΕ* 18 κέντρον — 19 αὐτοῦ] διὰ τοῦ *Η* 19 *ΓΕ*] *ΓΕ* ἤχθω 20 *ΖΕΓ*] *ΓΕΖ* 21 ἴση] ἐστιν ἴση 22 καὶ ἡ] ἡ 23 ἴση] ἐστιν ἴση 24 ἴση] ἴση ἐστίν 26 ἡ *ΓΕΔ*] ἄρα ἡ *ΓΕΔ* ἐστι] om.

p. 438, 10 τεταγμένως κατηγμένην] τεταγμένην 11 διήχθωσαν] ἐπεζεύχθωσαν 21 *ΖΑ*] *ΒΑ* 26 *ΓΕ*] *ΕΓ* 27 ἐκ] λόγος ἐκ

p. 440, 21 δίχα τετμήσθω] τετμήσθω δίχα

p. 442, 12 *ΝΒΜ*] τῶν *ΜΒ*, *ΒΝ* post *ΑΘΚ* magna lacuna 14 *ΝΓ*] τῶν *ΝΓ* corr. ex τῶ *ΝΓ* *ΝΒΜ*] τῶν *ΜΒ*, *ΒΝ* 18 *ΚΘ*] *Θ* e corr. 21 *ΝΒΜ*] τῶν *ΝΒ*, *ΒΜ*, *ΒΜ* in ras. τὸ ὑπὸ *ΗΓ*] in ras. 24 ἔχει τὸ ὑπό] τῶν *ΑΜ*] e corr. 27 τοῦ τοῦ] τε τοῦ corr. ex τὸ τοῦ 28 ἀλλ' ὡς μέν] in ras.

p. 444, 3 τοῦ τοῦ] τε τοῦ 23 *ΖΔΘ*] *ΔΘ* e corr. 24 ἀπὸ *ΓΗ* — 25 *ΝΔ*] ὑπὸ τῶν *ΑΗ*, *ΗΔ* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *ΓΗ* τὸ ὑπὸ τῶν *ΑΘ*, *ΔΝ* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *ΑΔ* 26 *ΑΔ*] *ΔΑ*

p. 446, 1 *ΕΗ*] *ΗΕ* 9 *ΑΔ*] *ΔΑ* 10 *ΑΔ*] *ΔΑ* *ΘΑ*] *ΑΘ* 12 σύγκειται — 13 *ΑΔ*] in ras. *ΑΘ*] τῶν *ΑΘ*, *Α* e corr. 15 *ΝΔ*, *ΑΘ*] τῶν *ΑΘ*, *ΝΔ*, *Α* e corr. 16 ὡς] ἄρα ὡς 17 *ΝΔ*, *ΑΘ*] *ΑΘ*, *ΝΔ*

p. 448, 6 τετμήσθω δίχα 8 *ΒΕ*] *ΕΒ* *ΑΕ*] *ΕΑ* 12 ἐκ τοῦ τοῦ] ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει τό τοῦ] ὃν ἔχει τό 16 *ΗΓΚ*, *ΘΔΖ*] *ΚΓΗ*, *ΘΔΖ* 18 *ΗΠ*] *ΚΠ* 20 τήν] corr. ex τῇ 25 *ΘΒ*] *Β* e corr.

p. 450, 3 *ΚΒ*, *ΑΗ*] *ΗΑ*, *ΚΒ* 5 μέσον λαμβανομένου] in ras. 5 τοῦ τοῦ] τε τοῦ 7 *ΘΔΖ*] τῶν *ΘΖ*, *ΔΖ* *ΘΒ*] *Β* e corr. 11 τοῦ τοῦ] τε τοῦ 14 ἐκ] ἔκ τε 16 *ΒΝ*] *ΝΒ* 17 ἐκ] ἔκ τε 20 τοῦ τοῦ] τοῦ

**II** p. 2 Ἀπολλωνίου τοῦ Περγαίου κωνικῶν βιβλίον δ̄ ἐκδόσεως Εὐτοκίου Ἀσκαλωνίτου 7 τῶν ὑφ' ἡμῶν πραγματευομένων

p. 4, 5 *ταῦτα*] *τά*

p. 8, 5 *περιέχει* 8 *εὐθεῖαν*] om.

p. 10, 2 *ἐν τῇ*] *ἐντὸς τῆς* 13 *ΓΗ*] *ΓΚ*

p. 12, 16 *ΒΔ*] *ΔΒ* 23 *καθ' ἕτερόν τι*] *κατά*

p. 14, 2 *τό*] *ἔστω τό* *ἔστω*] om. 19. *ἔσται*] om. *σημεῖον*] *σημεῖόν ἐστιν*

p. 16, 8 *τοῦ*] e corr. 23 *ΖΔ*] *ΖΗ* *ΔΗ*] *ΗΔ* 26 *μηδέ*] *μή* *ἑτέρου*] *οὐδετέρου*

p. 18, 5 *ὑπό*] *ἀπό* 15 *περιέχωσιν*] *ὑπερέχωσιν* 16 *τῆς*] om.

p. 20, 10 *ΧΖ*] *ΖΧ* 13 *μηδέ*] *μή* *ἑτέρου*] *οὐδετέρου* 14 *ΕΔ*] *ΔΕ* 19 *τό*] *τὸ Δ*

p. 22, 1 *ΠΟ*] *ΡΞ* 5 *διά*] *πρότερον διά* 7 *ΠΟ*] *ΡΞ* *Κ*] *Β* 13 *τῇ ἑτέρᾳ*] bis, sed corr. 14 *ΔΘ*] *ΘΔ* 16 *καί*] *τῇ ΡΞ καί* 25 *ΠΟ*] *ΡΞ* 27 *ἡ*] *τῇ* 28 *τῇ*] *ἡ* 29 *ΕΚ*] *Κ* e corr.

p. 24, 9 *ἔχῃ*] *ἔχει* 11 *κειμένη* 19 *ἡ*] *τῆς Β τομῆς ἡ τέμνουσα*] *τεμνέτω καὶ ἀμφοτέρας* 22 *ἡ*] om.

p. 26, 1 *ἡ*] supra scr. 8 *ἐπιζευγνυμένη*] om. 9 *ἀνακειμένῃ*] om. 16 *Η*] e corr. *ΔΗ*] *ΔΔ* 17 *ΗΒ*] *ΔΒ* *ΔΔ*] *ΔΗ* *ΔΒ*] *ΗΒ*

p. 28, 2 *ἐστι τὸ σημεῖον*] *τὸ Δ σημεῖόν ἐστιν* 6 *καὶ ἤχθω*] *καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἐφαπτομένη ἡ ΔΖ καί* 7 *παράλληλος*] *ἤχθω παράλληλος τῇ ἀσυμπτώτῳ ἐφ' ἧς τὸ Δ* 9 *πιπτέτω* — 10 *τὸ Η*] *ἐρχέσθω διὰ τοῦ Γ ἀλλὰ διὰ τοῦ Η* 22 *συμπεσεῖται ταῖς τομαῖς* 23 *αἱ*] om. *συμπτώσεων*] *-εων* e corr. *ἐπί*] *αἱ ἐπί* e corr. 29 post *ΔΘ* ras. 2 litt. *η*] *ἡ μέν*

p. 30, 1 *ΑΜ*] *ΜΑ ἡ δὲ ΘΞ τῇ ΟΓ* 21 *αἱ*] om.

p. 32, 21 *ἥξει αὐτῶν* 26 *καθ' ἓν σημεῖον μόνον τῇ τομῇ* 29 *ΔΘ*] *ΘΔ*

p. 34, 1 *Κ, Η*] *Η, Κ* 15 *καὶ αἱ*] *καί* 17 *ΔΒ*] *Β* e corr. 22 *ἐφάψονται*] bis, sed corr. *ἀντικειμένων*] *τομῶν* 26 *μέν*] *μὲν οὖν* 27 *ἀλλ' ἑτέρᾳ*] om.

p. 36, 1 *ΔΘ*] *ΔΗ* *ΗΘ*] *ΗΚ* 7 *ΒΔ*] *ΔΒ*

p. 38, 1 *ἡ* (alt.)] e corr. 13 *ΔΘ* (alt.)] *ΔΒ* 17 *ΖΓ*] *ΓΖ* 19 *ἐστιν ἴση*] *ἴση ἐστίν*

p. 40, 2 *ἔχει λόγον*] *λόγον ἔχει* 3 *ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα*] *ἐφ' ἑκάτερα ἐκβαλλομένη* 10 *ὡς*] postea ins. *ἡ ΕΔ*] in ras. 13 *ἀρχῆς*] *ἀρχῆς ἀδύνατον* 18 *δή*] om. 21 *ΕΜΗ*] *ΕΝΜΗ* *ΘΡ*] *ΡΘ* 23 *Δ*] *Δ, Ε* 25 *ἐστιν ἴση*] *ἴση ἐστίν*

p. 44, 2 τῷ προειρημένῳ] τῇ προτέρᾳ 9 γάρ] γάρ τινες 14 ἀπό] διά 23 ἤ] om. 24 σημεῖα] om.

p. 46, 6 ἀπό] διά 18 τήν] om. 19 *ΚΜ*] *ΓΚ* 20 *ΚΓ* ἴση] *ΚΜ*

p. 48, 19 *Α*, *Β*] om. συμπίπτουσαι — *Δ*] αἱ *ΑΔ*, *ΔΒ* 21 *ΔΖ*] lacuna 2 litt. 26 τὸ *Δ* κέντρον

p. 50, 3 τῇ *ΗΔ*] ἡ μείζων τῆς *ΖΜ* τῇ *ΗΔ* τῇ ἐλάττονι τῆς *ΜΔ* τὸ σχῆμα ὅμοιον τῷ ἄνωθεν mg. 10 συμπίπτουσαι] συμπιπτέτωσαν 14 ἐπί] e corr. 16 καί] ἤ 19 τῇ *ΜΖ*] ἡ μείζων τῆς *ΔΗ* τῇ *ΜΖ* τῇ ἐλάσσονι τῆς *ΗΖ* 26 καὶ συμπίπτουσαι] αἱ *ΔΔ*, *ΔΒ* καὶ συμπιπτέτωσαν αἱ *ΑΔ*, *ΔΒ*] κατὰ τὸ *Δ*

p. 52, 1 δή] δέ e corr. 3 *ΑΗΒ*] corr. ex *ΑΒ* 4 *ΑΜΒ*] *ΑΜΒ* ὑπερβολὴν ἴσον 5 ἴσον] om. 6 *ΔΗ*] τῆς *ΜΗ* ἴση ἄρα η *ΜΔ* τῇ *ΔΗ*

p. 54, 3 ὥστε] ὥστε ἡ *ΑΒ* ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. 14 *ΑΒΓ*] supra *Γ* scr. *Ε* 15 διά — 17 γραμμῆς] om.

p. 56, 3 κατά] τῇ *ΑΕΓΖ* κατά 5 *ΑΓΖ*] *ΓΖ* post lacunam 1 litt. 11 δύο] δύο σημεῖα 12 συμπεσεῖται] συμβαλεῖται ἐκβαλλομένη] om. *Δ*] om. οὐδέ] τῇ *Δ* οὐδέ

p. 58, 12 *ΓΑΔ* (pr.)] *ΓΑΔ* γραμμή 14 ἀπό] διά 16 *Β*] *ΒΓ* ὥστε] om. οὐδέ] οὐδ' ἄρα *ΓΑΔ*] *ΓΑΔ* γραμμὴ συμπεσεῖται τῇ *Β* 25 οὖν] γάρ τῆς *Α* τομῆς] om. 26 καθ'] τῆς *Α* καθ'

p. 60, 1 κατά] om. 3 *ΑΒΓ*] *ΑΒ* 7 *ΑΒΓ*] *ΑΓΒ* 8 *ΑΒΓ*] *ΑΓΒ* 21 οτι] ὅτι ἡ *Ε*

p. 62, 13 *ΑΒ*] *ΑΓΒ* 19 ἐφάπτεται] ἐφάψεται 21 συμβάλλει] συμβαλεῖ

p. 64, 24 *ΓΑΘ*] *ΓΑ* *ΘΕ*] *ΘΕ* ἀλλήλαις

p. 66, 26 οὐδετέρᾳ] οὐ συμπεσεῖται τῇ ἑτέρᾳ 27 συμπεσεῖται] om.

p. 68, 8 οὐ] om. 10 συμβαλοῦσι (non συμβάλλουσι) 11 καί] om.

p. 70, 11 συμβαλοῦσιν ἀλλά] ἀλλὰ κατά

p. 72, 2 *ΙΥΤ*] *ΙΥ* 7 καί — 8 *ΤΙ*] om. 8 ὡς] καὶ ὡς 12 post ἀδύνατον add. οὐκ ἄρα ἡ *ΔΕΚ* τῇ *ΔΕΖ* συμβάλλει κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ καθ' ἕν 14 τῆς — ἀντικειμένων] in ras. 15 δέ] δὲ τέμνῃ τέμνῃ] om. 19 *Δ* (pr.)] supra scr. 22 *ΑΒ*] *ΑΒΓ* 25 ἔσται] ἐστι *ΑΒΔ*] corr. ex *ΑΒ* 27 ὑπὸ τῶν] supra scr. *ΒΖΔ* (*ΒΖ*, *ΖΔ*) — p. 74, 6 τῆς] mg.

p. 74, 15 *ΑΗΓ*] *ΑΒΓ*

p. 76, 7 ἕτερον] ἕν 13 ὅτι] ὅτι ἡ *ΕΖΘ* ἑτέρᾳ ἀντικειμένῃ] *ΕΖΗ*

p. 78, 5 ἑτέρᾳ] λοιπῇ η *ΓΑ*] ἴση ἡ *ΓΑ* 14 *ΕΝΖ*] τῶν *ΕΝ*, *ΝΖ* corr. ex τῶν *ΕΝ*, *ΝΞ*

p. 80, 7 ὥστε — 8 ἴση] om. 23 *ΖΡΘ*] τῶν *ΖΡ*, *ΡΘ* corr. ex τῶν *ΖΡ*, *ΟΘ* 25 *ΗΔΕ*] *ΗΔΕΘ* τομῇ

p. 82, 9 τῇ *Α*] om. *Δ*] *Δ* τῇ *Α* 10 τομῶν] τομῶν αἱ *ΑΓ*, *ΓΒ* 15 ἡ *Ε*] om. 27 τῶν τομῶν] τομῶν

p. 84, 12 *ΑΓ* τῆς *ΑΔΒ*] *ΑΓΒ* κατά] τῆς *ΑΔΒ* κατά 13 *ΑΓ*] *ΑΓΒ* 24 τὰς ἁφὰς ἐπέζευξεν] ἐπιζεύγνυσι τὰς ἁφάς ἡ] ὡς ἡ *ΘΕ* πρὸς *ΕΗ* ἡ

p. 86, 17 γάρ] om.

p. 88, 4 ἕν] e corr. συμβαλεῖ 9 *ΑΒΕ* (alt.)] lacuna 3 litt. 18 ἑκατέραν] ἑκατέραν τῶν *ΑΒ*, *ΓΔ* 20 τά] om. (non habet) 21 τομαῖς] om. 24 τά] σημεῖα τά

p. 90, 1 οὐ (alt.)] om.

p. 92, 19 αἱ] postea ins.

p. 94, 10 δευτέρου] δευτέρου σχήματος τῆς *ΑΒ* ἥ τε *ΓΑ* κατὰ τὸ *Α* καὶ ἡ *ΖΕ* κατὰ τὸ *Ε* 11 ἡ — συμπεσεῖται] τῇ *Δ* οὔτε μὴν ἡ *ΑΓ* συμπεσεῖται οὔτε ἡ *ΕΖ* 16 *ΖΔ*] *ΕΖ* *ΕΖ*] *Δ* *ΔΖ*] *Δ*

p. 96 in fine τέλος (τοῦ δ supra scr.) τῶν κωνικῶν Ἀπολλωνίου τοῦ Περγαίου.

Harum scripturarum nonnullae cum V memorabiliter congruunt, uelut

I p. 86, 10 *ΑΜ*] *Μ* ita scriptum, ut litterae u (β) simile fiat, V; *ΑΒ* p;

I p. 224, 25 ἡ (alt.)] ἡ ἡ V, quorum alterum ad figuram p. 224 pertinere uidetur; ἥ ἡ p;

I p. 292, 20 *ΑΖ*] Ζ ita scriptum, ut litterae *Δ* simile fiat, V; *ΑΔ* p;

I p. 370, 23 *ΑΞΖ*] Ζ ita scriptum, ut litterae *Δ* simile fiat, V; *ΑΞ* *ΞΔ* p;

I p. 372, 9 τό] τῷ Vp.

sed ex ipso V descriptus non est; nam haud ita raro cum c contra eum concordat; cuius generis hos locos notaui:

I p. 2, 15 ἔκπλῳ] ἔκπλουν cp; p. 28, 11 *ΗΖ*] *ΖΗ* cp; p. 46, 3 καὶ ὁ — 4 *ΚΒ*] om. cp; p. 66, 10 ἄρα] ἄρα καί cp; p. 160, 21 δέ] δή cp; p. 216, 5 καί (pr.)] om. cp; p. 222, 15

deinde lacunas in V non significatas saepe recte animaduertit et ad sensum haud male expleuit, interdum autem notauit tantum (I p. 110, 13), interdum supplementum incohauit, sed ad finem perducere non potuit (I p. 170, 2); I p. 362, 26 lacunam post τῆς τομῆς falso notauit, cum debuerit ante τῆς τομῆς; I p. 344, 20 sine causa lacunam statuit, quia non intellexit, ad μέν respondere καί lin. 21. similiter interdum errorem subesse recte sensit, sed aut lacunam reliquit, quia emendationem reperire non posset (I p. 296, 1; 358, 3), aut in emendando errauit (I p. 298, 9; 352, 25); II p. 62, 9 primum $AB$ scripsit, sicut in V est, deinde errorem uidit et emendauit ($A\Gamma B$).

cum his locis interpolatio certissima sit, dubitari non potest, quin discrepantiae grauiores, quibus non modo errores emendantur, sed etiam omnia insolita et exquisitiora (uelut συνημμένον I p. 342, 3, pro quo restituit solitum illud συγκείμενον; sed cfr. I p. 346, 3) eliminantur, interpolationi tribuendae sint. qui eas perlustrauerit, concedet, librarium nostrum plerumque recte intellexisse, de qua re ageretur, et sermonis mathematicorum Graecorum peritissimum fuisse; sed simul perspiciet, ex p ad uerba Apollonii emendanda nihil peti posse, nisi quod librarius sua coniectura effecit. qui ubi uixerit, postea uidebimus.

Uat. 206 Summa igitur huius disputationis ea est, uerba Apollonii ad V solum restituenda esse; quem codicem potius saeculo XII quam XIII tribuerim ob genus scripturae magnae et inaequalis, quae codicibus membranaceis saeculi XII multo similior est quam bombycinis saeculo XIII usitatis. sed quamquam non uetustissimus est, codicem uetustissimum, fortasse saeculi VII, litteris uncialibus scriptum et compendiis repletum repraesentare putandus est, ut testantur hi errores: I p. 186, 20 διορθιαι pro αἱ ὀρθίαι confusis Λ et Δ, I p. 368, 1 τοῦ pro τὸ ὑπό propter compendium $\Upsilon' = $ ὑπό, I p. 304, 16 propter idem compendium $\overline{\text{υζλθ}}$ pro ὑπὸ $Z\Lambda\Theta$, I p. 136, 17 $\Delta I'$ pro τρίγωνον propter comp. Δ', I p. 368, 11 ὅλον pro ὃ λόγον propter compendium $\lambda^{ov}$.

## Cap. II.

## Quo modo nobis tradita sint Conica.

**Conica ante Eutocium** Ex praefatione ipsius Apollonii ad librum I discimus, eum totum opus Conicorum a principio Alexandriae, sine dubio scholarum causa, composuisse et deinde cum mathematicis quibusdam, qui scholis eius interfuisse uidentur, e schedis suis communicasse. cum ita diuulgari coeptum esset, opere festinantius paullo ad finem perducto non contentus editionem nouam in meliorem ordinem redactam instituit, cuius libros primos tres ad Eudemum Pergamenum misit, reliquos quinque ad Attalum (fortasse Attalum primum regem Pergami), u. II p. 2, 3. itaque statim ab initio inter Conicorum exemplaria, quae ferebantur, discrepantia quaedam suberat, sicut queritur ipse Apollonius I p. 2, 21, et fieri potest, ut hinc petitae sint demonstrationes illae alterae, quas Eutocius in suis codicibus inuenit (cfr. Eutocius II p. 176, 17 sq.). sed sicut Eutocio concedi potest, quaedam fortasse ex editionibus prioribus seruata esse, ita dubitari nequit, quin editio recognita inualuerit, nec ueri simile est, editiones priores usque ad saeculum VI exstitisse; praefationes enim singulorum librorum, quae, ut per se intellegitur, editionis emendatae propriae erant, Eutocius in omnibus codicibus inuenisse uidetur, quoniam de solo libro tertio commemorat (II p. 314, 4 sq.), nullam ibi praefationem exstare sicut in ceteris.*) sed hoc quidem ei credendum, codices Conicorum, quos habuerit, haud leuiter inter se in demonstrationibus discrepasse, siue haec discrepantia ex editionibus prioribus irrepsit siue, quod ueri similius est, magistris debetur, qui libro Apollonii in docendo utebantur, quo modo in codicibus reliquorum mathematicorum ortae sunt demonstrationes alterae.

**editio Eutocii** ex his codicibus Eutocius suam librorum I—IV editionem concinnauit; de cuius ratione quoniam egi Neue Jahrbücher für Philologie Supplem. XI p. 360 sq., nunc hoc tantum addo, editionem eius ita comparatam fuisse uideri, ut in media pa-

*) Utrum praefatio libri tertii interciderit, an Apollonius omnino nullam praemiserit, dubium est; equidem non uideo, cur Eudemo hunc librum sine epistula mittere non potuerit, cum nomen eius duobus prioribus praefixum esset.

gina uerba Apollonii, in marginibus sua commentaria (praeter praefationes, quas sine dubio singulis uoluminibus praefixit) collocaret. hoc ex uerbis ἔξωθεν ἐν τοῖς συντεταγμένοις σχολίοις II p. 176, 20 concludi posse uidetur. praeterea ita facillime explicantur lacunae II p. 290, 8; 292, 1, 14; 306, 8; 308, 14; 310, 6; 338, 15; 340, 15; 342, 20 et transpositio II p. 264.

ex tota ratione editionis Eutocianae adparet, eum in demonstrationibus eligendis uel reiiciendis solo iudicio suo confisum esse. sed cum summa fide demonstrationes repudiatas in commentariis seruauerit (cfr. II p. 296, 6; 336, 6), de iudicio eius etiam nunc nobis licet iudicare. iam in reiiciendis demonstrationibus, quas II p. 296 sq., p. 326, 17, p. 328, 12, p. 336 sq. adfert, iudicium eius omnino sequendum; nam quas habet p. 296 sq., nihil sunt nisi superflui conatus corollarii Apolloniani I p. 218, 4 demonstrandi, propositiones p. 326, 17 et p. 328, 12 re uera, ut Eutocius obseruauit, casus sunt praecedentium, quos post illas demonstrare nihil adtinet; de demonstrationibus denique p. 336 sq. adlatis idem fere dicendum. ubi ex pluribus demonstrationibus unam elegit, res difficilior est diiudicatu. uno saltim loco errauit; nam cum in I, 50 p. 152, 6 usurpetur aequatio $\triangle\ HB\Gamma = \Gamma\Delta E$, quae nunc nusquam in praecedentibus demonstrata est, in altera autem demonstratione ab Eutocio ad I, 43 adlata p. 256 demonstratur — uerba ipsa ἴσον — $B\Gamma\Delta$ II p. 256, 9 fortasse subditiua esse, hic parum refert —, hinc concludendum est, quamquam dubitat Zeuthen Die Lehre von den Kegelschnitten im Alterthum p. 94 not., illam demonstrationem genuinam esse, nostram iniuria ab Eutocio receptam; idem fit II, 20 p. 228, 23. in ceteris nullam certam uideo causam, cur ab iudicio Eutocii discedamus; sed rursus nemo praestare potest, eum semper manum Apollonii restituisse.

lemmata Pappi

Sed quamquam in uniuersum editione Eutociana stare necesse est, tamen lemmatis Pappi adiuti de forma Conicorum aliquanto antiquiore nonnulla statuere licet. quod ut recta ratione fiat, ante omnia tenendum est, hoc esse genus ac naturam lemmatum et illorum et ceterorum omnium, uelut ipsius Eutocii, ut propositiones quasdam minores suppleant et demonstrent, quibus sine demonstratione usus sit scriptor ipse, sicut factum uidemus his locis:

| Pappi lemma | ab Apollonio usurpatur |
|---|---|
| I, 4 | I, 5 p. 20, 7 |
| I, 5 | I, 34 p. 104, 2 sq. |
| I, 10 p. 930, 19 | I, 49 p. 148, 5 |
| I, 10 p. 930, 21 | I, 50 p. 152, 14 |
| II, 3—4 | II, 23 p. 234, 16 |
| III, 1 | III, 8 p. 330, 22 |
| III, 3 | III, 16 p. 348, 23; 17 p. 352, 6 cet. |
| III, 4 | III, 22 p. 364, 17; 25 p. 374, 14 al. |
| III, 5 p. 946, 23 | III, 24 p. 372, 17; 25 p. 374, 15, 19; 26 p. 376, 2 |
| III, 7 | III, 29 p. 384, 25 |
| III, 13 | III, 56 p. 450, 9. |

ubi uero lemma Pappi in uerbis ipsis Apollonii demonstratur, concludendum, hanc demonstrationem post Pappum interpolatam esse. qua de causa delendum I, 37 p. 110, 12 *συνθέντι* — 18 $Z\varDelta$; nam per Pappi lemma I, 6 p. 926, 7 ex $AZ = ZB$ et $AE : EB = A\varDelta : \varDelta B$ statim sequitur $EZ \times Z\varDelta = BZ^2$. praeterea ex iisdem aequationibus per idem lemma p. 926, 8 (in ellipsi p. 926, 7—8) concluditur $AE \times EB = ZE \times E\varDelta$; quare ex toto loco I p. 110, 19 *καὶ ἐπεί* — p. 112, 10 *ἔσται* nihil scripserat Apollonius praeter haec: *καὶ τὸ ὑπὸ* $\varDelta EZ$ *τῷ ὑπὸ* $AEB$. item delenda I, 41 p. 126, 11 *ἰσογώνια* — 13 $EZ$, quae significationem habeant lemmatis Pappi I, 8. eadem ratione quoniam per lemma I, 7 in I, 39 ex $ZE \times E\varDelta : \Gamma E^2 =$ diam. transuersa: diam. rectam statim sequitur, quod quaeritur, pro p. 118, 23 *ἔστω* — p. 120, 7 *πρὸς* $E\Gamma$ scripserat Apollonius: *ἐπεί ἐστιν, ὡς τὸ ὑπὸ* $ZE\varDelta$ *πρὸς τὸ ἀπὸ* $\Gamma E$, *ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν, ὁ δὲ τοῦ ὑπὸ* $ZE\varDelta$ *πρὸς τὸ ἀπὸ* $\Gamma E$ *λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς* $ZE$ *πρὸς* $\Gamma E$ *καὶ τοῦ τῆς* $E\varDelta$ *πρὸς* $\Gamma E$ uel simile aliquid. in I, 54 per lemma I, 11 concluditur $AN \times NB : NZ^2 = ZO^2 : \Theta O \times OH$; itaque delenda p. 170, 16 *τὸ δέ* — 22 *πρὸς* $O\Theta$. interpolationes post Pappum

in II, 20 ex proportione $XK : KE = H\varLambda : \varLambda\Theta$, quoniam parallelae sunt $H\varLambda$, $\varLambda\Theta$ et $KX$, $KE$, per lemma II, 2 statim concluditur, parallelas esse $EX$, $H\Theta$; interpolata igitur uerba I p. 228, 1 *καὶ περί* — 8 *ἴση*.

in II, 50 delenda p. 292, 2 *ἐπεί* — 5 *καί*, quia ex hypothesi per lemma II, 5 sequitur $X\varDelta : \varDelta Z > \Theta K : HK$. ibidem p. 292, 18 *καὶ ἐάν* — 22 *τρίγωνα* delenda propter lemma II, 6. ibidem

lemma II, 7 hanc formam breuiorem uerborum p. 292, 27 ἔστιν ἄρα — p. 294, 10 γωνίαι significat: καὶ ὡς τὸ ὑπὸ $XE\varDelta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $E\Gamma$, τὸ ὑπὸ $MK\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $KH$· ὅμοιον ἄρα τὸ $H\Theta K$ τρίγωνον τῷ $\Gamma\varDelta E$; hoc enim ex lemm. II, 7 sequitur. et ita lemm. II, 7—8 cum additamento*) p. 940, 4—5 usurpantur I p. 300, 19; 304, 17, ubi iniuria Pappi lemma IX citaui, sicut me monuit Zeuthen.

uerba II, 52 p. 306, 21 οὐκ ἄρα — 22 $ZEK$, quae p. 307 not. iam alia de causa damnaui, subditiua esse arguuntur etiam per lemma Pappi II, 12, quod ueram causam indicat, cur non sit $BE^2 : E\Gamma^2 = EK^2 : KZ^2$.

propter lemma III, 5 p. 946, 20—22 in III, 24 delenda et p. 370, 24 τῷ ὑπὸ $A\Theta Z$ τουτέστι et p. 372, 8 τουτέστι — 11 $K\Xi\Theta$, quippe quae demonstrationem post lemma inutilem praebeant.

eadem de causa in III, 27 uerba p. 380, 7 καὶ ἐπεί — 15 $BE$ propter lemma III, 6 superuacua sunt et ut interpolata damnanda.

per lemmata III, 8, 9, 10 quattuor interpolationes prorsus inter se similes arguuntur, in III, 30 p. 388, 6 ἡ ἄρα — 7 $\varDelta Z$ propter lemm. III, 8, in III, 31 p. 390, 11 ἡ ἄρα — 13 τὸ $E$, III, 33 p. 394, 19 εὐθεῖα ἄρα — 20 $\Theta$ propter lemm. III, 9, in III, 32 p. 392, 10 δίχα — 12 $\varDelta Z$ propter III, 10.

denique per lemma III, 12 p. 952, 3—5 ex $KZ \times Z\varDelta = \varDelta Z^2$ concluditur (nam $\varDelta Z = ZB$) $\varDelta K \times KB = K\varDelta \times KZ$ siue $BK : KZ = \varDelta K : K\varDelta$; itaque delenda III, 42 uerba interposita p. 418, 18 ὡς ἡ $KZ$ — p. 420, 2 διελόντι. et demonstratio propositionis III, 42 omnino mutata esse uidetur; suspicor enim, lemmata Pappi III, 11—12, quae Halleius I p. 201 ad III, 35—40 referre uidetur, huc pertinuisse, quamquam, ut nunc est, neque hic neque alibi in nostro Apollonio locum habent.

nam hoc quoque statuendum, si lemmatis Pappi nunc locus non sit, eum aliam formam demonstrationum ob oculos habuisse. uelut lemma I, 9, quod Zeuthenius ad demonstrandum $\triangle\, HB\varDelta = \Gamma\varDelta E$ I, 50 p. 152, 6 usurpatum esse putat, neque in de-

*) Quod minime cum Hultschio interpolatori tribuendum; potius delenda p. 942, 1—4, quae mire post propositiones conuersas adduntur et idem contendunt, quod p. 940, 4—5 suo loco dicitur.

monstratione recepta neque in ea, quam seruauit Eutocius, continuo inseri potest. lemma II, 9—10 auctore Zeuthenio in analysi ampliore propositionis II, 51 locum habere potuit, ut nunc est, non habet; et re uera analyses ampliores olim exstitisse, eo confirmatur, quod eodem auctore lemma II, 13, cuius nunc usus nullus est, in analysi propositionis II, 53 utile esse potuit. praeterea suspicor, lemma II, 11 in analysi propositionis II, 50 olim usurpatum fuisse; nunc inutile est, sed per propositionem conuersam in II, 50 demonstratur $\angle\, \Gamma\Delta E = ZH\Theta$; quare I p. 296, 17 *ὡς ἡ* — 20 *ἔστι δὲ καί* delenda sunt, et pro p. 296, 23 *καὶ δι' ἴσου* — p. 298, 1 *ἀνάλογον* fuisse uidetur *ὅμοιον ἄρα τὸ ΓΔΧ τρίγωνον τῷ ΖΗΚ*; ita enim hoc lemma conuersum usurpatur II, 53 p. 316, 15 et similiter membro intermedio omisso II, 52 p. 310, 14. denique lemmata II, 1 et III, 2 nunc usui non sunt; de illo ne suspicari quidem possumus, cuius propositionis causa propositum sit, hoc uero et in III, 13 et in III, 15 forma demonstrationis paullum mutata utile esse potuit.

haec habui, quae de usu lemmatum Pappianorum ad pristinam formam Conicorum restituendam dicerem, pauca sane et imperfecta; neque uero dubito, quin alii hac uia progressi multa haud improbabilia inuenire possint; mihi satis est rem digito monstrasse.

cetera, quae Pappus ex Conicis citat, pauca sunt et aut neglegenter transscripta, ut p. 922, 19 *καὶ ἐφ' ἑκάτερα ἐκβληθῇ* (ita codex A, sed p. 922, 27 *προσεκβεβλήσθω*) = Apoll. I p. 6, 4 *ἐφ' ἑκάτερα προσεκβληθῇ* (fortasse Pappus pro *ἐπιζευχθεῖσα* p. 6, 4 habuit *ἐπιζευχθῇ*), aut incerti momenti, uelut quas p. 674, 22—676, 18, ubi praefationem libri I p. 4, 1—26 citat, scripturas habet discrepantes:*) Apoll. I p. 4, 2 *τῶν ἀντικειμένων*] *τὰς ἀντικειμένας* Pappus (ita cod. A), p. 4, 4 *καί*] om., *ἐξειργασμένα*] *ἐξητασμένα*, p. 4, 6 *τομῶν*] *τομῶν καὶ τῶν ἀντικειμένων*, 10 *παράδοξα θεωρήματα*] *παντοῖα*, 12 *πλεῖστα*] *πλείονα*, *κάλλιστα*] *καλά*, 13 *ξένα, ἃ καί*] *καὶ ξένα*, *συνείδομεν*] *εὕρομεν*, 15 *τὸ τυχόν*] *τι*, 16 *προσευρημένων ἡμῖν*] *προειρημένων*, 19 *συμβάλλουσι*] *συμπίπτουσι*, *ἄλλα*] om., 21 *ἤ*] om., *συμβάλλουσι*] *συμβάλλει καὶ ἀντικείμεναι ἀντικειμέναις κατὰ πόσα σημεῖα συμ-*

---

*) Errores apertos codicis Pappi p. 676, 1, 4 omisi. memorabile est, iam Pappum pro *καί* p. 4, 9 cum nostris codd. *ἤ* habere.

βάλλουσι, 22 ἐστι] δ', 23 πλέον] πλεῖον, 24 κώνου] om., περί] om., 25 προβλημάτων κωνικῶν] κωνικῶν προβλημάτων. harum omnium scripturarum nulla per se melior est nostra, multae sine dubio deteriores siue Pappi siue librariorum culpa; nam quae sola speciem quandam ueritatis prae se fert scriptura p. 4, 21, ea propter IV praef. II p. 2, 9 sq. dubia est. scripturae ἐξειργασμένα p. 4, 4, τομῶν 6, παράδοξα θεωρήματα 10 ab Eutocio II p. 168, 16; 178, 2; 178, 16 confirmantur.

Quas supra e Pappo ostendimus interpolationes, eas iam Eutocium in suis codicibus habuisse puto; nam si defuissent, sine dubio lacunas demonstrationum sensisset notasque addidisset, sicut etiam alibi eadem fere lemmata addidit ac Pappus (Pappi lemma I, 4 = Eutoc. II p. 208, 15; I, 5 = II p. 248, 23 sq.; I, 10 = II p. 270, 19; II, 2 = II p. 302, 9; III, 7 = II p. 340, 12; praeterea Eutocius II p. 190—198 eadem fere de cono scaleno exposuit, quae Pappus habet p. 918, 22—922, 16), quem nouerat (ad Archim. III p. 84; cfr. ad Apollon. II p. 354, 7 [τὸ δ' βιβλίον] οὐδὲ σχολίων δεῖται; Pappus ad librum IV lemmata nulla praebet).

interpolationes aliae sed multa alia menda sunt, quae ad Apollonium referri uix possunt. de IV, 57 p. 94, 12 sq. taceo, quia hunc errorem (cfr. II p. 95 not. 4) fortasse Apollonius ipse committere potuit; sed u. interpolationes apertiores, quas ex ipso demonstrationis tenore uel ex orationis forma notaui, I p. 18, 27; 126, 15; 156, 16 (cfr. p. 157 not.); 162, 27 sq. (cfr. p. 163 not.); 280, 11 (glossema ad lin. 12); 300, 21; 346, 1; 384, 23; 414, 27;*) 416, 10;*) 442, 11; 446, 16; II p. 6, 14;**) 30, 11 (cfr. p. 31 not. 1); 60, 5 (u. not. crit.); 88, 19 (cfr. p. 89 not.), et aliquanto incertiores I p. 92, 12; 162, 1 (cfr. p. 163 not.); 168, 24; II p. 80, 4; 90, 4. errores grauiores, qui neque Apollonio neque librariis imputari possunt, sed manum emendatricem, ut ipsi uidebatur, hominis indocti sapiunt, notati sunt II p. 18, 10 sq. (cfr. p. 19 not.); 34, 15 sq. (cfr. p. 35 not.); 62, 19 sq. (cfr. p. 63 not.); p. 64 (cfr. p. 65 not.) et rursus eodem modo (id quod uoluntatem ostendit interpolandi) p. 74 (cfr. p. 75 not.).

---

*) Uerba διπλασία γὰρ ἑκατέρα ideo subditiua existimanda sunt, quod haec propositio (Eucl. V, 15) antea saepe, uelut I p. 382, 17, tacite usurpata est; priore loco praeterea propter ordinem litterarum dicendum erat ἡμίσεια γὰρ ἑκατέρα.

**) Interpolator similitudinem propositionis IV, 9 p. 16, 16 iniuria secutus est.

praeter hos locos, quos iam in editione ipsa indicaui, nunc hos addo, in quibus interpolationes deprehendisse mihi uideor:

I, 32 p. 96, 28 ἢ κύκλου περιφέρεια delenda; nam de circulo haec propositio iam ab Euclide demonstrata est, et si Apollonius eum quoque respicere uoluisset, p. 94, 21 dixisset κώνου τομῆς ἢ κύκλου περιφερείας, sicut fecit II, 7, 28, 29, 30; III, 1, 2, 3, 16, 17, 37, 54; IV, 1, 9, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40; nam inter coni sectiones circulumque semper distinguit, ut etiam ex I, 49—50 intellegitur, ubi in protasi κώνου τομή habet et deinde in demonstratione parabolam, hyperbolam, ellipsim enumerat, circuli mentionem non facit; cfr. I, 51 κώνου τομή de parabola hyperbolaque, tum in I, 53 post propositionem auxiliariam I, 52 de ellipsi, ita ut protasis I, 51 quodam modo propositionum 51 et 53 communis sit.

II, 38 demonstratio indirecta nimis neglegenter exposita est; deest conclusio: et idem de omni alia recta demonstrari potest praeter $EX$; ergo $EX$ diametrus est.

III, 18 p. 354, 19 ἐπεί — 21 ἡ $\Delta Z$ subditiua existimo, quia lin. 19 dicitur ὑπερβολή, cum tamen apertissime usurpetur I, 48 de oppositis.

IV, 52 non intellego, cur de $A\Delta$ in $K$ in duas partes aequales diuisa mentio fiat p. 84, 3; nam quod sequitur, non inde concluditur, sed ex natura diametri secundae. itaque deleo p. 84, 3 τεμεῖ — 4 καί.

difficilis est quaestio de figuris diuersis. saepissime enim adcidit, ut constructiones auxiliariae ab Apollonio propositae litterarumque ordo ab eo indicatus cum una sola figurarum consentiat, ad ceteras uero adcommodari non possit nisi nonnullis uel uerbis uel litteris figurae mutatis, uelut in I, 2 p. 10, 28 καὶ ἐκβεβλήσθωσαν, p. 12, 4 ἐκβεβλήσθω, p. 12, 15 ἐκβεβλήσθω cum figura tertia, in I, 4 p. 16, 3 ἐκβεβλήσθω cum secunda, in I, 6 p. 22, 1 ἐκβεβλήσθω cum tertia non consentit; I, 34 p. 102, 15 $E\Gamma Z$ in circulo $EZ\Gamma$ esse debuit*), ἐκβεβλήσθωσαν figurarum discrepantia

*) Omnino ueri simile est, ordinem mirum litterarum, quem saepe corrigendum putaui, quia cum figura codicis non consentiret, eo explicari posse, quod Apollonius aliam dederat. dubitari etiam potest, an Apollonius ipse non semper ordinem naturalem obseruauerit; nam plurimis locis, ubi recta a puncto aliquo uel per punctum ducta esse dicitur, in denominanda recta littera illa, quae punctum significat, primo loco ponitur

p. 102, 18 in ellipsi circuloque uerum non est; I, 45 demonstratio ad hyperbolam solam adcommodata est (διάμετρος ἡ ΑΘ p. 136, 25; ΓΜΑ p. 136, 26); ἐκβεβλήσθω p. 136, 28 soli figurae quartae aptum est; etiam in I, 50 hyperbolam solam respexit (p. 150, 13 κείσθω τῇ ΕΓ ἴση ἡ ΓΚ, 22 ἐκβεβλήσθω, 25 ΑΡΝ, 27 ΓΣΟ); II, 47 p. 270, 18 καὶ διήχθω ἡ ΚΔ ἐπὶ τὸ Β de hyperbola dici non potest, ΚΒΔ uero neque cum his uerbis neque cum ellipsi conciliari potest; quare fortasse ΚΔΒ scribendum; III, 3 ordo litterarum in ΖΘΚΑ, ΝΖΙΜ, ΗΞΟ, ΘΠΡ p. 322, 19—20 et ὅλον p. 324, 7 cum ellipsi circuloque non consentit; in III, 27 ΝΖΗΘ, ΚΖΑΜ p. 378, 2 in circulo debuit esse ΖΝΗΘ, ΖΚΑΜ; III, 11 ΕΘΗ p. 336, 2, ΒΖΑ p. 336, 4 cum figura secunda conciliari non potest; in III, 45 ΓΕΔ p. 424, 16, in III, 47 ἐκβαλλόμεναι p. 428, 1, in III, 48 κατὰ κορυφὴν γάρ p. 430, 15 de sola ellipsi circuloque dici possunt.

iam quaeritur, unde proueniant hae discrepantiae. constat, Apollonium animo uarios casus omnes comprehendisse, et interdum etiam in demonstratione eos significauit, uelut (ne dicam de locis, qualis est I, 22, ubi re uera duas demonstrationes habemus communi expositione coniunctas, et ideo sine dubio etiam duas figuras; cfr. IV, 50, ubi in communi expositione propter figuram p. 80 additum est ἐκβεβλήσθω p. 78, 28, quo in priore figura p. 81 opus non est) III, 2 p. 322, 7 προσκείσθω ἢ ἀφῃρήσθω duos casus indicant, sed ΑΕΓ, ΒΕΔ p. 322, 1, ΗΜΖ p. 322, 3 in ellipsi circuloque ΓΑΕ, ΔΒΕ, ΗΖΜ, p. 322, 3 ΗΚΑ in circulo ΚΗΑ esse debuit; etiam illud διαφέρει III, 11 (cfr. p. 337 not.) figuras diuersas

---

etiam ordine naturali uiolato (I p. 32, 2; 218, 2; 224, 12; 308, 6; 336, 25; 338, 19; 348, 17; 354, 15; 368, 26; 398, 2; 400, 13, 17; 410, 23; 414, 13; 420, 17; 442, 3, 4; 448, 16; II p. 58, 14). sed obstant loci, quales sunt I p. 32, 1; 444, 20. et omnino ordo litterarum tam saepe necessario corrigendus est (I p. 40, 25; 56, 3, 16; 74, 16; 84, 21; 86, 5; 88, 11; 110, 8; 116, 19; 118, 3; 122, 1; 194, 11; 212, 10; 296, 24; 298, 23; 300, 21; 304, 20; 306, 17; 310, 9, 13; 316, 7; 338, 24; 352, 5; 358, 24; 360, 2, 7; 366, 22; 370, 17, 25; 372, 10; 382, 14, 29; 384, 2; 394, 11, 14; 396, 12; 424, 20; 426, 4; 428, 10; 430, 24; 434, 3; 448, 23; II p. 52, 18), ut satius duxerim etiam illis locis ordinem insolitum litterarum librario imputare quam ipsi Apollonio. cfr. I p. 134, 23, ubi Eutocius uerum ordinem seruauit.

significare uidetur (etsi III, 14 p. 342, 8 sine significatione diuersitatis usurpatur), sicut in III, 12 p. 338, 3 λιπὸν ἢ προσλαβόν; sed in III, 11 *EΘH* p. 336, 2, *BZΔ* p. 336, 4 et in III, 12 *ΔBMN*, *KΞOTΠ* p. 336, 25, *BΞP*, *ΔKΣ* p. 336, 26 cum priore figura sola consentiunt.

uerum tamen difficile est credere, Apollonium figuras dedisse, quae a constructionibus litterarumque ordine indicato discreparent (quamquam interdum in figuris describendis parum diligens est, uelut in III, 11, ubi in expositione de puncto *K* siletur). adcedit, quod in figuris codicibus non multum credendum esse demonstrari potest. primum enim ex uerbis τις τῶν προειρημένων τομῶν III, 42 p. 416, 27, μία τῶν εἰρημένων τομῶν III, 45 p. 424, 15, III, 53 p. 438, 9 pro certo adparet, in his propositionibus unam tantum figuram ab Apollonio adscriptam fuisse (quamquam in III, 42 propter p. 418, 10 sq. causa fuit, cur hic saltim duas daret), cum tamen nunc in nostris codicibus plures adsint. deinde ex Eutocio p. 318, 18 sq. discimus, in III, 4 sqq. codices eius in singulis propositionibus unam figuram habuisse, sed inter se diuersas, cum alii rectas contingentes in eadem sectione haberent, alii in singulis unam; cfr. de III, 31 Eutocius II p. 342, 11 sq. itaque si Eutocius II p. 320, 7, 14 in III, 5 utramque figuram habuit, ipse in editione sua eas coniunxit. Apollonium ipsum utrumque casum mente concepisse, ex usu adparet, qui in III, 23 fit propositionis 15 (u. I p. 367 not.), in IV, 15 propositionis III, 37 (u. II p. 27 not.), in IV, 44, 48, 53 propositionis III, 39. omnino Eutocius in figuris describendis satis libere egit; u. II p. 322, 1.*) et illarum discrepantiarum nonnullae per eius rationem edendi ortae esse possunt, uelut in I, 38, ubi p. 116, 23 in ellipsi permutandae sunt *ΘΓ* et *ΘΔ*; nam in quibusdam codicibus haec propositio de sola hyperbola demonstrata erat, u. Eutocius II p. 250, 16. uerum alias iam is in suis codicibus inuenit, uelut in III, 1 p. 320, 8 κοινὸν ἀφῃρήσθω τὸ *ΔHΓE* cum figura priore p. 320 conciliari non potest, quam habuit Eutocius II p. 316, 9. aliae autem post eum ortae sunt, uelut in eadem prop. III, 1 figuram alteram p. 310 nondum habuit (u. II p. 316, 9

*) Ubi lin. 6—7 interpretandum erat: ut seruetur, quod in protasi dicitur „iisdem suppositis". nam τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων p. 322, 7 ex uerbis Apollonii citatur; u. III, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

et p. 317 not.); ne in I, 18 quidem figuram alteram p. 71, in qua litterae *A*, *B* et *Γ*, *Δ* permutandae erant, ut cum uerbis Apollonii consentirent, habuit Eutocius II p. 230, 19. concludendum igitur, Apollonium ipsum in figuris uarios casus non respexisse (sicubi in uerbis demonstrationis eos respexit, id cum Eutocio II p. 320, 24 explicandum), sed in singulis demonstrationibus (quae cum numero propositionum non concordant) unam dedisse, ceteras autem paullatim interpolatas esse, nonnullas post Eutocium.

**interpolationes post Eutocium** Etiam interpolationes supra notatae sine dubio maximam partem post Eutocium ortae sunt; pleraeque enim futtiliores sunt quam pro eius scientia mathematices. et editionem eius non prorsus integram ad nos peruenisse, ostendunt scripturae a nostris codicibus discrepantes, quae in lemmatis eius seruatae sunt; nam quamquam neque omnes per se meliores sunt et saepe etiam in nostris codicibus fortuitus librarii error esse potest, praesertim cum cod. W Eutocii duobus minimum saeculis antiquior sit codicibus Apollonii, tamen nonnullae manifesto interpolatorem produnt. sunt igitur hae:

I p. 4, 5 *περί*] *παρά* Eutocius II p. 178, 1 (fort. scrib. *περί*),

I p. 18, 4 *τετμήσθω*] *τετμήσθω ὁ κῶνος* Eutoc. p. 204, 20,

I p. 18, 5 *τὸν ΒΓ κύκλον*] *τὴν βάσιν* Eutoc. p. 204, 21 (sed hoc loco fortasse non ad uerbum citare uoluit),

I p. 18, 6 *δή*] *δέ* Eutoc. p. 206, 7,

I p. 18, 7 *ὄντι*] *μέν* Eutoc. p. 206, 8, *ΑΒΓ*] *διὰ τοῦ ἄξονος* ibid.,

I p. 18, 8 *τρίγωνον πρὸς τῷ Α σημείῳ τὸ ΑΚΗ*] *πρὸς τῇ κορυφῇ τρίγωνον* Eutoc. p. 206, 9 (ne hic quidem locus ad uerbum citatus esse uidetur),

I p. 38, 25 *ΖΘ*] *ΘΖ* Eutoc. p. 216, 15,

I p. 40, 8 *τῶν*] om. Eutoc. p. 218, 1; p. 40, 9 *τε*] om. p. 218, 2,

I p. 66, 10 *ἐστὶ καί*] om. Eutoc. p. 224, 2, *ἡ ΑΚ*] *ἐστὶν ἡ ΚΑ* Eutoc. p. 224, 3,

I p. 66, 11 *ΑΒ*] *ΒΑ* Eutoc. p. 224, 3,

I p. 94, 13 *ἄρα*] om. Eutoc. p. 244, 23,

I p. 102, 24 *τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΝΞ μεῖζόν ἐστι*] *μεῖζον ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΝΞ* Eutoc. p. 248, 6,*)

I p. 104, 3 *ΚΒ*] *ΒΚ* Eutoc. p. 248, 23; *οὕτως*] om. p. 248, 24,

---

*) *ΝΟ* II p. 248, 7 error typothetae est pro *ΝΞ*.

I p. 104, 4 ΔΕ] ΕΔ Eutoc. p. 248, 24,
I p. 134, 23 ΕΔ] ΔΕ Eutoc. p. 264, 6,
I p. 134, 24 τῇ ΖΗ παράλληλός ἐστιν ἡ ΔΕ] παράλληλός ἐστιν ἡ ΖΗ τῇ ΕΔ Eutoc. p. 264, 7,
I p. 148, 4 ΑΓ] ΔΑΠΓ Eutoc. p. 270, 19, ἐστιν ἴση] ἴση ἐστίν Eutoc. p. 270, 20,
I p. 148, 5 ΚΑΝ] ΚΑΝ γωνία Eutoc. p. 270, 21,
I p. 166, 26 κύκλος γεγράφθω] γεγράφθω κύκλος Eutoc. p. 274, 13,
I p. 168, 1 ΑΖΒ] ΑΖΒ τμήματι Eutoc. p. 274, 16,
I p. 172, 12 ΑΓ] ΓΑ Eutoc. p. 278, 9, ΑΒ] τὴν διπλασίαν τῆς ΑΔ Eutoc. p. 278, 10,
I p. 182, 20 ΑΖΕ] ΑΕΖ Eutoc. p. 280, 14 (male), ἐν αὐτῷ] om. Eutoc. p. 280, 14, ἡ] ἐν αὐτῷ ἡ Eutoc. p. 280, 14,
I p. 182, 21 ΖΗ] ΖΗ λόγον Eutoc. p. 280, 15,
I p. 182, 22 λόγον] om. Eutoc. p. 280, 16, αὐτὸν τῷ] om. Eutoc. p. 280, 16, ΑΒ] διπλασίαν τῆς ΑΕ Eutoc. p. 280, 16,
I p. 340, 1 καὶ ὡς ἄρα] ἐπεί ἐστιν ὡς Eutoc. p. 324, 7,
I p. 340, 2 ΖΘ] ΘΖ Eutoc. p. 324, 7, ΒΘ] ΘΒ p. 324, 7, ΗΘ] ΘΗ Eutoc. p. 324, 8, ὑπὸ ΒΘΖ, ΗΘΖ] πρὸς τῷ Θ γωνίαι Eutoc. p. 324, 8,
I p. 340, 3 ἄρα] om. Eutoc. p. 324, 9,
I p. 384, 25 τῶν] om. Eutoc. p. 340, 13,
I p. 442, 13 ΜΑ] ΑΜ Eutoc. p. 350, 18,
I p. 442, 29 ΝΓ, ΑΜ] ΑΜ, ΝΓ Eutoc. p. 352, 6.

harum scripturarum Eutocii apertas interpolationes nostrorum codicum arguunt eae, quas ad I p. 40, 8; 104, 3; 172, 12; 182, 22; 340, 2; 384, 25 notaui. ceterum per se intellegitur, etiam in W errores librariorum esse posse; memorabile est, etiam lemmata e demonstratione ab ipso Eutocio adlata discrepantias exhibere (Eutoc. p. 238, 18 ὡς] δὴ ὡς idem p. 240, 24; Eutoc. p. 238, 19 οὕτως] om. idem p. 240, 25; Eutoc. p. 238, 21 οὖν] om. idem p. 242, 2; καὶ θέσει οὔσης τῆς ΑΑ] om. p. 242, 2; Eutoc. p. 238, 23 ΓΚΗ] ΓΗΚ idem p. 242, 3).

In numeris propositionum nulla prorsus fides codicibus nostris habenda est; nam in diuisione propositionum magnopere uariant (cfr. de codice p supra ad I p. 276, 22; 286, 25; 298, 27; 308, 19 alibi), et in V a manu prima nulli fere numeri adscripti sunt. itaque mirum non est, quasdam propositiones aliis numeris, quam quibus nunc signatae sunt, et ab Eutocio ipso in commentariis ad Archimedem (u. Neue Jahrbücher — *numeri propositionum*

f. Philol., Supplem. XI p. 362) et a scholiasta Florentino Archimedis (III p. 374, 12; 375, 3) citari. diuisionem editionis suae Eutocius ipse in primo libro testatur II p. 284, 1 sq.; sed non crediderim, Apollonium ipsum disiunxisse I, 52—53, 54—55, 56—58.*) in libro secundo diuisio usque ad prop. 28 propter II p. 306, 5 constat; de propp. 29—48 locus dubitandi non est, ita ut ν' pro μη' II p. 310, 1 librario debeatur; sed ueri simile est, propp. 49—50 apud Eutocium in ternas minimum, prop. 51 in duas diuisas fuisse. in libro tertio numeri propter titulos adnotationum Eutocii in dubium uocari non possunt; nam λ' pro κθ' II p. 340, 11 librarii est, quoniam numeri propp. 31, 33, 34, 35, 36, 44, 54 concordant. ne in quarto quidem libro est, cur dubitemus; nam numerus propositionis 51 propter II p. 358, 23 constat; de ceteris u. II p. 45 not.

saec. IX constat igitur, editionem Eutocii interpolationem subiisse, nec dubito, quin hoc tum factum sit, cum initio saeculi noni studia mathematica Constantinopoli auctore Leone reuiuiscerent (u. Bibliotheca mathematica I p. 33 sq.); nam eo fere tempore orti esse uidentur codices illi litteris uncialibus scripti, ex quibus V et W descripti sunt. eidem tempori figuras illas
saec. X—XI auxiliarias tribuerim, de quibus egi I p. VII sq. satis notum est, haec studia deinde per saecula decimum et undecimum uiguisse, sicut plurimi ac praestantissimi codices mathematicorum testantur, qui ex illis saeculis supersunt; quorum unus est codex Uaticanus W, in quo commentaria Eutocii sine dubio e margine codicis litteris uncialibus scripti transsumpta sunt, sicut in eodem codice scholia Elementorum Euclidis, quae in aliis codicibus in margine leguntur, specie operis continui composita sunt (u. Euclidis opp. V p. 12; Videnskabernes Selskabs Skrifter, 6. Raekke, hist.-philos. Afd. II p. 298).

saec. XII haec studia per saeculum duodecimum euanuisse uidentur, quamquam ea non prorsus abiecta esse testis est codex V, si recte eum huic saeculo adtribui; u. quae de suis studiis narrat Theodorus Metochita apud Sathas μεσαιων. βιβλιοθ. I p. πζ' sq. (de Apollonio ibid. p. πη': τὴν δὲ περὶ τὰ στερεὰ τῆς ἐπι-

*) Tamen Pappus quoque multas diuisiones habuit. nam si meos numeros in libb. I—IV, Halleianos in V—VIII computauerimus, efficitur numerus 420, cum Pappus p. 682, 21 habeat 487.

*στήμης πολυπραγμοσύνην καὶ μάλιστα τὴν τῶν περὶ τὰ κωνικὰ θαυμάτων τῆς μαθηματικῆς ἄρρητον παντάπασι καὶ ἀνεννόητον, πρὶν ἢ ἐντυχεῖν ὁντιναοῦν καὶ προσσχεῖν εὖ μάλα εὕρεσιν καὶ ὑποτύπωσιν Ἀπολλωνίου τοῦ ἐκ Πέργης ἀνδρὸς ὡς ἀληθῶς θαυμαστοῦ**) *τῶν ἐξαρχῆς ἀνθρώπων, ὅσα ἐμὲ εἰδέναι, περὶ τὴν γεωμετρικὴν ἐπιστήμην, αὐτοῦ τε τὴν***) *περὶ τὰ κυλινδρικὰ καὶ Σερήνου κατ' αὐτὸν ἀνδρὸς ἢ ὅτι ἔγγιστα).* sed extremo saeculo tertio decimo et quarto decimo ineunte auctore Manuele Bryennio (Sathas I p. ρ') Theodorus Metochita studiis mathematicis se dedidit (de Apollonio l. c. p. ρε': *ἃ δὲ δή τ' εἴρηταί μοι πρότερον Ἀπολλωνίου τοῦ Περγαίου κωνικὰ θαυμαστῆς ὄντως γεωμετρικῆς ἕξεως καὶ κράτους ἐν ταύτῃ τοῦ ἀνδρὸς δείγματα καὶ Σερήνου κυλινδρικὰ μάλιστ' ἐπονήθη μοι δυσδιεξίτητα ταῖς καταγραφαῖς ἐντυχεῖν καὶ κομιδῇ πως ἐργώδη συσχεῖν παντάπασιν, ὅσα γ' ἐμὲ εἰδέναι, διὰ τὴν ἐπίπεδον ἐπίσκεψιν, καὶ ἔστιν ὁτῳοῦν χρῆσθαι καὶ πειρᾶσθαι, εἰ ἀληθὴς ὁ λόγος).* nec dubium est, quin studio mathematices Theodori***) opera reuiuiscenti debeamus codices satis frequentes saeculorum XIII—XIV (codd. cvp). quorum recentissimus cod. Paris. p, cuius interpolationes peritiae haud mediocris testes sunt, in monte Atho scriptus est; est enim, sicut me monuit Henricus Omont, codicis notissimi Aristotelis Coislin. 161 prorsus gemellus, qui „olim Laurae S. Athanasii in monte Atho et *τῶν κατηχουμένων*“ fuit (Montfaucon Bibliotheca Coisliniana p. 220); charta, atramentum, ductus librarii eadem sunt, et in utroque codice commentaria, quae alibi ut propria opera traduntur, eadem prorsus ratione in margine adscripta sunt. eiusdem et generis et temporis sunt codd. Coislinn. 166 et 169 (Aristotelis cum commentariis Philoponi, Simplicii aliorumque), aliquanto recentiores codd. Mosquenses 6 et 7 (Aristotelis cum commentariis Simplicii et aliorum), uterque olim monasterii Batopedii in monte Atho; hoc genus codicum institutioni scholasticae inseruisse demonstraui Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1892 p. 73; cfr. cod. Mosq. 6 fol. 278[r] manu recentiore: *ἀνέγνω τοῦτο ὁ μέγας ῥήτωρ ὅλον τὸ βιβλίον*

saec. XIII—XIV

*) Scribendum *θαυμαστοτάτου.*
**) Fort. *τε καὶ τήν* deleto *καί* ante *Σερήνου.*
***) Ex uerbis eius supra adlatis adparet, Serenum etiam in eius codicibus cum Apollonio coniunctum fuisse.

β̄ον Ν̃ β̄ου ἔτους ,ζζου (h. e. 1499).*) cum interpolationibus codicis p apte conferri potest, quod in codicibus Coislinianis 172 et 173 saeculi XIV, olim Laurae S. Athanasii in monte Atho, de Nicephoro Gregora dicitur (Montfaucon Bibl. Coisl. p. 227 sq.): *καὶ τὸ παρὸν βιβλίον διωρθώσατο καὶ ἀνεπλήρωσε καὶ ἡρμήνευσεν ὁ φιλόσοφος Νικηφόρος Γρηγορᾶς· ὁ γὰρ μακρὸς χρόνος φαύλων γραφέων χερσὶν εἰς διαδοχὴν τῆς βίβλου χρησάμενος τὰ μὲν ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς εἰς σφαλερὸν μετήνεγκε, τὰ δ' ἀμαθῶς διακόψας ἐκ μέσου πεποίηκεν, ὡς ἐργῶδες ἐντεῦθεν εἶναι τοῖς μετιοῦσι συνάπτειν τὸν νοῦν κτλ.* Nicephorus Gregoras discipulus erat Theodori Metochitae (Niceph. Greg. hist. Byz. VIII, 7); fortasse igitur diorthosis codicis p aut eius est aut saltim eo auctore facta.

Arabes Post saeculum XIV studia mathematica Byzantinorum intra prima huius scientiae elementa steterunt; de Apollonio non fit mentio. sed iam saeculo X Conica eius Arabibus innotuerant, de quorum studiis Apollonianis e disputatione Ludouici Nixii (Das fünfte Buch der Conica des Apollonius von Perga. Lipsiae 1889) hic pauca repetenda esse duxi; sumpta sunt e praefatione filiorum Musae, quo fonte usi sunt et Fihrist (Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik VI p. 18) et Hadji Chalfa (V p. 147 sq.). Ahmed igitur et Hasan filii Musae saeculo X interpretationem Arabicam Conicorum instituere conati corruptione codicum Graecorum ab incepto deterriti sunt, donec Ahmed in Syria codicem editionis Eutocii**) librorum I—IV nactus est, quem emendauit et ab Hilal ibn abi Hilal Emesseno interpretandum curauit; etiam libros V—VII, quos ope illius codicis intellegere ei contigit, eius iussu Thabit ibn Korrah ex alio codice***) Arabicos fecit. quod Fihrist de seruatis quattuor propositionibus libri octaui narrat, incertissimum est; neque enim in praefatione illa commemoratur (u. Nixius p. 5), nec omnino apud Arabes ullum eius rei uestigium exstat. huius interpretationis autoribus filiis Musae factae eorumque prae-

---

*) Casu igitur adcidit, ut in p idem ordo commentariorum Eutocii restitueretur, qui ab initio fuit (u. supra p. LVII).

**) Quae Fihrist l. c. de discrepantia codicum Conicorum habet, apertissime ex Eutocio II. p. 176, 17 sq. petita sunt.

***) Quae in praefatione dicuntur, libros I—IV ex editione Eutocii, ceteros ex recensione Apollonii translatos esse (Nix p. 4), confirmant, Eutocium solos libros quattuor edidisse.

fatione ornatae complures exstant codices, quorum optimus est cod. Bodleianus 943 anno 1301 e codice Nasireddini Tusi anno 1248 finito descriptus. inde descriptus est et cod. Bodl. 885 (a. 1626) et cod. Lugd. Bat. 14 (ab eodem librario eodem anno scriptus; u. Nixius p. 4); continent libros V—VII solos. praeterea cod. Bodl. 939 propositiones solas horum librorum continet.

interpretationem, quam commemorauimus, in compendium redegit medio, ut uidetur, saeculo XII Abul-Hosein Abdelmelik ibn Mohammed el-Schirazi, quod in cod. Bodleiano 913 exstat; eius apographum est cod. Lugd. Batau. 513; idem opus etiam codd. Bodl. 987 et 988 habent, alter textum, alter notas marginales librorum V—VII (Nix p. 6). editum est a Christiano Rauio (Kiliae 1669). librorum V—VII compendium uel recensio anno 983 ab Abulfath ibn Mohammed Ispahanensi confecta in codd. Laurent. 270 et 275 exstat et anno 1661 Florentiae ab Abrahamo Echellensi et Ioanne Alphonso Borelli edita est.

Persicam recensionem continet cod. Laurent. 296, alia Persica ad Apollonium pertinentia codd. Laur. 288 et 308. de duobus aliis codicibus u. Nixius p. 8 et de ceteris operibus Arabicis Apollonium tractantibus Wenrich De auctor. Graec. versionib. et comment. Syriacis Arabicis etc. p. 202 sq., p. 302.

de discrepantiis codicum Arabicorum in definitionibus libri primi et I, 11—12 haec mecum beneuolenter communicauit Nixius (A significat compendium Abdelmelikii, M interpretationem auctoribus filiis Musae confectam; in propp. 11—12 illud tantum collatum est):

I p. 6, 5 post σημείου add. „ita ut locum suum non relinquat“ M,

I p. 6, 7 ὅθεν ἤρξατο φέρεσθαι] om. A, 7 τὴν γραφεῖσαν — 9 κειμένων] utramque superficiem, quam recta cum puncto transitionis circumducta describit, et quarum utraque alteri opposita est AM,

I p. 6, 12 αὐτῆς] utriusque superficiei conicae AM, post δέ add. „superficiei conicae“ AM,

I p. 6, 15 τοῦ κύκλου περιφερείας] om. A,

I p. 6, 18 post δέ et post κορυφῆς add. „coni“ AM,

I p. 6, 19 post δέ add. „coni“ AM,

I p. 6, 21 τοὺς μή — 22 ἄξονας] si hoc non ita est A,

I p. 6, 24 ἀπό] a puncto aliquo AM,

I p. 6, 25 post γραμμῆς add. „in plano eius“ M,

I p. 6, 26 post εὐθείας add. „quarum termini ad lineam curuam perueniunt" AM,

I p. 6, 29 ἑκάστην τῶν παραλλήλων] parallelas quas descripsimus AM,

I p. 8, 2 ἥτις — 3 γραμμάς] partem inter duas lineas curuas positam rectae quae AM,

I p. 8, 7 γραμμῶν] curuas lineas AM; deinde add. „et in diametro transuersa erecta" AM,

I p. 8, 8 εὐθείᾳ τινί] diametro transuersae AM, ἀπολαμβανομένας — 9 γραμμῶν] quae inter lineas curuas ita ducuntur, ut termini earum ad eas perueniant AM,

I p. 8, 10 διάμετρον] diametrum rectam AM, ἑκάστην τῶν παραλλήλων] has parallelas AM,

I p. 8, 12 εὐθείας] duas rectas AM,

I p. 8, 16 post παραλλήλους add. „quae eius ordinatae sunt" M,

I p. 8, 19 εὐθείας — 20 συζυγεῖς] diametros, si coniugatae sunt et AM,

I p. 36, 27—38, 14 om. A,

I p. 38, 15 σημεῖον om. A, 16 κύκλος] om. A, διά] quod transit per A, 17 καὶ ποιείτω τομήν] om. A, 19 εὐθεῖαν] om. A, καὶ ποιείτω] om. A, 20 ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου] om. A, 21 μιᾷ — 22 τριγώνου] om. A, 26 διὰ τοῦ K] om. A,*) 27 λέγω ὅτι] om. A, 28 Λ] punctum Λ A, 29 ἔστι] ducta est A,

I p. 40, 1 τῷ — 2 τουτέστι] om. A, 2 τό — 3 ἐπίπεδον] itaque A, 5 ἐπεί — BΓ] om. A, 8 τὸ δέ — 15 MZ] breuius A, 15 λοιπή] om. A, 17 ὁ δέ — 18 ὁ] quae ratio aequalis est rationi A, 21 τῆς — λαμβανομένης] om. A, 22 ὡς ἄρα — 24 ΛZΛ] om. A, 24 post MΛN add. „hoc est KΛ²" A, 25 τὸ δέ — 26 ΘZΛ] om. A,

I p. 42, 5—26 om. A, 27 σημεῖον] om. A, 28 διά] quod transit per A,

I p. 44, 1 καὶ ποιείτω τομήν] om. A, 2 τοῦ κώνου] om. A, 3 εὐθεῖαν] om. A, 4 καί — 5 γραμμήν] scilicet sectione ΔZE A, 6 μιᾷ — 7 AΓ] lateri AΓ A, 7 ἐκτός — κορυφῆς] om. A, 8 τῇ — τομῆς] om. A, 9 καί — BΓ] om. A, 12 εἰλήφθω — 13 τοῦ M] a puncto sectionis scilicet M A, 17 λέγω ὅτι] om. A,

---

*) Quod post KΛ addidit Halley: μέχρι τῆς διαμέτρου τῆς τομῆς, omisit A cum V.

18 πλάτος — $ZN$] om. A,*) 20 ἤχθω — 25 $PN\Sigma$] si per punctum $N$ planum $PN\Sigma M$ basi coni parallelum ducitur, circulus est, cuius diametrus $P\Sigma$ A,

p. 44, 28 ὁ δέ — p. 46, 1 λόγος] quae ratio A,

p. 46, 2 καὶ ἡ — 7 $NP$] breuius A, 8 post λόγος add. „h. e. $\Theta N : N\Xi$" A, 9 ὁ δέ — 11 ὁ] quae ratio aequalis est A, 13 ἡ $\Theta Z$ — 14 τουτέστιν] om. A, 14 ἀλλ' — 16 $ZN\Xi$] om. A,**) 19 post $\Sigma NP$ add. „h. e. $MN^2$" A, τὸ δέ — 22 παραλληλόγραμμον] om. A, 23 πλάτος — $ZN$] om. A, 27 καλείσθω — καί] om. A.

definitiones alteras I p. 66 hoc loco om. AM, sed in M post definitiones priores quaedam interposita sunt de origine trium sectionum, de oppositis, de centro oppositarum et ellipsis („omnes rectae, quae per quoddam punctum inter duas oppositas uel intra ellipsim positum transeunt, diametri sunt, et hoc punctum centrum uocatur").

hinc nihil prorsus ad uerba Apollonii emendanda peti posse, satis adparet, nec aliter exspectandum erat, quoniam Arabes quoque editione Eutocii utebantur.

Per Arabes etiam ad occidentales saeculo XIII aliqua notitia Conicorum peruenit. Uitellio enim in praefatione Uitellio perspectiuae fol. 1ᵘ (ed. Norimb. 1535) haec habet: *librum hunc per se stantem effecimus exceptis his, quae ex Elementis Euclidis, et paucis, quae ex Conicis elementis Pergaei Appollonii dependent, quae sunt solum duo, quibus in hac scientia sumus usi, ut in processu postmodum patebit.* et paullo inferius de libro primo: *et in hoc ea duo, quae demonstrata sunt ab Appollonio, declaramus.* significat I, 131: *inter duas rectas se secantes ex una parte a puncto dato hyperbolem illas lineas non contingentem ducere, ex alia parte communis puncti illarum linearum hyperbolem priori oppositam designare; ex quo patet, quod, cum fuerint duae sectiones oppositae inter duas lineas, et producatur linea minima ab una sectione ad aliam, erit pars illius lineae interiacens unam sectionum et reliquam lineam aequalis suae parti aliam sectionum et reliquam lineam interiacenti.* *quod*

*) Uerba καὶ ὁμοίως κειμένῳ ab Halleio post ὄντι lin. 19 interpolata etiam in A desunt.

**) Uerba lin. 17—18 errore in V omissa in A adsunt, sed A cum Halleio et p pro $\Sigma NP$ lin. 17 $\Xi NZ$, pro $\Xi NZ$ lin. 18 $\Sigma NP$ habere uidetur.

*hic proponitur, demonstratum est ab Appollonio in libro suo de conicis elementis* [II, 16]*; ducuntur autem sectiones ampligoniae siue hyperbolae oppositae, quando gibbositas unius ipsarum sequitur gibbositatem alterius, ita ut illae gibbositates se respiciant, et ambarum diametri sint in una linea recta . . . et ex iis declarauit Appollonius illud, quod correlatiue proponitur . . . et nos utimur hoc illo ut per Appollonium demonstrato.* hoc deinde utitur in I, 132—133. alteram propositionem Conicorum citat in I, 129: *inter duas rectas angulariter coniunctas a dato puncto rectam ducere, cuius una partium interiacens unam coniunctarum et datum punctum sit cuicunque datae lineae et insuper reliquae suae parti datum punctum et alteram coniunctarum interiacenti aequalis . . . . ad hoc autem per lineas rectas uel circulares demonstrandum longus labor et multae diuersitatis nobis incidit, et non fuit nobis hoc possibile complere per huius lineas absque motu et imaginatione mechanica . . . hoc tamen Appollonius Pergaeus in libro suo de conicis elementis libro secundo propositione quarta*) per deductionem sectionis ampligoniae a dato puncto inter duas lineas assumpto nulla earum linearum secante demonstrauit, cuius nos demonstrationem ut a multis sui libri principiis praeambulis dependentem hic supponimus et ipsa utimur sicut demonstrata.* utitur in I, 130. haec omnia a Uitellione ex opticis Alhazeni (Ibn al Haitam) V, 33 petita sunt (cfr. Alhazen V, 34: *sectio pyramidis, quam assignauit Apollonius in libro pyramidum*), et originem Arabicam ipse prodit I, 98: *sectio rectangula uel parabola et est illa, quam Arabes dicunt mukefi . . . ampligonia uel hyperbole uel mukefi addita . . . oxigonia uel elipsis uel mukefi diminuta.* praeterea haec habet de Conicis: IX, 39 *si sectionem parabolam linea recta contingat, et a puncto contactus ducatur recta perpendiculariter super diametrum sectionis productam ad concursum cum contingente, erit pars diametri interiacens perpendicularem et periferiam sectionis aequalis parti interiacenti sectionem et contingentem . . . hoc autem demonstratum est ab Appollonio Pergeo in libro de Conicis elementis* [I, 35]*, et hic utemur ipso ut demonstrato,* IX, 40: *omne quadratum lineae perpendicularis ductae ab aliquo puncto sectionis parabolae super diametrum sectionis est aequale rectangulo contento sub parte diametri interiacente illam perpendicularem et periferiam sectionis et sub latere recto*

---

*) Coll. II, 8.

*ipsius sectionis ... hoc autem similiter demonstratum est ab Appollonio Pergeo in libro de Conicis elementis* [I, 11], *et nos ipso utemur ut demonstrato. haec uero duo theoremata cum aliis Appollonii theorematibus in principio libri non connumerauimus, quia solum illis indigemus ad theorema subsequens explicandum et nullo aliorum theorematum totius eius libri.* usurpantur in IX, 41, quae sicut etiam I, 117 et IX, 42—44 ex alio libello Alhazeni *de speculis comburentibus* sumpta est. in interpretatione Latina inedita huius opusculi, cuius multi supersunt codices (uelut Ottobon. 1850 Guillelmi de Morbeca, amici Uitellionis), IX, 40 ut Apollonii citatur (*sicut ostendit Apollonius bonus in libro de pyramidibus*), IX, 39 usurpatur illa quidem, sed in ea Apollonii mentio non fit. itaque necesse est, Uitellionem ipsum Apollonium in manibus habuisse, quamquam eum non semper citauit, ubi potuerat (u. c. I, 90, 91, 100, 103).

**interpretatio Latina saec. XIII**

et alia quoque uestigia supersunt, unde adparet, Conica eo tempore non prorsus ignota fuisse inter occidentales. exstat enim initium interpretationis Latinae, quod infra e codicibus Paris. lat. 9335 fol. 85u saec. XIV*) (A), Dresd. Db 86 fol. 277u saec. XIV (B), Regin. lat. 1012 fol. 74 saec. XIV (C) dabo; in A titulus est: *ista quae sequuntur sunt in principio libri Apollonii de pyramidibus; sunt axiomata, quae praemittit in libro illo*; in C: *ista sunt in principio libri Apollonii de piramidibus et sunt anxiomata, quae praemittit in libro suo; valent etiam ad librum de speculis comburentibus*; in B nulla inscriptio.

Cum continuatur inter punctum aliquod et lineam continentem circulum per lineam rectam, et circulus et punctum non sunt in superficie una, et extrahitur linea recta in ambas partes, et figitur punctum ita, ut non moueatur, et reuoluitur linea recta super periferiam circuli, donec redeat ad locum, a

---

*) De hoc codice notauit Leclerc Histoire de la médecine Arabe II p. 491. exstat etiam in cod. Paris. lat. 8680 a fol. 64 saec. XIV (ista sunt quae sequuntur in principio libri Apollonii de piramidibus). cod. C solita beneuolentia mea causa descripsit Augustus Mau; codicis B imaginem photographicam intercedente Hultschio u. c. per Büttner-Wobst accepi.

---

29. non] *om. B.* 30. non moueatur] remoueatur *A.* reuoluatur *C.* 31. perifariam *B.*

quo incepit, tunc ego nomino unamquamque duarum superficierum, quas designat linea reuoluta per transitum suum, et unaquaeque quarum est opposita sue compari et susceptibilis additionis infinite, cum extractio linee recte est sine fine, superficiem piramidis. Et nomino punctum fixum caput cuiusque duarum superficierum duarum piramidum. Et nomino lineam rectam, quae transit per hoc punctum et per centrum circuli, axem piramidis.

Et nomino figuram, quam continet circulus et quod est inter punctum capitis et inter circulum de superficie piramidis, piramidem. Et nomino punctum, quod est caput superficiei piramidis, caput piramidis iterum. Et nomino lineam rectam, quae protrahitur ex capite piramidis ad centrum circuli, axem piramidis. Et nomino circulum basim piramidis.

Et nomino piramidem orthogoniam, cum eius axis erigitur super ipsius basim secundum rectos angulos. Et nomino ipsam decliuem, quando non est eius axis erectus orthogonaliter super ipsius basim.

Et cum a puncto omnis linee munani, quae est in superficie una plana, protrahitur in eius superficie linea aliqua recta secans omnes lineas, quae protrahuntur in linea munani et quarum extremitates ad eam, et est equidistans linee alicui posite, in duo media et duo media, tunc ego nomino illam lineam rectam diametrum illius linee munani. Et nomino extremitatem illius linee recte, quae est apud lineam munani,

---

1. tunc] $\overline{\tau c}$ *e corr. C.* duarum] *om. C.* 2. reuoluta] remota *B.* 3. compari sue *C.* 4. sine fine] supra finem *B.* superficiei *B.* 5. pyramidum *B.* capud *C.* 6. piramidarum *A*, pyramidum *B.* 8. pyramidis *B.* 9. quod] que *B.* 10. circulus *B.* pyramidis *B.* 11. pyramidem *B.* caput] *om. B,* capud *C.* 12. piramidis] *om. C,* pyramidum *B.* capud *C.* pyramidis *B.* iterum] *e corr. C,* item *B.* et] *om. B.* 13. pyramidis *B.* 14. pyramidis *B.* 15. pyramidem *B.* ortogoniam *C.* cum eius] cuius *C.* 16. secundum — 18. basim] *om. B.* 17. axis eius *C.* ortogonaliter erectus *C.* 19. linee] *corr. ex* lineā? *B.* munani] in miani? *B.* 21. lineas] eius lineas *B.* munani] in unaui *B.* et quarum] equaliter *B.* 22. equedistans *B.* alicui linee *B.* 23. posite] *om. B,* proposite *C.* 24. dyametrum *B.* munani] in unaui *B.* 25. apud lineam] *corr. m. 2 ex* capud linee *C.* munani] in unaui *B.*

caput linee munani. Et nomino lineas equidistantes, quas narraui, lineas ordinis illi diametro.

Et similiter iterum, cum sunt due linee munani in superficie una, tunc ego nomino, quod cadit inter duas lineas munani de linea recta, que secat omnes lineas rectas egredientes in unaquaque duarum linearum munani equidistantes linee alique in duo media et duo media, diametrum mugeniben. Et nomino duas extremitates diametri mugenibi, que sunt super duas lineas munani, duo capita duarum linearum munanieni. Et nomino lineam rectam, que cadit inter duas lineas munanieni et punctum super diametrum mugenib et secat omnes lineas rectas equidistantes diametro mugenib, cum protrahuntur inter duas lineas munanieni, donec perueniant earum extremitates ad duas lineas munanieni, in duo media et duo media, diametrum erectam. Et nomino has lineas equidistantes lineas ordinis ad illam diametrum erectam.

Et cum sunt due linee recte, que sunt due diametri linee munani aut duarum linearum munanieni, et unaqueque secat lineas equidistantes alteri in duo media et duo media, tunc nomino eas duas diametros muzdaguageni.

Et nomino lineam rectam, cum est diameter linee munani aut duarum linearum munanieni et secat lineas equidistantes,

---

1. capud *C.* munani] in unaui *B.* equedistantes *B.* 2. narraui] nominaui *C.* dyametro *B.* 3. iterum] *rēm* *BC.* sint *B.* due] alie due *C.* munani] in unaui *B.* 4. lineas] *om.* *BC.* munani] in unaui *B.* 5. secet *B.* rectas] *om.* *B.* 6. munani] in unaui *B.* equedistantes *B.* 7. alique] aliam *C.* diametrum] *om.* *B.* Et — 9. munanieni] *om.* *B.* 8. mugenid'i *C.* 9. munameni *in ras.* *C.* 10. lineas] *om.* *B.* munamen *C,* munanī *B.* 11. punctum] poꝛ̄ *A.* dyametrum *B.* 12. equedistantes *B.* dyametro *B.* 13. mumamen *C,* numauien? *B.* extremitates eorum *B.* 14. mumanien *C,* mumamen *B.* duo] duo linea *B, sed corr.* et duo media] *om.* *B.* 15. equedistantes *B.* 16. dyametrum *C.* 17. sunt *(pr.)*] sint *B.* 18. munani] in imaui? *B.* munaniem *C,* in unaui̅ *B.* 19. equedistantes *B.* alteri] *e corr.* *C.* et duo media] *om.* *B.* 20. dyametros *BC.* muzdagagеni (u *supra*) *C,* uuiiz dagnagem *B.* 21. dyameter *BC.* munaui *B.* 22. munnanieni *A, sed corr.;* mumanieni *C,* mimaui̅? *B.* equedistantes *B.*

que sunt linee ordinis ei, secundum angulos rectos axem linee munani aut duarum linearum munanieni.

Et nomino duas diametros, cum sunt muzdaguageni, et secat unaquaeque earum lineas equidistantes alteri secundum rectos angulos, duos axes muzdaguageni linee munani aut duarum linearum munanieni.

Et de eo, in cuius premissione scitur esse adiutorium ad intelligendum, quod in isto existit libro, est, quod narro.

Cum secatur piramis cum superficie plana non transeunte per punctum capitis, tunc differentia communis est superficies, quam continet linea munani, et quando secatur piramis cum duabus superficiebus planis, quarum una transit per caput eius et per centrum basis et separat eam secundum triangulum, et altera non transit per caput ipsius, immo secat eam cum superficie, quam continet linea munani, et stat una duarum superficierum planarum ex altera secundum rectos angulos, tunc linea recta, quae est differentia communis duarum superficierum planarum, non euacuatur dispositionibus tribus, scilicet aut quin secet unum duorum laterum trianguli et equidistet lateri alteri, aut quin secet unum duorum laterum trianguli et non equidistet lateri alii, et cum producatur ipsa et latus aliud secundum rectitudinem, concurrant in parte, in qua est caput piramidis, aut quin secet unum duorum laterum trianguli et non equidistet lateri alii, immo concurrant aut intra piramidem

---

1. ei] et *C.* 2. mumani *C,* in unaui *B.* manianiem *C,* munaui *B.* 3. cum] *om. C.* sunt] *om. C,* sint *B.* mazduguageni *C,* uniz dagnagem *B.* 4. secet *B.* equedistantes *B.* secundum] *om. B.* 5. angulos rectos *B.* angulos] duos angulos *C.* duos] *add. m. 2 C.* mazdaguageni *C,* uniz dagnagem *B.* mumani *C,* unmani *B.* 6. mumameni *C,* in unaui *B.* 8. est] *om. B.* 9. secatur] sequatur *B.* pyramis *B.* 11. mumani *C,* munaui *B.* et — 15. munani] *om. B.* 12. capud *C.* 14. non] non secat *A, sed corr.* capud *C.* ipsius] eius *C.* eam] *m. 2 C.* 17. recta] *om. B.* est] *om. C.* 18. euacuantur *A.* aut] an *B.* 19. quin] quoniam *B.* equedistet *B.* 20. quin] quod non *B.* 21. equedistet *B,* equidestent *C.* alii] alteri *BC.* et *(pr.)* — 24. alii] *om. B.* aliud] secundum aliud *C,* aliud s *A.* 22. parte] partem *C.* capud *C.* 24. alii] alteri *C.* immo] nimio *B.* concurrat *BC.* pyramidem *B.*

aut extra eam, cum protrahuntur secundum rectitudinem, in parte alia, in qua non est caput piramidis.

Quod si linea recta, que est differentia communis duarum superficierum planarum, equidistat lateri trianguli, tunc superficies, super quam secatur piramis, et quam continet linea munani, nominatur sectio mukefi. Et si non equidistat lateri trianguli, immo concurrit ei, quando protrahuntur secundum rectitudinem, in parte, in qua est caput piramidis, tunc superficies, super quam secatur piramis, et quam continet linea munani, nominatur sectio addita. Et si non equidistat lateri trianguli, immo occurrit ei in parte alia, in qua non est caput piramidis, tunc superficies, super quam secatur piramis, si non est circulus, nominatur sectio diminuta. Et quando sunt due sectiones addite, quibus est diameter communis, et gibbositas unius earum sequitur gibbositatem alterius, tunc ipse nominantur due sectiones opposite. Et inter duas sectiones oppositas est punctum, per quod omnes linee que transeunt sunt diametri duarum sectionum oppositarum. Et hoc punctum nominatur centrum duarum sectionum. Et intra sectionem diminutam est punctum, per quod omnes linee que transeunt sunt ei diametri. Et hoc punctum est centrum sectionis. Et cum in sectione diminuta protrahuntur diametri, tunc ille ex illis diametris, quarum extremitates perueniunt ad circumferentiam sectionis et non pertranseunt eam nec ab ea abreuiantur,

---

2. partem *C.* capud *BC.* pyramidis *B.* 4. equedistat *B.* tunc] et tunc *B.* *mg.* sectio mukefi *C.* 5. pyramis *B.* 6. munaui *B.* mukefi] mukesi *B;* áddita *C,* *mg.* mukefi. *mg.* sectio addita *C.* equedistet *B.* 7. concurrunt *B,* occu^r^prit *C.* ei] *om. B.* secundum rectitudinem] *om. C.* 8. partem *C.* capud *C.* pyramidis *B.* 9. sequatur *B.* pyramis *B.* 10. munaui *B.* addita sectio *B.* *mg.* sectio diminuta *C.* equedistet *B.* 11. alia] altera *B.* capud *C.* 12. pyramidis *B.* pyramis *B.* 14. *mg.* diameter sectionis *C.* diameter] dyameter *B,* diameter gibbositas *C.* et] *om. B.* 15. gibbositatem] gybbositatem *B.* 16. *mg.* sectiones opposite *C.* 18. sunt diametri] super dyametrum *B.* 19. *mg.* centrum sectionis *C.* duarum] duarum linearum *B.* intra] inter *C.* 20. est] et *C.* 21. ei] eius *C.* dyametri *B.* 22. cum] tn̄ cum *B.* *mg.* diameter mugenibꝫ *C.* dyametri *B.* 23. dyametris *B.* 24. ab ea] *om. C.*

nominantur diametri mugenibi sectionis diminute. Et que ex eis est, cuius principium est ex puncto circumferentie sectionis, et eius altera extremitas abreuiata est a circumferentia sectionis aut pertransit eam, nominatur diameter absolute. Diameter uero, que nominatur secunda, non est nisi in duabus sectionibus oppositis et transit per centrum ambarum, et narrabo illud in fine sextedecime figure huius tractatus. Et sectioni quidem mukefi non est nisi unus axis; sectioni uero diminute sunt duo axes intra ipsam; uerum addite est axis unus mugenib, et est ille, qui secat lineas ordinis secundum rectos angulos, siue ipse sit intra sectionem siue extra ipsam, siue pars eius intra sectionem et pars eius extra ipsam, et est ei axis alter erectus, et ostendam illud in sequentibus. Et non cadunt axes muzdeguege nisi in sectionibus oppositis et in diminutis. tamen et nominatur linea erecta linea, super quam possunt linee protracte ad diametrum secundum ordinem.

Hoc interpretationis fragmentum ex Arabico factum esse, ostendunt uocabula Arabica munani, mugenib, mukefi; et cum iis, quae Nixius de ordine codicum Arabicorum mecum communicauit (u. supra p. LXXI sq.), optime concordat. interpretatio, sicut tot aliae eiusdem generis, saeculo XII uel XIII facta est, fortasse a Gerardo Cremonensi, quoniam in codicibus cum operibus ab eo translatis coniungitur (u. Wüstenfeld Die Uebersetzungen arabischer Werke in das Lateinische p. 79).

Philelphus Primus codicem Graecum Conicorum ad occidentem adtulit Franciscus Philelphus. is enim e Graecia a. 1427 redux in epistula ad Ambrosium Trauersari inter libros rariores, quos ex itinere reportauerat, etiam Apollonium Pergaeum nominat (epp. Ambrosii Trau. ed. Mehus XXIV, 32 p. 1010 Bononia id.

---

1. dyametri *B.* mugelnibi *C,* mugeben *B.* 2. eis] illis *BC.* est] *om. B.* ex] s̄n̄t ex *A.* 3. abbreuiata *B.* 4. dyameter *B.* Dyameter *B.* 5. secunda] *om. B.* est] *om. B.* in] ex *B.* 6. narrabo illud in fine] in fine illud variabo *B.* 7. sexdecime *C,* sedecime *B.* 8. mukesi *B.* sectionis *B.* 9. duo] *om. B.* ipsam] ipsum *B.* 11. sit] sint *B.* 12. eius *(pr.)*] *om. B.* ipsam] *om. B.* 14. muzdeguege] muzdognage *corr. in* muzdoguege *m. 2 C,* muzdagnagem *B.* 15. tamen] tm̄ *ABC.* et] *m. 2 C,* non *B.* linea] *m. 2 C, om. B.* linea] *om. B.* 16. possunt linee] posite sunt linee *C,* linee posite sunt *B.* dyametrum *B.*

Iun. 1428). qui codex nisi periit, quod parum ueri simile est, aut V est aut v aut p, qui soli ex oriente asportati sunt.

Deinde saeculo XV cito codices Conicorum per Italiam describendo propagati sunt.

Primus fragmenta nonnulla e Graeco translata edidit Georgius Ualla De expetendis et fugiendis rebus (Uenet. 1501) XIII, 3 (de comica sectione!). ibi enim haec habet: Eutoc. II p. 168, 17—174, 17; Apollon. I deff. (his praemissis: caeterum quo sint quae dicuntur euidentiora); Eutoc. II p. 178, 18 ἔθος — 184, 20; p. 186, 1—10; Apollon. I, 1, 3, 5, 17; II, 38, 39. haec e cod. Mutin. II D 4 petiuit Ualla, qui codex olim eius fuit. uidimus supra, eum e Uatic. 203 originem ducere; et Ualla saepius scripturas huius codicis proprias ob oculos habuit, uelut II p. 178, 25 ἐστι] om. v, non punctum unum modo problema facit Ualla; p. 182, 14 ἀλλ' ὡς — 16 $Z\Theta$] bis v, Ualla; p. 182, 23 $B\varDelta$] $B\Theta$ v, *bh* Ualla. G. Ual

Totius operis interpretationem primus e Graeco confecit Ioannes Baptista Memus patricius Uenetus et mathematicarum artium Uenetiis „lector publicus“, quam e schedis eius edidit Ioannes Maria Memus nepos Uenetiis 1537. ex praefatione eius fol. $1^{u}$ haec adfero: cum post obitum Ioannis Baptistae Memi patrui mei viri etsi in omni scientiarum genere eruditissimi mathematicarum tamen huius aetatis facile principis .... Bibliothecam ipsius discurrerem, Apollonius Pergeus, Mathematicus inter graecos author grauissimus, ab ipso patruo meo [qui] extrema sua hac ingrauescente aetate, quasi alter Cato, literas graecas didicerat, latinitate donatus, in manus nostras inciderit, decreui, ne tam singularis foetus tamdiu abditus, tam studiosis necessarius, licet immaturus adhuc et praecox, abortiretur atque fatisceret, eum ipsum ... tibi [Marino Grimano] dicare cet. Mem

in mathematicis Memus non pauca, maxime in ordine litterarum, computatione recte deducta feliciter correxit et suppleuit, sed grauiora reliquit; et Graecae linguae, ut erat ὀψιμαθής, non peritissimus erat; uelut uocabulum πορίζειν non nouit, cuius loco lacunam reliquit fol. $24^{u}$ (I p. 150, 2, 6) et fol. $25^{u}$ (I p. 154, 23, 26); idem fecit eadem de causa in διελόντι (I p. 62, 26; 94, 13; 116, 28) fol $10^{u}$, $15^{u}$, $19^{r}$, in εἴδη (I p. 122, 18) fol. $20^{r}$, in ἂν ληφθῇ (I p. 118, 9; 120, 14) fol. $19^{u}$, in καταχθήσονται (I p. 172, 21) fol. $27^{u}$ cet. quo codice Graeco usus sit, nunc nequit pro certo adfirmari, sed

cum Uenetiis doceret, ueri simile est, codicem Bessarionis (Marc. 518) ei praesto fuisse.

Maurolycus Seueram Memi censuram egit Franciscus Maurolycus, qui interpretationem Conicorum praeparauit, sed non edidit (u. Libri Histoire des sciences mathématiques en Italie III p. 233, ubi Maurolycus inter opera sua commemorat: Apollonii Pergaei Conica emendatissima, ubi manifestum erit, Io. Baptistam Memmium in eorum tralatione pueriles errores admisisse Mathematicae praesertim ignoratione deceptum).

Commandinus Optime de Apollonio meritus est F. Commandinus, qui a. 1566 Bononiae interpretationem latinam edidit additis lemmatis Pappi, commentariis Eutocii, notis suis. non modo plurimos errores uel tacite uel disertis uerbis emendauit, sed in primis commentario suo et propositiones ab Apollonio usurpatas indagando uiam ad Conica eius intellegenda primus omnium muniuit; u. praef.: cum in Archimedis et Ptolemaei libris aliquot interpretandis, qui sine conicorum doctrina nulla ratione percipi possunt, demonstrationes Apollonii multas adhibuerim, quae sine graeco libro, quod latinus corruptissimus sit, parum intelligantur, feci non inuitus ... primum ut Apollonium ipsum, quam planissime possem, conuerterem ... deinde uero ut Pappi lemmata atque Eutocii in Apollonium commentarios latinos facerem .... post autem ... eosdem etiam, ut omnia faciliora cognitu essent, propriis declarare commentariis uolui. in Eutocio eum cod. Urbin. 73 usum esse, supra demonstraui; in Apollonio uero, quae de codicibus suis dicit, tam pauca sunt, ut inde de eo nihil certi concludi possit. plures codices inspicere potuit (fol. $30^u$ in omnibus antiquis codicibus, quos uiderim; fol. $100^r$ sic habent graeci codices; fol. $109^r$ in graecis autem codicibus), sed plerumque uno contentus fuit (fol. $34^u$, $65^r$, $66^r$, $67^r$, $67^u$, $85^u$ enim de Graeco exemplari uel codice loquitur; fol. $15^u$, $16^u$: Graeca uerba). hoc tantum constat, eum cod. V secutum non esse; nam fol. $85^u$ e codice Graeco citat *ΤΣΟ* I p. 374, 14, cum V *ΝΣΟ* habeat. fieri potest, ut cod. Uatic. 205 ei praesto fuerit; in titulis enim opusculorum Sereni habet „Sereni Antinsensis", quae forma falsa primum in illo codice adparet (*Σερήνου Ἀντινσέως*); et descriptus est cod. 205, ut supra uidimus, ad usum hominum doctorum, ne ipse V, ut est laceratus, manibus tereretur. eum etiam cod. Marciano 518 usum esse, ostendit haec nota in inuentario codicum Marcianorum e bibliotheca commodatorum (Omont Deux registres

de prêts de mss., Paris 1888, p. 29): 1553, die 7 augusti .. cardinalis S. Angeli .. habuit .. librum Apolonis Pergei conicorum insertum Heliano de proprietatibus animalium et aliis autoribus per dominum Federicum suum familiarem (cfr. ibid. p. 28 nr. 125: Federicus Commandinus familiarius suae D. $R^{me}$).*)

Commandini opera nisi sunt, quicunque postea Conica adtigerunt, quorum hi mihi innotuerunt: Codex scholae medicae Montepessulanae 167 continet Conica cum commentariis Eutocii et Commandini „ridotti dal latino nell' idioma italiano da Cosimo de Noferi ad instanza del S. Giov. Batt. Micatori Urbinate" saec. XVII (Catalogue des mss. des départements I p. 352). Cosimus de Noferi

Apollonii Pergaei Conicorum libri IV cum commentariis Claudii Richardi, Antuerpiae 1655. Memum et Commandinum ipse commemorat ut auctores suos Admonit. ad lectorem sect. XV; cfr. ibid. sect. XVII: supponimus in hoc nostro Commentario numerum ordinemque propositionum librorum quatuor primorum Apollonii iuxta editionem Eutocii et versionem Latinam Federici Commandini, licet aestimemus, ut par est, alteram Memi Latinam versionem. Richardus

Editionem Graecam sub finem saeculi XVII moliebatur Edwardus Bernhardus, qui de subsidiis suis haec tradit (Fabricius Bibliotheca Graeca, Hamb. 1707, II p. 567): Apollonii Pergaei Conicorum libri VII. quatuor quidem priores Gr. Lat. ex versione Fr. Commandini, Bonon. 1566, collata cum versionibus Memmii et Maurolyci. Graece e cod. mss. Bibl. Savilianae et Bibl. Leidensis et cod. Regis Christianissimi 103. Labb. p. 271. Adnexis commentario Eutocii Lat. ex versione Commandini, et Graece ex cod. in Arch. Pembr. 169 atque notis D. Savilii et aliorum. Tres autem sequiores libri, scil. 5. 6. 7 (nam octavus iam olim periit) Arab. et Lat. ex translatione Arabica Beni Musa, qui editionem Eutocianam expressit, et nova versione Latina una cum notis Abdolmelic Arabis, qui Apollonii Con. libros septem in compendium redegit, ex cod. ms. Bodl. tum etiam notis Borelli mathematici egregii et Bernhardus

*) Codex restitutus est „1553, 6 novembris". idem rursus a „die 21 octobris" a. 1557 ad „diem 25 novembris" apud Camillum Zaneti fuit (Omont l. c. nr. 131) et a „die 4 novembris" a. 1555 ad Calendas Apriles 1556 apud Io. Bapt. Rasarium (Omont p. 35).

aliorum cum schematis et notis ex schedis D. Golii viri summi. haec cum lemmatis Pappi. Translatio Arabica Beni Musa ex cod. Bibl. Leidensis (qui etiam ms. optimae notae in Catalogo librorum mss. D. Golii τοῦ μακαρίτου apographum est) transscripta fuit. Golianus codex etiam quatuor priores Conic. libros exhibet, sicut et iste in Bibl. Florentina, quem latine vertit A. Echellensis non adeo feliciter.

haec igitur Bernhardi consilia fuerunt. quem narret codicem Graecum Leidensem Apollonii, nescio; hodie saltim non exstat. codex Regis 103 est Paris. 2357, ni fallor; nam praeter p Mazarinaeum, de quo uix cogitari potest, ille solus e Parisinis etiam Serenum continet, quem Bernhardus ex eodem codice Regis petere uoluit (Fabricius l. c. II p. 568).

Halley Denique a. 1710 Oxoniae prodierunt Conica Graece per Edmundum Halley. ab initio ita comparatum fuerat, ut „Gregorius quatuor priores Conicorum libros cum Eutocii Commentariis Graece Latineque prelo pararet, atque ipse tres posteriores ex Arabico in Latinum sermonem verterem“ (praef. p. 1). sed dum ille „Graecis accurandis Latinaeque versioni Commandini corrigendae ... incumbit“, subito mortuus est, et Halleius iam solus laborem edendi suscepit (praef. p. 2). in Graecis Apollonii recensendis „ad manus erat codex e Bibliotheca Savilii mathematica praestantissimi istius viri calamo hinc illinc non leviter emendatus“, idem scilicet, quem significat Bernhardus. „et paulo post“ inquit „accessit alter benigne nobiscum a rev. D. Baynard communicatus; sed eadem fere utrisque communia erant vitia, utpote ex eodem codice, ut videtur, descriptis. ad Eutocium quidem publicandum non aliud repertum est exemplar Graecum praeter Baroccianum in Bibliotheca Bodleiana adservatum“. quos hic commemorat codices, ubi lateant, nescio; in bibliotheca Bodleiana equidem nullum codicem uel Apollonii uel Eutocii inueni praeter Canon. 106, qui anno demum 1817 Uenetiis eo peruenit. sed hoc quidem constat, uel Sauilium uel Halleium codicem habuisse e Paris. 2356 descriptum; nam pleraeque adnotationes et interpolationes Montaurei, quas supra p. XVII sq. ex illo codice adtuli, ab Halleio receptae sunt (3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et paullum mutatae 8, 13). his correcturis ueri simile est et Sauilium et Halleium suas quemque addidisse; sed quantum cuique debeatur, parum interest. ex iis, quae editio Halleiana propria habet, pauca recepi, ueri non dissimilia quaedam in

notis commemoraui, interpolationes inutiles ne notaui quidem, nunc etiam magis inutiles, quoniam tandem ad codices reditum est.

in libris V—VII edendis Halleius usus est „apographo Bodleiano codicis Arabici ex versione satis antiqua a Thebit ben Corah facta, sed annis abhinc circiter CCCCL a Nasir-Eddin recensita" (praef. p. 2), h. e. Bodl. 885, adhibitis etiam compendio Abdulmelikii (Bodl. 913, quem Rauius ex oriente asportauerat) et editione Borellii. opere demum perfecto Narcissus Marsh archiepiscopus Armachanus ex Hibernia „exemplar Golianum antiquissimum, quod ab heredibus Golii redemerat" (h. e. Bodl. 943, u. Nix p. 10) transmisit, de quo Halleius praef. p. 2: „ex hoc optimae notae codice, qui septem Apollonii libros complexus est, non solum versionem meam recensui et a mendis nonnullis liberaui, sed et lacunas aliquot, quae passim fere etiam in Graecis occurrebant, supplevi".

Post Halleium nihil ad uerba Apollonii emendanda effectum est; nam Balsam, qui a. 1861 Berolini interpretationem Germanicam edidit Halleium maxime secutus, rem criticam non curauit.

# APOLLONII CONICA.

# ΚΩΝΙΚΩΝ δ΄.

Ἀπολλώνιος Ἀττάλῳ χαίρειν.

Πρότερον μὲν ἐξέθηκα γράψας πρὸς Εὔδημον τὸν Περγαμηνὸν τῶν συντεταγμένων ἡμῖν κωνικῶν ἐν ὀκτὼ βιβλίοις τὰ πρῶτα τρία, μετηλλαχότος δ' ἐκείνου τὰ λοιπὰ διεγνωκότες πρός σε γράψαι διὰ τὸ φιλοτιμεῖσθαί σε μεταλαμβάνειν τὰ ὑφ' ἡμῶν πραγματευόμενα πεπόμφαμεν ἐπὶ τοῦ παρόντος σοι τὸ τέταρτον. περιέχει δὲ τοῦτο, κατὰ πόσα σημεῖα πλεῖστα δυνατόν ἐστι τὰς τῶν κώνων τομὰς ἀλλήλαις τε καὶ τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ συμβάλλειν, ἐάνπερ μὴ ὅλαι ἐπὶ ὅλας ἐφαρμόζωσιν, ἔτι κώνου τομὴ καὶ κύκλου περιφέρεια ταῖς ἀντικειμέναις κατὰ πόσα σημεῖα πλεῖστα συμβάλλουσι, καὶ ἐκτὸς τούτων ἄλλα οὐκ ὀλίγα ὅμοια τούτοις. τούτων δὲ τὸ μὲν προειρημένον Κόνων ὁ Σάμιος ἐξέθηκε πρὸς Θρασυδαῖον οὐκ ὀρθῶς ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν ἀναστραφείς· διὸ καὶ μετρίως αὐτοῦ ἀνθήψατο Νικοτέλης ὁ Κυρηναῖος. περὶ δὲ τοῦ δευτέρου μνείαν μόνον πεποίηται ὁ Νικοτέλης σὺν τῇ πρὸς τὸν Κόνωνα ἀντιγραφῇ ὡς δυναμένου δειχθῆναι, δεικνυμένῳ δὲ οὔτε ὑπ' αὐτοῦ τούτου οὔθ' ὑπ' ἄλλου τινὸς ἐντετεύχαμεν. τὸ μέντοι τρίτον καὶ τὰ ἄλλα τὰ ὁμο-

1. Ἀπολλωνίου Περγαίου κωνικῶν γ (δ̄ον m. 2) ἐκδόσεως Εὐτοκίου Ἀσκαλωνίτου εὐτυχῶς m. 1 V. 15. Κώνων V, corr. p et m. rec. V. 16. Θρασύδαιον V, θρασυδαρ̀ p. 18. Νικοτελής Vp, ut. lin. 19. 19. σύν] ἐν Halley cum Comm. 20. Κώνωνα V, corr. p et m. rec. V.

## CONICORUM LIBER IV.

Apollonius Attalo s.

Prius conicorum a nobis in octo libris conscriptorum primos tres exposui ad Eudemum Pergamenum eos mittens, illo autem mortuo reliquos ad te mittere statuimus, et quia uehementer desideras accipere, quae elaboraui, in praesenti quartum librum tibi misimus. is autem continet, in quot punctis summum fieri possit ut sectiones conorum inter se et cum ambitu circuli concurrant, ita ut non totae cum totis concidant, praeterea in quot punctis summum coni sectio et ambitus circuli cum sectionibus oppositis concurrant, et praeter haec alia non pauca his similia. horum autem quod primo loco posui, Conon Samius ad Thrasydaeum exposuit in demonstrationibus non recte uersatus; quare etiam Nicoteles Cyrenaeus suo iure eum uituperauit. alterum autem Nicoteles simul cum impugnatione Cononis obiter commemorauit tantum demonstrari posse contendens, sed nec ab eo ipso nec ab alio quoquam demonstratum inueni. tertium*) uero et cetera eius-

*) Tria illa, quae significat Apollonius, haec sunt: in quot punctis concurrant 1) sectiones coni inter se uel cum circulo, 2) sectiones coni cum oppositis, 3) circulus cum sectionibus oppositis; cfr. I p. 4, 20. Itaque opus non est cum Halleio post *συμβάλλουσι* lin. 14 interponere *καὶ ἔτι ἀντικείμεναι ἀντικειμέναις*. similiter Commandinus lin. 12 sq. habet: praeterea coni sectio et circuli circumferentia et oppositae sectiones oppositis sectionibus.

γενῆ τούτοις ἁπλῶς ὑπὸ οὐδενὸς νενοημένα εὕρηκα. πάντα δὲ τὰ λεχθέντα, ὅσοις οὐκ ἐντέτευχα, πολλῶν καὶ ποικίλων προσεδεῖτο ξενιζόντων θεωρημάτων, ὧν τὰ μὲν πλεῖστα τυγχάνω ἐν τοῖς πρώτοις τρισὶ βιβλίοις ἐκτεθεικώς, τὰ δὲ λοιπὰ ἐν τούτῳ. ταῦτα δὲ θεωρηθέντα χρείαν ἱκανὴν παρέχεται πρός τε τὰς τῶν προβλημάτων συνθέσεις καὶ τοὺς διορισμούς. Νικοτέλης μὲν γὰρ ἕνεκα τῆς πρὸς τὸν Κόνωνα διαφορᾶς οὐδεμίαν ὑπὸ τῶν ἐκ τοῦ Κόνωνος εὑρημένων εἰς τοὺς διορισμούς φησιν ἔρχεσθαι χρείαν οὐκ ἀληθῆ λέγων· καὶ γὰρ εἰ ὅλως ἄνευ τούτων δύναται κατὰ τοὺς διορισμοὺς ἀποδίδοσθαι, ἀλλά τοί γε δι' αὐτῶν ἔστι κατανοεῖν προχειρότερον ἔνια, οἷον ὅτι πλεοναχῶς ἢ τοσαυταχῶς ἂν γένοιτο, καὶ πάλιν ὅτι οὐκ ἂν γένοιτο· ἡ δὲ τοιαύτη πρόγνωσις ἱκανὴν ἀφορμὴν συμβάλλεται πρὸς τὰς ζητήσεις, καὶ πρὸς τὰς ἀναλύσεις δὲ τῶν διορισμῶν εὔχρηστα τὰ θεωρήματά ἐστι ταῦτα. χωρὶς δὲ τῆς τοιαύτης εὐχρηστίας καὶ δι' αὐτὰς τὰς ἀποδείξεις ἄξια ἔσται ἀποδοχῆς· καὶ γὰρ ἄλλα πολλὰ τῶν ἐν τοῖς μαθήμασι διὰ τοῦτο καὶ οὐ δι' ἄλλο τι ἀποδεχόμεθα.

α'.

Ἐὰν κώνου τομῆς ἢ κύκλου περιφερείας ληφθῇ τι σημεῖον ἐκτός, καὶ ἀπ' αὐτοῦ τῇ τομῇ προσπίπτωσι δύο εὐθεῖαι, ὧν ἡ μὲν ἐφάπτεται, ἡ δὲ τέμνει κατὰ δύο σημεῖα, καὶ ὃν ἔχει λόγον ὅλη ἡ τέμνουσα πρὸς τὴν ἐκτὸς ἀπολαμβανομένην μεταξὺ τοῦ τε σημείου καὶ τῆς γραμμῆς, τοῦτον τμηθῇ ἡ ἐντὸς ἀπολαμβανο-

---

1. εὕρηκ— V, ευρ euan.; „εὕρηκα sic in apographo" mg. m. rec. 3. ποικίλλων V. ξενίζων τῶν V; corr. cp. 9. ὑπό] ἐκ Halley. ἐκ] ὑπό Halley. 12. ἀποδίδοσθαι V.

dem generis a nullo prorsus excogitata repperi. omnia autem, quae diximus, quae quidem demonstrata non inuenerimus, multa et uaria flagitabant theoremata mirifica, quorum pleraque in primis tribus libris exposui, reliqua autem in hoc. haec uero perspecta usum satis magnum et ad compositiones problematum et ad determinationes praebent. Nicoteles enim propter suam cum Conone controuersiam negauit, ullum ab iis, quae Conon repperisset, ad determinationes usum proficisci, sed fallitur; nam etsi his omnino non usurpatis in determinationibus plene exponi possunt, attamen quaedam facilius per ea perspici possunt, uelut problema compluribus modis uel tot modis effici posse aut rursus non posse; et eius modi praeuia cognitio ad quaestiones satis magnum praebet adiumentum, et etiam ad analyses determinationum utilia sunt haec theoremata. uerum hac utilitate omissa etiam propter ipsas demonstrationes comprobatione digna erunt; nam etiam alia multa in mathematicis hac de causa nec de alia ulla comprobamus.

I.

Si extra coni sectionem uel ambitum circuli punctum aliquod sumitur, et ab eo ad sectionem duae rectae adcidunt, quarum altera contingit, altera in duobus punctis secat, et quam rationem habet tota recta secans ad partem extrinsecus inter punctum lineamque abscisam, secundum hanc recta intus abscisa secatur,

---

17. *διορισμῶν*] *ὁρισμῶν* Vp; corr. Halley. 22. *α′*] p, m. rec. V. 25. *ἐφάπτηται* V; corr. p. 26. *δύο*] $\bar{\beta}$ V. 28. *τοῦτον*] *εἰς τοῦτον* Halley.

μένη εὐθεῖα ὥστε τὰς ὁμολόγους εὐθείας πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ εἶναι, ἡ ἀπὸ τῆς ἀφῆς ἐπὶ τὴν διαίρεσιν ἀγομένη εὐθεῖα συμπεσεῖται τῇ γραμμῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἐπὶ τὸ ἐκτὸς σημεῖον ἀγομένη εὐθεῖα ἐφάπτεται τῆς γραμμῆς.

ἔστω γὰρ κώνου τομὴ ἢ κύκλου περιφέρεια ἡ $ΑΒΓ$, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐκτὸς τὸ $Δ$, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἡ μὲν $ΔΒ$ ἐφαπτέσθω κατὰ τὸ $Β$, ἡ δὲ $ΔΕΓ$ τεμνέτω τὴν τομὴν κατὰ τὰ $Ε$, $Γ$, καὶ ὃν ἔχει λόγον ἡ $ΓΔ$ πρὸς $ΔΕ$, τοῦτον ἐχέτω ἡ $ΓΖ$ πρὸς $ΖΕ$.

λέγω, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ $Β$ ἐπὶ τὸ $Ζ$ ἀγομένη συμπίπτει τῇ τομῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἐπὶ τὸ $Δ$ ἐφάπτεται τῆς τομῆς.


[ἐπεὶ οὖν ἡ $ΔΓ$ τέμνει τὴν τομὴν κατὰ δύο σημεῖα, οὐκ ἔσται διάμετρος αὐτῆς. δυνατὸν ἄρα ἐστὶ διὰ τοῦ $Δ$ διάμετρον ἀγαγεῖν· ὥστε καὶ ἐφαπτομένην.] ἤχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ $Δ$ ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἡ $ΔΑ$, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ $ΒΑ$ τεμνέτω τὴν $ΕΓ$, εἰ δυνατόν, μὴ κατὰ τὸ $Ζ$, ἀλλὰ κατὰ τὸ $Η$. ἐπεὶ οὖν ἐφάπτονται αἱ $ΒΔ$, $ΔΑ$, καὶ ἐπὶ τὰς ἀφάς ἐστιν ἡ $ΒΑ$, καὶ διῆκται ἡ $ΓΔ$ τέμνουσα τὴν μὲν τομὴν κατὰ τὰ $Γ$, $Ε$, τὴν δὲ $ΑΒ$ κατὰ τὸ $Η$, ἔσται ὡς ἡ $ΓΔ$ πρὸς $ΔΕ$, ἡ $ΓΗ$ πρὸς $ΗΕ$· ὅπερ ἄτοπον· ὑπόκειται γάρ, ὡς ἡ $ΓΔ$ πρὸς $ΔΕ$, ἡ $ΓΖ$ πρὸς $ΖΕ$. οὐκ ἄρα ἡ $ΒΑ$ καθ' ἕτερον σημεῖον τέμνει τὴν $ΓΕ$· κατὰ τὸ $Ζ$ ἄρα.

---

5. ἐφάψεται p et Halley. 6. ἢ] p, ἡ V. 16. ἐφαπτομένη v et comp. dubio V; corr. pc. 21. τά] τό V, corr. p. 23. $ΗΕ$] $ΗΒ$ Vp, corr. Memus.

ita ut rectae correspondentes ad idem punctum sint, recta a puncto contactus ad punctum diuisionis ducta cum linea concurret, et recta a puncto concursus ad punctum extrinsecus positum ducta lineam contingit.

sit enim $AB\Gamma$ coni sectio uel arcus circuli, et punctum aliquod $\Delta$ extrinsecus sumatur, ab eoque $\Delta B$ contingat in $B$, $\Delta E\Gamma$ autem sectionem in $E$, $\Gamma$ secet, et sit $\Gamma Z : ZE = \Gamma\Delta : \Delta E$.




dico, rectam a $B$ ad $Z$ ductam cum sectione concurrere et rectam a puncto concursus ad $\Delta$ ductam sectionem contingere.

ducatur[1]) enim a $\Delta$ sectionem contingens $\Delta A$, et ducta $BA$ rectam $E\Gamma$, si fieri potest, in $Z$ ne secet, sed in $H$. quoniam igitur $B\Delta$, $\Delta A$ contingunt, et $BA$ ad puncta contactus ducta est, $\Gamma\Delta$ autem sectionem in $\Gamma$, $E$, $AB$ autem in $H$ secans ducta est, erit [III, 37] $\Gamma\Delta : \Delta E = \Gamma H : HE$; quod absurdum est; supposuimus enim, esse $\Gamma\Delta : \Delta E = \Gamma Z : ZE$. itaque $BA$ rectam $\Gamma E$ in alio puncto non secat. ergo in $Z$ secat.

1) Quae praemittuntur uerba lin. 14—16, subditiua sunt. nam primum falsa sunt (quare pro ἔσται Halley scripsit οὖσα sine ulla probabilitate), deinde, etiamsi bene se haberent omnia, inutilia sunt; denique γάρ lin. 17, quod initio demonstrationis recte collocatur, post prooemium illud absurdum est. hoc sentiens scriptor librarius codicis p γάρ omisit lin. 17 et lin. 14 οὖν in γάρ mutauit.

β'.

Ταῦτα μὲν κοινῶς ἐπὶ πασῶν τῶν τομῶν δείκνυται, ἐπὶ δὲ τῆς ὑπερβολῆς μόνης· ἐὰν ἡ μὲν ΔΒ ἐφάπτηται, ἡ δὲ ΔΓ τέμνῃ κατὰ δύο σημεῖα τὰ Ε, Γ, τὰ δὲ Ε, Γ περιέχῃ τὴν κατὰ τὸ Β ἁφήν, καὶ τὸ Δ σημεῖον ἐντὸς ᾖ τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης γωνίας, ὁμοίως ἡ ἀπόδειξις γενήσεται· δυνατὸν γὰρ ἀπὸ τοῦ Δ σημείου ἄλλην ἐφαπτομένην ἀγαγεῖν εὐθεῖαν τὴν ΔΑ καὶ τὰ λοιπὰ τῆς ἀποδείξεως ὁμοίως ποιεῖν.

γ'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων τὰ Ε, Γ σημεῖα μὴ περιεχέτωσαν τὴν κατὰ τὸ Β ἁφὴν μεταξὺ αὐτῶν, τὸ δὲ Δ σημεῖον ἐντὸς ἔστω τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης γωνίας. δυνατὸν ἄρα ἀπὸ τοῦ Δ ἑτέραν ἐφαπτομένην ἀγαγεῖν τὴν ΔΑ καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως ἀποδεικνύειν.

δ'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων ἐὰν αἱ μὲν Ε, Γ συμπτώσεις τὴν κατὰ τὸ Β ἁφὴν περιέχωσι, τὸ δὲ Δ σημεῖον ᾖ ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης, ἡ ἀπὸ τῆς ἁφῆς ἐπὶ τὴν διαίρεσιν ἀγομένη εὐθεῖα συμπεσεῖται τῇ ἀντικειμένῃ τομῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἀγομένη εὐθεῖα ἐφάψεται τῆς ἀντικειμένης.

---

1. β'] vp, om. V. 5. τήν] p, om. V. 10. γ'] p, om. Vv. 12. τὸ δέ] scripsi cum Memo, τό V, καὶ τό p. 13. ἔσται V; corr. p. 16. δ'] p, om. V, γ' v. 21. συμπεσῆται V; corr. pc.


## II.

Haec quidem communiter in omnibus sectionibus demonstrantur, in hyperbola autem sola hocce:

si $\varDelta B$ contingit, $\varDelta \varGamma$ autem in duobus punctis $E, \varGamma$ secat, et puncta $E, \varGamma$ punctum contactus $B$ continent, et punctum $\varDelta$ intra angulum ab asymptotis comprehensum positum est, demonstratio similiter conficietur; nam fieri potest, ut a $\varDelta$ puncto aliam rectam contingentem $\varDelta A$ ducamus et reliquam demonstrationem similiter conficiamus.

## III.

Iisdem positis puncta $E, \varGamma$ punctum contactus $B$ inter se ne contineant, punctum autem $\varDelta$ intra angulum ab asymptotis comprehensum positum sit. itaque fieri potest, ut a $\varDelta$ aliam contingentem ducamus $\varDelta A$ et reliqua similiter demonstremus.




## IV.

Iisdem positis si puncta concursus $E, \varGamma$ punctum contactus $B$ continent, $\varDelta$ autem punctum in angulo positum est, qui angulo ab asymptotis comprehenso deinceps positus est, recta a puncto contactus ad punctum diuisionis ducta cum sectione opposita concurret, et recta a puncto concursus ducta oppositam continget.


ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ Β, Θ καὶ ἀσύμπτωτοι αἱ ΚΛ, ΜΞΝ καὶ τὸ Δ σημεῖον ἐν τῇ ὑπὸ ΔΞΝ γωνίᾳ, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἐφαπτέσθω μὲν ἡ ΔΒ, τεμνέτω δὲ ἡ ΔΓ, καὶ αἱ Ε, Γ συμπτώσεις περιεχέτωσαν τὴν Β ἁφήν, καὶ ὃν ἔχει λόγον ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ, ἐχέτω ἡ ΓΖ πρὸς ΖΕ.

δεικτέον, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Ζ ἐπιζευγνυμένη συμπεσεῖται τῇ Θ τομῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἐπὶ τὸ Δ ἐφάψεται τῆς τομῆς.

ἤχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ Δ ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἡ ΔΘ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΘΒ πιπτέτω, εἰ δυνατόν, μὴ διὰ τοῦ Ζ, ἀλλὰ διὰ τοῦ Η. ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ, ἡ ΓΗ πρὸς ΗΕ· ὅπερ ἄτοπον· ὑπόκειται γάρ, ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ, ἡ ΓΖ πρὸς ΖΕ.

ε'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων ἐὰν τὸ Δ σημεῖον ἐπί τινος ᾖ τῶν ἀσυμπτώτων, ἡ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Ζ ἀγομένη παράλληλος ἔσται τῇ αὐτῇ ἀσυμπτώτῳ.





ὑποκείσθω γὰρ τὰ αὐτά, καὶ τὸ Δ σημεῖον ἔστω ἐπὶ μιᾶς τῶν ἀσυμπτώτων τῆς ΜΝ. δεικτέον, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Β τῇ ΜΝ παράλληλος ἀγομένη ἐπὶ τὸ Ζ πεσεῖται.

---

15. ε'] p, om. V, δ' v; et sic deinceps. 17. τῶν ἀ- bis V in extr. et init. pag.; corr. pc.

sint oppositae $B$, $\Theta$ asymptotaeque $K\Lambda$, $M\Xi N$, punctum autem $\Delta$ in angulo $\Lambda\Xi N$ positum, ab eo-




que contingat $\Delta B$, secet autem $\Delta\Gamma$, et puncta concursus $E$, $\Gamma$ punctum contactus $B$ contineant, sit autem $\Gamma Z : ZE = \Gamma\Delta : \Delta E$.

demonstrandum, rectam a $B$ ad $Z$ ductam cum sectione $\Theta$ concurrere, rectamque a puncto concursus ad $\Delta$ ductam sectionem contingere.

ducatur enim a $\Delta$ sectionem contingens $\Delta\Theta$, et ducta $\Theta B$, si fieri potest, per $Z$ ne cadat, sed per $H$. itaque [III, 37] $\Gamma\Delta : \Delta E = \Gamma H : HE$; quod absurdum est; supposuimus enim, esse $\Gamma\Delta : \Delta E = \Gamma Z : ZE$.

## V.

Iisdem positis si $\Delta$ punctum in alterutra asymptotarum est, recta a $B$ ad $Z$ ducta eidem asymptotae parallela erit.

supponantur enim eadem, et punctum $\Delta$ in alterutra asymptotarum $MN$ sit. demonstrandum, rectam a $B$ rectae $MN$ parallelam ductam in $Z$ cadere.

μὴ γάρ, ἀλλ', εἰ δυνατόν, ἔστω ἡ ΒΗ. ἔσται δή, ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ, ἡ ΓΗ πρὸς ΗΕ· ὅπερ ἀδύνατον.

ς'.

Ἐὰν ὑπερβολῆς ληφθῇ τι σημεῖον ἐκτός, καὶ ἀπ' αὐτοῦ πρὸς τὴν τομὴν διαχθῶσι δύο εὐθεῖαι, ὧν ἡ μὲν ἐφάπτεται, ἡ δὲ παράλληλος [ᾖ] μιᾷ τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ τῇ ἀπολαμβανομένῃ ἀπὸ τῆς παραλλήλου μεταξὺ τῆς τομῆς καὶ τοῦ σημείου ἴση ἐπ' εὐθείας ἐντὸς τῆς τομῆς τεθῇ, ἡ ἀπὸ τῆς ἀφῆς ἐπὶ τὸ γινόμενον σημεῖον ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα συμπεσεῖται τῇ τομῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἐπὶ τὸ ἐκτὸς σημεῖον ἀγομένη ἐφάψεται τῆς τομῆς.

ἔστω ὑπερβολὴ ἡ ΑΕΒ, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐκτὸς τὸ Δ, καὶ ἔστω πρότερον ἐντὸς τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης γωνίας τὸ Δ, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἡ μὲν ΒΔ ἐφαπτέσθω, ἡ δὲ ΔΕΖ παράλληλος ἔστω τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ κείσθω τῇ ΔΕ ἴση ἡ ΕΖ. λέγω, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Ζ ἐπιζευγνυμένη συμπεσεῖται τῇ τομῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἐπὶ τὸ Δ ἐφάψεται τῆς τομῆς.

ἤχθω γὰρ ἐφαπτομένη τῆς τομῆς ἡ ΔΑ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΒΑ τεμνέτω τὴν ΔΕ, εἰ δυνατόν, μὴ κατὰ τὸ Ζ, ἀλλὰ καθ' ἕτερόν τι τὸ Η. ἔσται δὴ ἴση ἡ ΔΕ τῇ ΕΗ· ὅπερ ἄτοπον· ὑπόκειται γὰρ ἡ ΔΕ τῇ ΕΖ ἴση.

---

2. ΗΕ] p, ΓΕ V. 5. δύο] $\bar{\beta}$ V. 6. ἐφάπτηται p. ᾖ] Vp; deleo.

ne cadat enim, sed, si fieri potest, sit $BH$. itaque erit [III, 35]


$$\Gamma\Delta : \Delta E = \Gamma H : HE;$$

quod fieri non potest.

## VI.

Si extra hyperbolam punctum aliquod sumitur, ab eoque ad sectionem duae rectae perducuntur, quarum altera contingit, altera alterutri asymptotarum parallela est, et rectae de parallelo inter sectionem punctumque abscisae aequalis recta in ea producta intra sectionem ponitur, recta a puncto contactus ad punctum ita ortum ducta cum sectione concurret, et recta a puncto concursus ad punctum extrinsecus positum ducta sectionem continget.

sit hyperbola $AEB$, et extrinsecus sumatur punctum aliquod $\Delta$, et prius $\Delta$ positum sit intra angulum ab asymptotis comprehensum, ab eoque contingat $B\Delta$, $\Delta EZ$ autem alteri asymptotae sit parallela, ponaturque $EZ = \Delta E$. dico, rectam a $B$ ad $Z$ ductam cum sectione concurrere, et rectam a puncto concursus ad $\Delta$ ductam sectionem contingere.





ducatur enim $\Delta A$ sectionem contingens, et ducta $BA$, si fieri potest, rectam $\Delta E$ in $Z$ ne secet, sed in alio puncto $H$. erit igitur $\Delta E = EH$ [III, 30]; quod absurdum est; supposuimus enim, esse

$$\Delta E = EZ.$$

ζ'.

*Τῶν αὐτῶν ὄντων τὸ Δ σημεῖον ἔστω ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης. λέγω, ὅτι καὶ οὕτως τὰ αὐτὰ συμβήσεται.*




*ἤχθω γὰρ ἐφαπτομένη ἡ ΔΘ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΘΒ πιπτέτω, εἰ δυνατόν, μὴ διὰ τοῦ Z, ἀλλὰ διὰ τοῦ H. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΔE τῇ EH· ὅπερ ἄτοπον· ὑπόκειται γὰρ ἡ ΔE τῇ EZ ἴση.*

η'.

*Τῶν αὐτῶν ὄντων ἔστω τὸ Δ σημεῖον ἐπὶ μιᾶς τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ τὰ λοιπὰ γινέσθω τὰ αὐτά.*

*λέγω, ὅτι ἡ ἀπὸ τῆς ἁφῆς ἐπ' ἄκραν τὴν ἀπολῃφθεῖσαν ἀγομένη παράλληλος ἔσται τῇ ἀσυμπτώτῳ, ἐφ' ἧς ἔσται τὸ Δ σημεῖον.*

*ἔστω γὰρ τὰ εἰρημένα, καὶ κείσθω τῇ ΔE ἴση ἡ EZ, καὶ ἀπὸ τοῦ B παράλληλος τῇ MN ἤχθω, εἰ δυνατόν, ἡ BH. ἴση ἄρα ἡ ΔE τῇ EH· ὅπερ ἄτοπον· ὑπόκειται γὰρ ἡ ΔE τῇ EZ ἴση.*

ϑ'.

*Ἐὰν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου δύο εὐθεῖαι ἀχθῶσι τέμνουσαι κώνου τομὴν ἢ κύκλου περιφέρειαν ἑκατέρα κατὰ δύο σημεῖα, καὶ ὡς ἔχουσιν αἱ ὅλαι πρὸς τὰς*

25. δύο] $\bar{\beta}$ V. 27. δύο] $\bar{\beta}$ V.


## VII.

Iisdem positis punctum $\Delta$ in angulo positum sit, qui angulo ab asymptotis comprehenso deinceps est positus. dico, sic quoque eadem adcidere.

ducatur enim contingens $\Delta\Theta$, et ducta $\Theta B$, si fieri potest, per $Z$ ne cadat, sed per $H$. erit igitur $\Delta E = EH$; quod absurdum est; supposuimus enim, esse $\Delta E = EZ$.

## VIII.

Iisdem positis punctum $\Delta$ in alterutra asymptotarum positum sit, et cetera eadem sint.




dico, rectam a puncto contactus ad extremam rectam abscisam ductam ei asymptotae parallelam esse, in qua positum sit punctum $\Delta$.

sint enim ea, quae diximus, et ponatur

$$EZ = \Delta E,$$

et a $B$ rectae $MN$ parallela ducatur, si fieri potest, $BH$. itaque $\Delta E = EH$ [III, 34]; quod absurdum est; supposuimus enim, esse $\Delta E = EZ$.

## IX.

Si ab eodem puncto duae rectae ducuntur coni sectionem uel arcum circuli singulae in binis punctis secantes, et ut totae se habent ad partes extrinsecus

ἐκτὸς ἀπολαμβανομένας, οὕτως αἱ ἐντὸς ἀπολαμβανόμεναι διαιρεθῶσιν, ὥστε τὰς ὁμολόγους πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ εἶναι, ἡ διὰ τῶν διαιρέσεων ἀγομένη εὐθεῖα συμπεσεῖται τῇ τομῇ κατὰ δύο σημεῖα, καὶ αἱ ἀπὸ τῶν συμπτώσεων ἐπὶ τὸ ἐκτὸς σημεῖον ἀγόμεναι ἐφάψονται τῆς γραμμῆς.

ἔστω γὰρ τῶν προειρημένων γραμμῶν τις ἡ ΑΒ, καὶ ἀπό τινος σημείου τοῦ Δ διήχθωσαν αἱ ΔΕ, ΔΖ τέμνουσαι τὴν γραμμὴν ἡ μὲν κατὰ τὰ Θ, Ε, ἡ δὲ κατὰ τὰ Ζ, Η, καὶ ὃν μὲν ἔχει λόγον ἡ ΔΕ πρὸς ΘΔ, τοῦτον ἐχέτω ἡ ΕΛ πρὸς ΛΘ, ὃν δὲ η ΔΖ πρὸς ΔΗ, ἡ ΖΚ πρὸς ΚΗ. λέγω, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὸ Κ ἐπιζευγνυμένη συμπεσεῖται ἐφ' ἑκάτερα τῇ τομῇ, καὶ αἱ ἀπὸ τῶν συμπτώσεων ἐπὶ τὸ Δ ἐπιζευγνύμεναι ἐφάψονται τῆς τομῆς.

ἐπεὶ γὰρ αἱ ΕΔ, ΖΔ ἑκατέρα κατὰ δύο σημεῖα τέμνει την τομήν, δυνατόν ἐστιν ἀπὸ τοῦ Δ διάμετρον ἀγαγεῖν τῆς τομῆς· ὥστε καὶ ἐφαπτομένας ἐφ' ἑκάτερα. ἤχθωσαν ἐφαπτόμεναι αἱ ΔΒ, ΔΑ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΒΑ, εἰ δυνατόν, μὴ ἐρχέσθω διὰ τῶν Λ, Κ, ἀλλ' ἤτοι διὰ τοῦ ἑτέρου αὐτῶν ἢ δι' οὐδετέρου.

ἐρχέσθω πρότερον διὰ μόνου τοῦ Λ καὶ τεμνέτω τὴν ΖΗ κατὰ τὸ Μ. ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΖΔ πρὸς ΔΗ, ἡ ΖΜ πρὸς ΜΗ· ὅπερ ἄτοπον· ὑπόκειται γάρ, ὡς ἡ ΖΔ πρὸς ΔΗ, ἡ ΖΚ πρὸς ΚΗ.

ἐὰν δὲ ἡ ΒΑ μηδὲ δι' ἑτέρου τῶν Λ, Κ πορεύηται, ἐφ' ἑκατέρας τῶν ΔΕ, ΔΖ συμβήσεται τὸ ἄτοπον.

---


6. γραμμῆς] c, corr. ex τομῆς m. 1 V. 12. Κ] p, ΚΕ V. 26. Λ] p, Α V. 27. ΔΕ, ΔΖ] p; ΔΕ, ΕΖ V.

abscisas, ita partes intus abscisae diuiduntur, ita ut partes correspondentes ad idem punctum positae sint, recta per puncta diuisionis ducta cum sectione in duobus punctis concurret, et rectae a punctis concursus ad punctum extrinsecus positum ductae lineam contingent.

sit enim $AB$ aliqua linearum, quas diximus, et a puncto aliquo $\Delta$ perducantur $\Delta E$, $\Delta Z$ lineam secantes altera in $\Theta$, $E$, altera autem in $Z$, $H$, sitque

$$\Delta E : \Theta\Delta = E\Lambda : \Lambda\Theta, \quad \Delta Z : \Delta H = ZK : KH.$$

dico, rectam ab $\Lambda$ ad $K$ ductam in utramque partem cum sectione concurrere, et rectas a punctis concursus ad $\Delta$ ductas sectionem contingere.




quoniam enim $E\Delta$, $Z\Delta$ singulae in binis punctis sectionem secant, fieri potest, ut a $\Delta$ diametrus sectionis ducatur. quare etiam contingentes in utramque partem. ducantur contingentes $\Delta B$, $\Delta A$, et ducta $BA$, si fieri potest, per $\Lambda$, $K$ ne cadat, sed aut per alterutrum aut per nêutrum.

prius per $\Lambda$ solum cadat rectamque $ZH$ in $M$ secet. itaque [III, 37] $Z\Delta : \Delta H = ZM : MH$; quod absurdum est; nam supposuimus, esse

$$Z\Delta : \Delta H = ZK : KH.$$

sin $BA$ per neutrum punctorum $\Lambda$, $K$ cadit, in utraque $\Delta E$, $\Delta Z$ absurdum eueniet.

ιʹ.

Ταῦτα μὲν κοινῶς, ἐπὶ δὲ τῆς ὑπερβολῆς μόνης· ἐὰν τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ ὑπάρχῃ, αἱ δὲ τῆς μιᾶς εὐθείας συμπτώσεις περιέχωσι τὰς τῆς ἑτέρας συμπτώσεις, καὶ τὸ Δ σημεῖον ἐντὸς ᾖ τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης γωνίας, τὰ αὐτὰ συμβήσεται τοῖς προειρημένοις, ὡς προείρηται ἐν τῷ β̅ θεωρήματι.

ιαʹ.

Τῶν αὐτῶν ὄντων ἐὰν αἱ τῆς μιᾶς συμπτώσεις μὴ περιέχωσι τὰς τῆς ἑτέρας συμπτώσεις, τὸ μὲν Δ σημεῖον ἐντὸς ἔσται τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης γωνίας, καὶ ἡ καταγραφὴ καὶ ἡ ἀπόδειξις ἡ αὐτὴ τῷ θ̅.

ιβʹ.

Τῶν αὐτῶν ὄντων ἐὰν περιέχωσιν αἱ τῆς μιᾶς εὐθείας συμπτώσεις τὰς τῆς ἑτέρας, καὶ τὸ ληφθὲν σημεῖον ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης ᾖ, ἡ διὰ τῶν διαιρέσεων ἀγομένη εὐθεῖα ἐκβαλλομένη τῇ ἀντικειμένῃ τομῇ συμπεσεῖται, καὶ αἱ ἀπὸ τῶν συμπτώσεων ἐπὶ τὸ Δ σημεῖον ἀγόμεναι εὐθεῖαι ἐφάψονται τῶν ἀντικειμένων.

ἔστω ὑπερβολὴ ἡ ΕΗ, ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ ΝΞ, ΟΠ, καὶ κέντρον τὸ Ρ, καὶ τὸ Δ σημεῖον ἔστω ἐν τῇ ὑπὸ ΞΡΠ γωνίᾳ, καὶ ἤχθωσαν αἱ ΔΕ, ΔΖ τέμνουσαι τὴν ὑπερβολὴν ἑκατέρα κατὰ δύο σημεῖα, καὶ περιεχέσθω τὰ Ε, Θ ὑπὸ τῶν Ζ, Η, καὶ ἔστω, ὡς μὲν ἡ ΕΔ πρὸς ΔΘ, ἡ ΕΚ πρὸς ΚΘ, ὡς δὲ ἡ ΖΔ πρὸς ΔΗ, ἡ ΖΛ

10. τὸ μέν] τὸ δέ Halley praeeunte Commandino. 11. ἔσται] ᾖ Halley. 18. διαιρέσεων] p, αἱρέσεων V. 24. τέμνουσαι] cp, bis V. 25. δύο] β̅ V.

## X.

Haec quidem communiter, in hyperbola autem sola sic: si reliqua eadem supponuntur, puncta autem concursus alterius rectae puncta concursus alterius continent, et punctum $\Delta$ intra angulum ab asymptotis comprehensum positum est, eadem euenient, quae antea diximus, sicut prius dictum est in propositione II.

## XI.

Iisdem positis si puncta concursus alterius puncta concursus alterius non continent, punctum $\Delta$ intra angulum ab asymptotis comprehensum positum erit,[1]) et figura demonstratioque eadem erit, quae in propositione IX.

## XII.

Iisdem positis si puncta concursus alterius rectae puncta concursus alterius continent, et punctum sumptum in angulo positum est, qui angulo ab asymptotis comprehenso deinceps est positus, recta per puncta diuisionis ducta producta cum sectione opposita concurret, et rectae a punctis concursus ad $\Delta$ punctum ductae sectiones oppositas contingent.

sit $EH$ hyperbola, asymptotae autem $N\Xi$, $O\Pi$, et centrum $P$, $\Delta$ autem punctum in angulo $\Xi P\Pi$ positum sit, ducanturque $\Delta E$, $\Delta Z$ hyperbolam secantes singulae in binis punctis, et $E$, $\Theta$ a $Z$, $H$ contineantur, sit autem $E\Delta : \Delta\Theta = EK : K\Theta$, $Z\Delta : \Delta H = Z\Lambda : \Lambda H$. demonstrandum, rectam per $K$, $\Lambda$ ductam cum sectione

1) Hoc quidem falsum est, sed emendatio incerta.

Τι

ἐὰν τι

εὐθεῖα

σεις.

πτώτω

προει

Ἡ

μὴ π

σημει

εχομε

ἢ αὐ

Τ

εὐθεῖ

σημει

περι

ἐκβ

ἀπὸ

εὐθ

καὶ

Ξρ

ὑπ

τὸ


Δι

ἔστ

τον

ΜΣ.

$EZ$ et cum sectione opposita concurrere, et rectas a punctis concursus ad $\varDelta$ ductas sectiones contingere.




opposita igitur sit $M$, et a $\varDelta$ sectiones contingentes ducantur $\varDelta M$, $\varDelta \Sigma$, ductaque $M\Sigma$, si fieri potest, per $K$, $\varLambda$ ne cadat, sed aut per alterutrum aut per neutrum eorum.

prius per $K$ cadat et rectam $ZH$ in $X$ secet. itaque [III, 37] $Z\varDelta : \varDelta H = XZ : XH$; quod absurdum est; supposuimus enim, esse

$$Z\varDelta : \varDelta H = Z\varLambda : \varLambda H.$$

sin per neutrum punctorum $K$, $\varLambda$ cadit $M\Sigma$, in utraque $E\varDelta$, $\varDelta Z$ absurdum euenit.

## XIII.

Iisdem positis si punctum $\varDelta$ in alterutra asymptotarum positum est, et reliqua eadem supponuntur, recta per puncta diuisionis ducta parallela erit asymptotae, in qua punctum positum est, et producta cum sectione concurret, et recta a puncto concursus ad punctum ducta sectionem continget.

sit enim hyperbola asymptotaeque, et in alterutra asymptotarum sumatur $\varDelta$, producanturque rectae et diuidantur, sicut dictum est, a $\varDelta$ autem sectionem


ἀπὸ τοῦ Β παρὰ τὴν ΠΟ ἀγομένη ἥξει διὰ τῶν Κ, Λ.

εἰ γαρ μή, ἤτοι διὰ τοῦ ἑνὸς αὐτῶν ἐλεύσεται ἢ δι' οὐδετέρου.

ἐρχέσθω διὰ μόνου τοῦ Κ. ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΖΔ προς ΔΗ, ἡ ΖΧ πρὸς ΧΗ· ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ Β παρὰ τὴν ΠΟ ἀγομένη διὰ μόνου τοῦ Κ ἐλεύσεται· δι' ἀμφοτέρων ἄρα.

## ιδ'.

Τῶν αὐτῶν ὄντων ἐὰν τὸ Δ σημεῖον ἐπὶ μιᾶς ᾖ τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ ἡ μὲν ΔΕ τέμνῃ τὴν τομὴν κατὰ δύο σημεῖα, ἡ δὲ ΔΗ κατὰ μόνον τὸ Η παράλληλος οὖσα τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ γένηται, ὡς ἡ ΔΕ πρὸς ΔΘ, ἡ ΕΚ πρὸς ΚΘ, τῇ δὲ ΔΗ ἴση ἐπ' εὐθείας τεθῇ ἡ ΗΛ, ἡ διὰ τῶν Κ, Λ σημείων ἀγομένη παράλληλός τε ἔσται τῇ ἀσυμπτώτῳ καὶ συμπεσεῖται τῇ τομῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἐπὶ τὸ Δ ἐφάψεται τῆς τομῆς.





ὁμοίως γὰρ τῷ προειρημένῳ ἀγαγὼν τὴν ΔΒ ἐφαπτομένην λέγω, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Β παρὰ τὴν ΠΟ ἀσύμπτωτον ἀγομένη ἥξει διὰ τῶν Κ, Λ σημείων.

εἰ οὖν διὰ τοῦ Κ μόνου ἥξει, οὐκ ἔσται ἡ ΔΗ τῇ ΗΛ ἴση· ὅπερ ἄτοπον. εἰ δὲ διὰ τοῦ Λ μόνου, οὐκ ἔσται, ὡς ἡ ΕΔ πρὸς ΔΘ, ἡ ΕΚ πρὸς ΚΘ. εἰ

6. πρὸς ΧΗ] p, om. V. 7. Κ] Β Vp; corr. Halley.

contingens ducatur $\Delta B$. dico, rectam a $B$ rectae $\Pi O$ parallelam ductam per $K$, $\Lambda$ cadere.




nam si minus, aut per alterutrum eorum cadet aut per neutrum.

cadat per $K$ solum. itaque [III, 35] $Z\Delta : \Delta H = ZX : XH$; quod absurdum est. ergo recta a $B$ rectae $\Pi O$ parallela ducta per $K$ solum non cadet. ergo per utrumque cadet.

## XIV.

Iisdem positis si punctum $\Delta$ in alterutra asymptotarum positum est, et $\Delta E$ sectionem in duobus punctis secat, $\Delta H$ autem alteri asymptotarum parallela in $H$ solo, et fit $EK : K\Theta = \Delta E : \Delta\Theta$, poniturque in $\Delta H$ producta $H\Lambda = \Delta H$, recta per $K$, $\Lambda$ puncta ducta et asymptotae parallela erit et cum sectione concurret, rectaque a puncto concursus ad $\Delta$ ducta sectionem continget.

nam eodem modo, quo in praecedenti, ducta $\Delta B$ contingenti dico, rectam a $B$ asymptotae $\Pi O$ parallelam ductam per puncta $K$, $\Lambda$ cadere.

si igitur per $K$ solum cadit, non erit $\Delta H = H\Lambda$ [III, 34]; quod absurdum est. sin per $\Lambda$ solum cadit, non erit $E\Delta : \Delta\Theta = EK : K\Theta$ [III, 35]. sin neque per $K$ neque per $\Lambda$ cadit, utrobique absurdum eueniet. ergo per utrumque cadet.

δὲ μήτε διὰ τοῦ Κ μήτε διὰ τοῦ Λ, κατ' ἀμφότερα συμβήσεται τὸ ἄτοπον. δι' ἀμφοτέρων ἄρα ἐλεύσεται.

ιε'.

Ἐὰν ἐν ἀντικειμέναις ληφθῇ τι σημεῖον μεταξὺ τῶν δύο τομῶν, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἡ μὲν ἐφάπτηται μιᾶς τῶν ἀντικειμένων, ἡ δὲ τέμνῃ ἑκατέραν τῶν ἀντικειμένων, καὶ ὡς ἔχει ἡ μεταξὺ τῆς ἑτέρας τομῆς, ἧς οὐκ ἐφάπτεται ἡ εὐθεῖα, καὶ τοῦ σημείου πρὸς τὴν μεταξὺ τοῦ σημείου καὶ τῆς ἑτέρας τομῆς, οὕτως ἔχῃ μείζων τις εὐθεῖα τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν πρὸς τὴν ὑπεροχὴν αὐτῆς κειμένην ἐπ' εὐθείας τε καὶ πρὸς τῷ αὐτῷ πέρατι τῇ ὁμολόγῳ, ἡ ἀπὸ τοῦ πέρατος τῆς μείζονος εὐθείας ἐπὶ τὴν ἁφὴν ἀγομένη συμπεσεῖται τῇ τομῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἐπὶ τὸ ληφθὲν σημεῖον ἀγομένη ἐφάπτεται τῆς τομῆς.


ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ Α, Β, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον μεταξὺ τῶν τομῶν τὸ Δ ἐντὸς τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης γωνίας, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἡ μὲν ΔΖ διήχθω ἐφαπτομένη, ἡ δὲ ΑΔΒ τέμνουσα τὰς τομάς, καὶ ὃν ἔχει λόγον ἡ ΑΔ πρὸς ΔΒ, ἐχέτω ἡ ΑΓ πρὸς ΓΒ. δεικτέον, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ Γ ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ τομῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἐπὶ τὸ Δ ἀγομένη ἐφάψεται τῆς τομῆς.

ἐπεὶ γὰρ τὸ Δ σημεῖον ἐντός ἐστι τῆς περιεχούσης τὴν τομὴν γωνίας, δυνατόν ἐστι καὶ ἑτέραν ἐφαπτομένην ἀγαγεῖν ἀπὸ τοῦ Δ. ἤχθω ἡ ΔΕ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΖΕ ἐρχέσθω, εἰ δυνατόν, μὴ διὰ τοῦ Γ,

9. ἔχει Vp; corr. Halley. 15. ἐφάψεται p. 19. ΑΔΒ] p, ΑΒΔ V.

## XV.

Si in sectionibus oppositis punctum aliquod inter duas sectiones sumitur, et ab eo altera recta alterutram oppositarum contingit, altera utramque sectionem secat, et ut est recta inter alteram sectionem, quam non contingit recta illa, et punctum posita ad rectam inter punctum alteramque sectionem positam, ita est recta aliqua maior recta inter sectiones posita ad excessum in ea producta et ad eundem terminum positum ac partem correspondentem, recta a termino maioris rectae ad punctum contactus ducta cum sectione concurret, et recta a puncto concursus ad sumptum punctum ducta sectionem contingit.




sint oppositae $A$, $B$, sumaturque inter sectiones punctum aliquod $\Delta$ intra angulum ab asymptotis comprehensum positum, et ab eo $\Delta Z$ producatur contingens, $A\Delta B$ autem sectiones secans, sitque $A\Gamma : \Gamma B = A\Delta : \Delta B$. demonstrandum, rectam a $Z$ ad $\Gamma$ ductam productam cum sectione concurrere, et rectam a puncto concursus ad $\Delta$ ductam sectionem contingere.


quoniam enim $\Delta$ punctum intra angulum sectionem comprehendentem positum est, fieri potest, ut a $\Delta$ aliam quoque contingentem ducamus [II, 49]. du-

ἀλλὰ διὰ τοῦ *Η*. ἔσται δή, ὡς ἡ *ΑΔ* πρὸς *ΔΒ*, ἡ *ΑΗ* πρὸς *ΗΒ*· ὅπερ ἄτοπον· ὑπόκειται γάρ, ὡς ἡ *ΑΔ* πρὸς *ΔΒ*, ἡ *ΑΓ* πρὸς *ΓΒ*.

ιϛʹ.

Τῶν αὐτῶν ὄντων ἔστω τὸ *Δ* σημεῖον ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ αὐτὰ γινέσθω.

λέγω, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ *Ζ* ἐπὶ τὸ *Γ* ἐπιζευγνυμένη ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται τῇ ἀντικειμένῃ τομῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἐπὶ τὸ *Δ* ἐφάψεται τῆς ἀντικειμένης τομῆς.




ἔστω γὰρ τὰ αὐτά, καὶ τὸ *Δ* σημεῖον ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης, καὶ ἤχθω ἀπὸ τοῦ *Δ* ἐφαπτομένη τῆς *Α* τομῆς ἡ *ΔΕ*, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ *ΕΖ* καὶ ἐκβαλλομένη, εἰ δυνατόν, μὴ ἐρχέσθω ἐπὶ τὸ *Γ*, ἀλλ' ἐπὶ τὸ *Η*. ἔσται δή, ὡς ἡ *ΑΗ* πρὸς *ΗΒ*, ἡ *ΑΔ* πρὸς *ΔΒ*· ὅπερ ἄτοπον· ὑπόκειται γάρ, ὡς ἡ *ΑΔ* πρὸς *ΔΒ*, ἡ *ΑΓ* πρὸς *ΓΒ*.

ιζʹ.

Τῶν αὐτῶν ὄντων ἔστω τὸ *Δ* σημεῖον ἐπί τινος τῶν ἀσυμπτώτων.

catur $\Delta E$, et ducta $ZE$, si fieri potest, per $\Gamma$ ne cadat, sed per $H$. erit igitur $A\Delta : \Delta B = AH : HB$ [III, 37];[1] quod absurdum est; supposuimus enim, esse $A\Delta : \Delta B = A\Gamma : \Gamma B$.

## XVI.

Iisdem positis $\Delta$ punctum positum sit in angulo, qui angulo ab asymptotis comprehenso deinceps positus est, et reliqua eadem fiant.

dico, rectam a $Z$ ad $\Gamma$ ductam productam cum sectione opposita concurrere, et rectam a puncto concursus ad $\Delta$ ductam sectionem oppositam contingere.

sint enim eadem, et punctum $\Delta$ positum sit in angulo, qui angulo ab asymptotis comprehenso deinceps positus est, ducaturque a $\Delta$ sectionem $A$ contingens $\Delta E$, et ducatur $EZ$ et producta, si fieri potest, ad $\Gamma$ ne ueniat, sed ad $H$. erit igitur [III, 39]

$$AH : HB = A\Delta : \Delta B;$$

quod absurdum est; supposuimus enim, esse

$$A\Delta : \Delta B = A\Gamma : \Gamma B.$$


## XVII.

Iisdem positis punctum $\Delta$ in alterutra asymptotarum sit positum.

dico, rectam a $Z$ ad $\Gamma$ ductam parallelam esse asymptotae, in qua punctum positum sit.

1) Quae tum quoque ualet, cum utrumque punctum contactus in eadem opposita est positum, quamquam hic casus in figuris codicis non respicitur, ne in iis quidem, quas I p. 403 not. significaui.

λέγω, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ $Z$ ἐπὶ τὸ $Γ$ ἀγομένη παράλληλος ἔσται τῇ ἀσυμπτώτῳ, ἐφ' ἧς ἐστι τὸ σημεῖον.




ἔστωσαν τὰ αὐτὰ τοῖς ἔμπροσθεν, τὸ δὲ $Δ$ σημεῖον ἐπὶ μιᾶς τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ ἤχθω διὰ τοῦ $Z$ παράλληλος, καὶ εἰ δυνατόν, μὴ πιπτέτω ἐπὶ τὸ $Γ$, ἀλλ' ἐπὶ τὸ $H$. ἔσται δή, ὡς ἡ $AΔ$ πρὸς $ΔB$, ἡ $AH$ πρὸς $HB$· ὅπερ ἄτοπον. ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ $Z$ παρὰ τὴν ἀσύμπτωτον ἐπὶ τὸ $Γ$ πίπτει.

ιη'.

Ἐὰν ἐν ἀντικειμέναις ληφθῇ τι σημεῖον μεταξὺ τῶν δύο τομῶν, καὶ ἀπ' αὐτοῦ δύο εὐθεῖαι διαχθῶσι τέμνουσαι ἑκατέραν τῶν τομῶν, καὶ ὡς ἔχουσιν αἱ μεταξὺ τῆς μιᾶς τομῆς πρὸς τὰς μεταξὺ τῆς ἑτέρας τομῆς καὶ τοῦ αὐτοῦ σημείου, οὕτως ἔχωσιν αἱ μείζους τῶν ἀπολαμβανομένων μεταξὺ τῶν ἀντικειμένων πρὸς τὰς ὑπεροχὰς αὐτῶν, ἡ διὰ τῶν περάτων ἀγομένη εὐθεῖα τῶν μειζόνων εὐθειῶν ταῖς τομαῖς συμπεσεῖται, καὶ αἱ ἀπὸ τῶν συμπτώσεων ἐπὶ τὸ ληφθὲν σημεῖον ἀγόμεναι εὐθεῖαι ἐφάψονται τῶν γραμμῶν.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ $A$, $B$, καὶ τὸ $Δ$ σημεῖον μεταξὺ τῶν τομῶν. πρότερον ὑποκείσθω ἐν τῇ ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένῃ γωνίᾳ, καὶ διὰ τοῦ $Δ$ διήχθωσαν αἱ $AΔB$, $ΓΔΘ$. μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν $AΔ$ τῆς $ΔB$, ἡ δὲ $ΓΔ$ τῆς $ΔΘ$, διότι ἴση ἐστὶν ἡ $BN$


---

23. αἱ] om. Vp; corr. Halley.

sint eadem, quae antea, punctum $\Delta$ autem in alterutra asymptotarum sit, ducaturque per $Z$ illi parallela recta, et si fieri potest, in $\Gamma$ ne cadat, sed in $H$. erit igitur [III, 36] $A\Delta : \Delta B = AH : HB$; quod absurdum est. ergo recta a $Z$ asymptotae parallela ducta in $\Gamma$ cadit.

## XVIII.

Si in sectionibus oppositis punctum aliquod inter duas sectiones sumitur, ab eoque duae rectae utramque sectionem secantes producuntur, et quam rationem habent rectae inter punctum alteramque sectio-





nem positae ad rectas inter alteram sectionem idemque punctum positas, eam habent rectae maiores iis, quae inter sectiones oppositas abscinduntur, ad excessus earum, recta per terminos rectarum maiorum ducta cum sectionibus concurret, et rectae a punctis concursus ad sumptum punctum ductae lineas contingent.

sint oppositae $A$, $B$, et punctum $\Delta$ inter sectiones positum. prius in angulo ab asymptotis comprehenso supponatur, et per $\Delta$ producantur $A\Delta B$, $\Gamma\Delta\Theta$. ita-

κ'.

Ἐὰν δὲ τὸ ληφθὲν σημεῖον ἐπί τινος ᾖ τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ τὰ λοιπὰ γένηται τὰ αὐτά, ἡ διὰ τῶν περάτων τῶν ὑπεροχῶν ἀγομένη εὐθεῖα παράλληλος ἔσται τῇ ἀσυμπτώτῳ, ἐφ' ἧς ἐστι τὸ σημεῖον, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ σημείου ἐπὶ τὴν σύμπτωσιν τῆς τομῆς καὶ τῆς διὰ τῶν περάτων ἠγμένης εὐθείας ἐφάψεται τῆς τομῆς.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ Α, Β, καὶ τὸ Δ σημεῖον ἔστω ἐπὶ μιᾶς τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ αὐτὰ γινέσθω. λέγω, ὅτι ἡ διὰ τῶν Κ, Η συμπεσεῖται τῇ τομῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἐπὶ τὸ Δ ἐφάψεται τῆς τομῆς.




ἤχθω ἀπὸ τοῦ Δ ἐφαπτομένη ἡ ΔΖ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ζ παρὰ τὴν ἀσύμπτωτον, ἐφ' ἧς ἐστι τὸ Δ, ἤχθω εὐθεῖα. ἥξει δὴ διὰ τῶν Κ, Η. εἰ γὰρ μή, ἢ διὰ τοῦ ἑτέρου αὐτῶν ἥξει ἢ δι' οὐδετέρου, καὶ τὰ αὐτὰ ἄτοπα συμβήσεται τοῖς πρότερον.

κα'.

Ἔστωσαν πάλιν ἀντικείμεναι αἱ Α, Β, καὶ τὸ Δ σημεῖον ἐπὶ μιᾶς τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ ἡ μὲν ΔΒΚ τῇ τομῇ καθ' ἓν μόνον σημεῖον συμβαλλέτω τὸ Β παράλληλος οὖσα τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀσυμπτώτων, ἡ δὲ ΓΔΘ ἑκατέρᾳ τῶν τομῶν συμβαλλέτω, καὶ ἔστω, ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΘ, ἡ ΓΗ πρὸς ΗΘ, τῇ δὲ ΔΒ ἴση ἔστω ἡ ΒΚ.

26. συμβαλλέτω] p, συμβαλ...

que $A\Delta > \Delta B$, $\Gamma\Delta > \Delta\Theta$, quia $BN = AM$. sit autem


$$A\Delta : \Delta B = AK : KB,\quad \Gamma\Delta : \Delta\Theta = \Gamma H : H\Theta.$$

dico, rectam per $K$, $H$ ductam cum sectione concurrere, rectasque a $\Delta$ ad puncta concursus ductas sectionem contingere.

quoniam enim $\Delta$ intra angulum ab asymptotis comprehensum positum est, fieri potest, ut a $\Delta$ duae rectae contingentes ducantur [II, 49]. ducantur $\Delta E$, $\Delta Z$, et ducatur $EZ$; ea igitur per puncta $K$, $H$ ueniet.[1]) nam si per unum solum eorum ueniet, altera rectarum in alio puncto secundum eandem rationem secabitur [III, 37];[2]) quod fieri non potest. sin per neutrum ueniet, in utraque absurdum eueniet.

## XIX.

Iam punctum $\Delta$ in angulo sumatur, qui angulo ab asymptotis comprehenso deinceps est positus, rectae-




que sectiones secantes producantur et, ut dictum est, diuidantur.

dico, rectam per $K$, $H$ productam cum utraque


1) Quae sequuntur lin. 10—11, et inutilia sunt et propter γάρ lin. 11 non ferenda.

2) Cf. supra p. 27 not.

κ'.

Ἐὰν δὲ τὸ ληφθὲν σημεῖον ἐπί τινος ᾖ τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ τὰ λοιπὰ γένηται τὰ αὐτά, ἡ διὰ τῶν περάτων τῶν ὑπεροχῶν ἀγομένη εὐθεῖα παράλληλος ἔσται τῇ ἀσυμπτώτῳ, ἐφ' ἧς ἐστι τὸ σημεῖον, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ σημείου ἐπὶ τὴν σύμπτωσιν τῆς τομῆς καὶ τῆς διὰ τῶν περάτων ἠγμένης εὐθείας ἐφάψεται τῆς τομῆς.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ *Α*, *Β*, καὶ τὸ *Δ* σημεῖον ἔστω ἐπὶ μιᾶς τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ αὐτὰ γινέσθω. λέγω, ὅτι ἡ διὰ τῶν *Κ*, *Η* συμπεσεῖται τῇ τομῇ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἐπὶ τὸ *Δ* ἐφάψεται τῆς τομῆς.




ἤχθω ἀπὸ τοῦ *Δ* ἐφαπτομένη ἡ *ΔΖ*, καὶ ἀπὸ τοῦ *Ζ* παρὰ τὴν ἀσύμπτωτον, ἐφ' ἧς ἐστι τὸ *Δ*, ἤχθω εὐθεῖα. ἥξει δὴ διὰ τῶν *Κ*, *Η*. εἰ γὰρ μή, ἢ διὰ τοῦ ἑτέρου αὐτῶν ἥξει ἢ δι' οὐδετέρου, καὶ τὰ αὐτὰ ἄτοπα συμβήσεται τοῖς πρότερον.

κα'.

Ἔστωσαν πάλιν ἀντικείμεναι αἱ *Α*, *Β*, καὶ τὸ *Δ* σημεῖον ἐπὶ μιᾶς τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ ἡ μὲν *ΔΒΚ* τῇ τομῇ καθ' ἓν μόνον σημεῖον συμβαλλέτω τὸ *Β* παράλληλος οὖσα τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀσυμπτώτων, ἡ δὲ *ΓΔΘ* ἑκατέρᾳ τῶν τομῶν συμβαλλέτω, καὶ ἔστω, ὡς ἡ *ΓΔ* πρὸς *ΔΘ*, ἡ *ΓΗ* πρὸς *ΗΘ*, τῇ δὲ *ΔΒ* ἴση ἔστω ἡ *ΒΚ*.

26. συμβαλλέτω] p, συμβαλέτω Vv.

opposita concurrere, rectasque a punctis concursus ad $\Delta$ ductas sectiones contingere.

ducantur enim a $\Delta$ utramque sectionem contingentes $\Delta E$, $\Delta Z$; itaque recta per $E$, $Z$ ducta per $K$, $H$ ueniet. nam si minus, aut per alterum eorum ueniet aut per neutrum, rursusque eodem modo absurdum concludemus [III, 39].

## XX.

Sin punctum sumptum in alterutra asymptotarum positum est, et reliqua eadem fiunt, recta per terminos excessuum ducta parallela erit asymptotae, in qua punctum positum est, et recta a puncto ducta ad concursum sectionis rectaeque per terminos ductae sectionem continget.


sint oppositae $A$, $B$, et punctum $\Delta$ in alterutra asymptotarum sit, reliquaque eadem fiant. dico, rectam per $K$, $H$ ductam cum sectione concurrere, rectamque a puncto concursus ad $\Delta$ ductam sectionem contingere.

a $\Delta$ contingens ducatur $\Delta Z$, et a $Z$ recta ducatur asymptotae parallela, in qua est $\Delta$; ea igitur per $K$, $H$ ueniet. nam si minus, aut per alterum eorum ueniet aut per neutrum, et eadem euenient absurda, quae antea [III, 36].

## XXI.

Rursus sectiones oppositae sint $A$, $B$, et $\Delta$ punctum in alterutra asymptotarum sit, et $\Delta BK$ alteri asymptotae parallela cum sectione in uno puncto solo $B$ concurrat, $\Gamma\Delta\Theta$ autem cum utraque sectione concurrat, sitque $\Gamma\Delta : \Delta\Theta = \Gamma H : H\Theta$ et $BK = \Delta B$.

λέγω, ὅτι ἡ διὰ τῶν $K, H$ σημείων συμπεσεῖται τῇ τομῇ καὶ παράλληλος ἔσται τῇ ἀσυμπτώτῳ, ἐφ' ἧς ἐστι τὸ $\Delta$ σημεῖον, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς συμπτώσεως ἐπὶ τὸ $\Delta$ ἀγομένη ἐφάψεται τῆς τομῆς.




ἤχθω γὰρ ἐφαπτομένη ἡ $\Delta Z$, καὶ ἀπὸ τοῦ $Z$ παρὰ τὴν ἀσύμπτωτον, ἐφ' ἧς ἐστι τὸ $\Delta$, ἤχθω εὐθεῖα· ἥξει δὴ διὰ τῶν $K, H$. εἰ γὰρ μή, τὰ πρότερον εἰρημένα ἄτοπα συμβήσεται.

κβ'.

Ἔστωσαν δὴ ὁμοίως αἱ ἀντικείμεναι καὶ αἱ ἀσύμπτωτοι, καὶ τὸ $\Delta$ σημεῖον ὁμοίως εἰλήφθω, καὶ ἡ μὲν $\Gamma\Delta\Theta$ τέμνουσα τὰς τομάς, ἡ δὲ $\Delta B$ παράλληλος τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ ἔστω, ὡς ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς $\Delta\Theta$, ἡ $\Gamma H$ πρὸς $H\Theta$, τῇ δὲ $\Delta B$ ἴση ἡ $BK$.

λέγω, ὅτι ἡ διὰ τῶν $K, H$ συμπεσεῖται ἑκατέρᾳ τῶν ἀντικειμένων, καὶ αἱ ἀπὸ τῶν συμπτώσεων ἐπὶ τὸ $\Delta$ ἐφάψονται τῶν ἀντικειμένων.

ἤχθωσαν ἐφαπτόμεναι αἱ $\Delta E, \Delta Z$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $EZ$ καί, εἰ δυνατόν, μὴ ἐρχέσθω διὰ τῶν $K, H$, ἀλλ' ἤτοι διὰ τοῦ ἑτέρου ἢ δι' οὐδετέρου [ἥξει]. εἰ μὲν διὰ τοῦ $H$ μόνου, οὐκ ἔσται ἡ $\Delta B$ τῇ $BK$ ἴση, ἀλλ' ἑτέρᾳ· ὅπερ ἄτοπον. εἰ δὲ διὰ μόνου τοῦ $K$,


1. $K, H$] cv, euan. V; $H, K$ p. 7. ἐφαπτομένη] p, ἐφαπτόμεναι V. 20. $K, H$] $H, K$ V, $K, B$ p; corr. Comm 21. αἱ] p, om. V. 25. ἤτοι] p, ἤτοι ἢ V. ἥξει] deleo.

dico, rectam per puncta *K*, *H* ductam cum sectione concurrere parallelamque esse asymptotae, in qua sit punctum $\Delta$, rectamque a puncto concursus ad $\Delta$ ductam sectionem contingere.

ducatur enim contingens $\Delta Z$, et a $Z$ recta ducatur parallela asymptotae, in qua est punctum $\Delta$; ea igitur per *K*, *H* ueniet. nam si minus, absurda, quae antea diximus, euenient [III, 36].

## XXII.

Iam eodem modo sint propositae sectiones oppositae asymptotaeque, et punctum $\Delta$ eodem modo[1]) sumatur, et $\Gamma\Delta\Theta$ sectiones secans, $\Delta B$ autem alteri asymptotae parallela, sitque $\Gamma\Delta : \Delta\Theta = \Gamma H : H\Theta$, et $BK = \Delta B$.




dico, rectam per *K*, *H* ductam cum utraque opposita concurrere, et rectas a punctis concursus ad $\Delta$ ductas oppositas contingere.

ducantur contingentes $\Delta E$, $\Delta Z$, ducaturque $EZ$ et, si fieri potest, per *K*, *H* ne cadat, sed aut per al-

1) Hic aliquid turbatum est; nam punctum $\Delta$ in angulo deinceps posito positum esse necesse est, et ita in figura codicis V est. quare Memus ceterique hoc in uerbis Apollonii addiderunt (τὸ $\Delta$ σημεῖον ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης, ὁμοίως Halley).


οὐκ ἔσται, ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΘ, ἡ ΓΗ πρὸς ΗΘ, ἀλλ' ἄλλη τις πρὸς ἄλλην. εἰ δὲ δι' οὐδετέρου τῶν Κ, Η, ἀμφότερα τὰ ἀδύνατα συμβήσεται.

κγ'.

Ἔστωσαν πάλιν ἀντικείμεναι αἱ Α, Β, καὶ τὸ Δ σημεῖον ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης, καὶ ἡ μὲν ΒΔ ἤχθω τὴν Β τομὴν καθ' ἓν μόνον τέμνουσα, τῇ δὲ ἑτέρᾳ τῶν ἀσυμπτώτων παράλληλος, ἡ δὲ ΔΑ τὴν Α τομὴν ὁμοίως, καὶ ἔστω ἴση ἡ μὲν ΔΒ τῇ ΒΗ, ἡ δὲ ΔΑ τῇ ΑΚ.

λέγω, ὅτι ἡ διὰ τῶν Κ, Η συμβάλλει ταῖς τομαῖς, καὶ αἱ ἀπὸ τῶν συμπτώσεων ἐπὶ τὸ Δ ἀγόμεναι ἐφάψονται τῶν τομῶν.

ἤχθωσαν ἐφαπτόμεναι αἱ ΔΕ, ΔΖ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΕΖ, εἰ δυνατόν, μὴ ἐρχέσθω διὰ τῶν Κ, Η. ἤτοι




δὴ διὰ τοῦ ἑτέρου αὐτῶν ἐλεύσεται ἢ δι' οὐδετέρου, καὶ ἤτοι ἡ ΔΑ οὐκ ἔσται ἴση τῇ ΑΚ, ἀλλὰ ἄλλῃ τινί·

1. ΗΘ] ΘΚ V; corr. Memus. 2. οὐδετέρας Vp; corr. Halley. 5. Α] Δ Vp; corr. Memus. 12. συμπτώσεων] cp; συμπτώτων V.

terum aut per neutrum. iam si per $H$ solum cadit, non erit $\varDelta B$ rectae $BK$ aequalis, sed alii cuidam [III, 31]; quod absurdum est. sin per $K$ solum, non erit $\Gamma\varDelta : \varDelta\Theta = \Gamma H : H\Theta$, sed alia quaedam ad aliam [III, 39]. sin per neutrum punctorum $K$, $H$ cadit, utrumque absurdum eueniet.

## XXIII.

Rursus sint oppositae $A$, $B$, et punctum $\varDelta$ positum sit in angulo, qui angulo ab asymptotis comprehenso deinceps est positus, ducaturque $B\varDelta$ sectionem $B$ in uno puncto solo secans, alteri autem asymptotarum parallela, et $\varDelta A$ eodem modo sectionem $A$ secet, sitque $\varDelta B = BH$, $\varDelta A = AK$.

dico, rectam per puncta $K$, $H$ ductam cum sectionibus concurrere, et rectas a punctis concursus ad $\varDelta$ ductas sectiones contingere.

ducantur contingentes $\varDelta E$, $\varDelta Z$, et ducta $EZ$, si fieri potest, per $K$, $H$ ne cadat. aut igitur per alterum eorum cadet aut per neutrum, et aut $\varDelta A$ rectae $AK$ aequalis non erit, sed alii cuidam [III, 31]; quod absurdum est; aut non erit $\varDelta B = BH$, aut neutra neutri, et rursus in utraque idem absurdum eueniet. ergo $EZ$ per $K$, $H$ ueniet.

## XXIV.

Coni sectio cum coni sectione uel arcu circuli ita non concurrit, ut pars eadem sit, pars non communis.

ὅπερ ἄτοπον· ἢ ἡ $ΔB$ τῇ $BH$ οὐκ ἴση, ἢ οὐδετέρα οὐδετέρᾳ, καὶ πάλιν ἐπ' ἀμφοτέρων τὸ αὐτὸ ἄτοπον συμβήσεται. ἥξει ἄρα ἡ $EZ$ διὰ τῶν $K, H$.

κδ'.

Κώνου τομὴ κώνου τομῇ ἢ κύκλου περιφερείᾳ οὐ συμβάλλει οὕτως, ὥστε μέρος μέν τι εἶναι ταὐτόν, μέρος δὲ μὴ εἶναι κοινόν.

εἰ γὰρ δυνατόν, κώνου τομὴ ἡ $ΔABΓ$ κύκλου περιφερείᾳ τῇ $EABΓ$ συμβαλλέτω, καὶ ἔστω αὐτῶν κοινὸν μέρος τὸ αὐτὸ τὸ $ABΓ$, μὴ κοινὸν δὲ τὸ $AΔ$ καὶ τὸ $AE$, καὶ εἰλήφθω ἐπ' αὐτῶν σημεῖον τὸ $Θ$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $ΘA$, καὶ διὰ τυχόντος σημείου τοῦ $E$ τῇ $AΘ$ παράλληλος ἤχθω ἡ $ΔEΓ$, καὶ τετμήσθω ἡ $AΘ$ δίχα κατὰ τὸ $H$, καὶ διὰ τοῦ $H$ διάμετρος ἤχθω ἡ $BHZ$. ἡ ἄρα διὰ τοῦ $B$ παρὰ τὴν $AΘ$ ἐφάψεται ἑκατέρας τῶν τομῶν καὶ παράλληλος ἔσται τῇ $ΔEΓ$, καὶ ἔσται ἐν μὲν τῇ ἑτέρᾳ τομῇ ἡ $ΔZ$ τῇ $ZΓ$ ἴση, ἐν δὲ τῇ ἑτέρᾳ ἡ $EZ$ τῇ $ZΓ$ ἴση. ὥστε καὶ ἡ $ΔZ$ τῇ $ZE$ ἐστιν ἴση· ὅπερ ἀδύνατον.


κε'.

Κώνου τομὴ κώνου τομὴν ἢ κύκλου περιφέρειαν οὐ τέμνει κατὰ πλείονα σημεῖα τεσσάρων.

εἰ γὰρ δυνατόν, τεμνέτω κατὰ πέντε τὰ $A, B, Γ, Δ, E$, καὶ ἔστωσαν αἱ $A, B, Γ, Δ, E$ συμπτώσεις ἐφεξῆς μηδεμίαν παραλείπουσαι μεταξὺ αὐτῶν, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $AB$, $ΓΔ$ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν· συμπεσοῦνται δὴ αὗται ἐκτὸς τῶν τομῶν ἐπὶ τῆς παραβολῆς καὶ ὑπερβολῆς. συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ $Λ$, καὶ ὃν μὲν ἔχει

2. οὐδετέρᾳ] om. Vp; corr. Halley cum Comm. 8. γάρ] vpc, ins. m. 1 V. 23. τά] p, αἵ V. 25. αὐτῶν] scripsi, αὐτῶν Vpc.

nam si fieri potest, coni sectio $\Delta AB\Gamma$ cum arcu circuli $EAB\Gamma$ concurrat, eorumque communis sit pars eadem $AB\Gamma$, non communes autem $A\Delta$, $AE$, et in iis sumatur punctum $\Theta$, ducaturque $\Theta A$, per punctum autem quodlibet $E$ rectae $A\Theta$ parallela ducatur $\Delta E\Gamma$, et $A\Theta$ in $H$ in duas partes aequales secetur, per $H$ autem diametrus ducatur $BHZ$. itaque recta per $B$ rectae $A\Theta$ parallela ducta utramque sectionem continget [I, 32], et rectae $\Delta E\Gamma$ parallela erit [Eucl. I, 30], eritque in altera sectione $\Delta Z = Z\Gamma$, in altera $EZ = Z\Gamma$ [I, 46—47]. quare etiam $\Delta Z = ZE$; quod fieri non potest.




## XXV.

Coni sectio coni sectionem uel arcum circuli non secat in pluribus punctis quam quattuor.

nam si fieri potest, in quinque secet $A, B, \Gamma, \Delta, E$, et puncta concursus $A, B, \Gamma, \Delta, E$ deinceps sint posita nullum inter se praetermittentia, et ducantur $AB$, $\Gamma\Delta$ producanturque; eae igitur in parabola et hyperbola extra sectiones concurrent [II, 24—25]. concurrant in $\Lambda$, sitque $\Lambda A : \Lambda B = AO : OB$ et

$$\Delta\Lambda : \Lambda\Gamma = \Delta\Pi : \Pi\Gamma.$$

itaque recta a $\Pi$ ad $O$ ducta in utramque partem producta cum sectione concurret, et rectae a punctis concursus ad $\Lambda$ ductae sectiones contingent [prop. IX].


λόγον ἡ ΑΛ πρὸς ΛΒ, ἐχέτω ἡ ΛΟ πρὸς ΟΒ, ὃν δὲ ἔχει λόγον ἡ ΔΛ πρὸς ΛΓ, ἐχέτω ἡ ΔΠ πρὸς ΠΓ. η ἄρα ἀπὸ τοῦ Π ἐπὶ τὸ Ο ἐπιζευγνυμένη ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα συμπεσεῖται τῇ τομῇ, καὶ αἱ ἀπὸ τῶν συμπτώσεων ἐπὶ τὸ Λ ἐπιζευγνύμεναι ἐφάψονται τῶν τομῶν. συμπιπτέτω δὴ κατὰ τὰ Θ, Ρ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΘΛ, ΛΡ· ἐφάψονται δὴ αὗται. ἡ ἄρα ΕΛ τέμνει ἑκατέραν τομήν, ἐπείπερ μεταξὺ τῶν Β, Γ σύμπτωσις οὐκ ἔστι. τεμνέτω κατὰ τὰ Μ, Η· ἔσται ἄρα διὰ μὲν τὴν ἑτέραν τομήν, ὡς ἡ ΕΛ πρὸς ΛΗ, ἡ ΕΝ πρὸς ΝΗ, διὰ δὲ τὴν ἑτέραν, ὡς ἡ ΕΛ πρὸς ΛΜ, ἡ ΕΝ πρὸς ΝΜ. τοῦτο δὲ ἀδύνατον· ὥστε καὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς.

ἐὰν δὲ αἱ ΑΒ, ΔΓ παράλληλοι ὦσιν, ἔσονται μὲν αἱ τομαὶ ἐλλείψεις ἢ κύκλου περιφέρεια. τετμήσθωσαν αἱ ΑΒ, ΓΔ δίχα κατὰ τὰ Ο, Π, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΠΟ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐφ' ἑκάτερα· συμπεσεῖται δὴ ταῖς τομαῖς. συμπιπτέτω δὴ κατὰ τὰ Θ, Ρ. ἔσται δὴ διάμετρος τῶν τομῶν ἡ ΘΡ, τεταγμένως δὲ ἐπ' αὐτὴν κατηγμέναι αἱ ΑΒ, ΓΔ. ἤχθω δὴ ἀπὸ τοῦ Ε παρὰ τὰς ΑΒ, ΓΔ ἡ ΕΝΜΗ· τεμεῖ ἄρα ἡ ΕΜΗ τὴν ΘΡ καὶ ἑκατέραν τῶν γραμμῶν, διότι ἑτέρα σύμπτωσις οὐκ ἔστι παρὰ τὰς Α, Β, Γ, Δ. ἔσται δὴ διὰ ταῦτα ἐν μὲν τῇ ἑτέρᾳ τομῇ ἡ ΝΜ ἴση τῇ ΕΝ, ἐν δὲ τῇ ἑτέρᾳ ἡ ΝΕ τῇ ΝΗ ἴση· ὥστε καὶ ἡ ΝΜ τῇ ΝΗ ἐστιν ἴση· ὅπερ ἀδύνατον.

---

2. ΔΛ] p, ΔΓ V. 15. περιφέρεια] pv, περιφερείαι V. 16. ΓΔ] cpv, Γ euan. V. 23. Δ] Δ, Ε p.

concurrat igitur in $\Theta$, $P$, ducanturque $\Theta\Lambda$, $\Lambda P$; eae igitur contingent. itaque $E\Lambda$ utramque sectionem se-





cat, quoniam inter $B$, $\Gamma$ nullum est punctum concursus. secet in $M$, $H$. itaque propter alteram sectionem erit

$$E\Lambda : \Lambda H = EN : NH,$$

propter alteram autem $E\Lambda : \Lambda M = EN : NM$ [III, 37]. hoc autem fieri non potest; ergo ne illud quidem, quod ab initio posuimus.

sin $AB$, $\Delta\Gamma$ parallelae sunt, sectiones erunt ellipses uel altera arcus circuli. secentur $AB$, $\Gamma\Delta$ in $O$, $\Pi$





in binas partes aequales, ducaturque $\Pi O$ et in utramque partem producatur; cum sectionibus igitur concurret. concurrat igitur in $\Theta$, $P$. itaque $\Theta P$ diametrus erit sectionum [II, 28], et ad eam ordinate ductae $AB$, $\Gamma\Delta$. ducatur igitur ab $E$ rectis $AB$, $\Gamma\Delta$ parallela $ENMH$. $EMH$ igitur rectam $\Theta P$ et utramque lineam secat, quoniam nullum aliud est punctum concursus praeter $A$, $B$, $\Gamma$, $\Delta$. prop-

## κϛ'.

*Ἐὰν τῶν εἰρημένων γραμμῶν τινες καθ' ἓν ἐφάπτωνται σημεῖον ἀλλήλων, οὐ συμβάλλουσιν ἑαυταῖς καθ' ἕτερα σημεῖα πλείονα ἢ δύο.*

*ἐφαπτέσθωσαν γὰρ ἀλλήλων τινὲς δύο τῶν εἰρημένων γραμμῶν κατὰ τὸ Α σημεῖον. λέγω, ὅτι οὐ συμβάλλουσι κατ' ἄλλα σημεῖα πλείονα ἢ δύο.*

*εἰ γὰρ δυνατόν, συμβαλλέτωσαν κατὰ τὰ Β, Γ, Δ, καὶ ἔστωσαν αἱ συμπτώσεις ἐφεξῆς ἀλλήλαις μηδεμίαν μεταξὺ παραλείπουσαι, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΓ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἀπὸ τοῦ Α ἐφαπτομένη ἤχθω ἡ ΑΛ· ἐφάψεται δὴ τῶν δύο τομῶν καὶ συμπεσεῖται τῇ ΓΒ. συμπιπτέτω κατὰ τὸ Λ, καὶ γινέσθω, ὡς ἡ ΓΛ πρὸς ΛΒ, ἡ ΓΠ πρὸς ΠΒ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΠ καὶ ἐκβεβλήσθω· συμπεσεῖται δὴ ταῖς τομαῖς, καὶ αἱ ἀπὸ τῶν συμπτώσεων ἐπὶ τὸ Λ ἐφάψονται τῶν τομῶν. ἐκβεβλήσθω καὶ συμπιπτέτω κατὰ τὰ Θ, Ρ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΘΛ, ΛΡ· ἐφάψονται δὴ αὗται τῶν τομῶν. ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Λ ἐπιζευγνυμένη τέμνει ἑκατέραν τῶν τομῶν, καὶ συμβήσεται τὰ πρότερον εἰρημένα ἄτοπα. οὐκ ἄρα τέμνουσιν ἀλλήλας κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο.*




7. ἢ] p, om. V. 14. δύο] β̄ V.

terea erit [I def. 4] in altera sectione $NM = EN$, in altera $NE = NH$; quare etiam $NM = NH$; quod fieri non potest.

## XXVI.

Si quae linearum, quas diximus, inter se in uno puncto contingunt, non concurrunt inter se in aliis punctis pluribus quam duobus.

nam duae aliquae linearum, quas diximus, inter se contingant in puncto $A$. dico, eas non concurrere in aliis punctis pluribus quam duobus.

nam si fieri potest, concurrant in $B$, $\Gamma$, $\Delta$, et puncta concursus deinceps sint posita nullum inter se praetermittentia, ducaturque $B\Gamma$ et producatur, ab $A$ autem contingens ducatur $A\Lambda$; ea igitur duas sectiones continget et cum $\Gamma B$ concurret. concurrat in $\Lambda$, et fiat $\Gamma\Lambda : \Lambda B = \Gamma\Pi : \Pi B$, ducaturque $A\Pi$ et producatur; concurret igitur cum sectionibus, et rectae a punctis concursus ad $\Lambda$ ductae sectiones contingent [prop. I]. producatur et in $\Theta$, $P$ concurrat, ducanturque $\Theta\Lambda$, $\Lambda P$; eae igitur sectiones contingent. itaque recta a $\Delta$ ad $\Lambda$ ducta utramque sectionem secat, et eadem, quae antea [prop. XXV] diximus, absurda euenient [III, 37]. ergo non secant inter se in pluribus punctis quam duobus.

sin in ellipsi uel arcu circuli $\Gamma B$ et $A\Lambda$ parallelae sunt, eodem modo, quo in praecedenti, demonstrationem conficiemus, cum demonstrauerimus, $A\Theta$ diametrum esse.

ἐὰν δὲ ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως ἢ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας ἡ ΓΒ παράλληλος ᾖ τῇ ΑΔ, ὁμοίως τῷ προειρημένῳ ποιησόμεθα τὴν ἀπόδειξιν διάμετρον δείξαντες τὴν ΑΘ.

κζ'.

Ἐὰν τῶν προειρημένων γραμμῶν τινες κατὰ δύο σημεῖα ἐφάπτωνται ἀλλήλων, οὐ συμβάλλουσιν ἀλλήλαις καθ' ἕτερον.

δύο γὰρ τῶν εἰρημένων γραμμῶν ἐφαπτέσθωσαν ἀλλήλων κατὰ δύο σημεῖα τὰ Α, Β. λέγω, ὅτι ἀλλήλαις κατὰ ἄλλο σημεῖον οὐ συμβάλλουσιν.

εἰ γὰρ δυνατόν, συμβαλλέτωσαν καὶ κατὰ τὸ Γ, καὶ ἔστω πρότερον τὸ Γ ἐκτὸς τῶν Α, Β ἁφῶν, καὶ ἤχθωσαν ἀπο τῶν Α, Β ἐφαπτόμεναι· ἐφάψονται ἄρα ἀμφοτέρων τῶν γραμμῶν. ἐφαπτέσθωσαν καὶ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Δ, ὡς ἐπὶ τῆς πρώτης καταγραφῆς, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΔ· τεμεῖ δὴ ἑκατέραν τῶν τομῶν. τεμνέτω κατὰ τὰ Η, Μ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΝΒ. ἔσται ἄρα ἐν μὲν τῇ ἑτέρᾳ τομῇ, ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΗ, ἡ ΓΝ πρὸς ΝΗ, ἐν δὲ τῇ ἑτέρᾳ, ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΜ, ἡ ΓΝ πρὸς ΝΜ· ὅπερ ἄτοπον.

κη'.

Ἐὰν δὲ ἡ ΓΗ παράλληλος ᾖ ταῖς κατὰ τὰ Α, Β σημεῖα ἐφαπτομέναις, ὡς ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως ἐν τῇ δευτέρᾳ καταγραφῇ, ἐπιζεύξαντες τὴν ΑΒ ἐροῦμεν, ὅτι διάμετρος ἔσται τῶν τομῶν. ὥστε δίχα τμηθήσεται ἑκατέρα τῶν ΓΗ, ΓΜ κατὰ τὸ Ν· ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα καθ' ἕτερον σημεῖον συμβάλλουσιν αἱ γραμμαὶ ἀλλήλαις, ἀλλὰ κατὰ μόνα τὰ Α, Β.

---


7. ἀλλήλαις] p, ἀλλήλως V. 14. ἐφάψονται] p, ἐφάψεται V. 17. τεμεῖ] p, τεμεῖν V. 22. κη'] om. Vp. 23. τά] p, om. V 27. ΓΜ] cvp, Γ e corr. m. 1 V.

## XXVII.[1])

Si quae linearum, quas antea diximus, in duobus punctis inter se contingunt, in alio puncto inter se non concurrunt.


nam ex lineis, quas diximus, duae inter se in duobus punctis contingant $A$, $B$. dico, eas in alio puncto inter se non concurrere.

nam si fieri potest, etiam in $\Gamma$ concurrant, et $\Gamma$ prius extra puncta contactus $A$, $B$ positum sit, ducanturque ab $A$, $B$ contingentes; contingent igitur utramque lineam. contingant et concurrant in $\Delta$, ut in prima figura, ducaturque $\Gamma\Delta$; ea igitur utramque sectionem secabit. secet in $H$, $M$, et ducatur $\Delta NB$. itaque erit in altera sectione [III, 37] $\Gamma\Delta : \Delta H = \Gamma N : NH$, in altera autem $\Gamma\Delta : \Delta M = \Gamma N : NM$; quod absurdum est.




## XXVIII.

Sin $\Gamma H$ rectis in $A$, $B$ contingentibus parallela est, ut in ellipsi in secunda figura, ducta $AB$ concludemus, eam diametrum esse sectionum [II, 27]. quare utraque $\Gamma H$, $\Gamma M$ in $N$ in binas partes aequales secabitur [I def. 4]; quod absurdum est. ergo lineae in nullo alio puncto concurrent, sed in solis $A$, $B$.





1) Hanc propositionem in tres diuisi, ut numerus XLIII apud Eutocium suae responderet propositioni; nam ne pro-

κθ'.

Ἔστω δὴ τὸ Γ μεταξὺ τῶν ἁφῶν, ὡς ἐπὶ τῆς τρίτης καταγραφῆς.

φανερόν, ὅτι οὐκ ἐφάψονται αἱ γραμμαὶ ἀλλήλων κατὰ τὸ Γ· κατὰ δύο γὰρ μόνον ὑπόκεινται ἐφαπτόμεναι. τεμνέτωσαν οὖν κατὰ τὸ Γ, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν Α, Β ἐφαπτόμεναι αἱ ΑΔ, ΔΒ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΒ καὶ δίχα τετμήσθω κατὰ τὸ Ζ· ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Ζ διάμετρος ἔσται. διὰ μὲν οὖν τοῦ Γ οὐκ ἐλεύσεται. εἰ γὰρ ἥξει, ἡ διὰ τοῦ Γ παρὰ τὴν ΑΒ ἀγομένη ἐφάψεται ἀμφοτέρων τῶν τομῶν· τοῦτο δὲ ἀδύνατον. ἤχθω δὴ ἀπὸ τοῦ Γ παρὰ τὴν ΑΒ ἡ ΓΚΗΜ· ἔσται δὴ ἐν μὲν τῇ ἑτέρᾳ τομῇ ἡ ΓΚ τῇ ΚΗ ἴση, ἐν δὲ τῇ ἑτέρᾳ ἡ ΚΜ τῇ ΚΓ ἴση. ὥστε καὶ ἡ ΚΜ τῇ ΚΗ ἴση· ὅπερ ἀδύνατον.




ὁμοίως δὲ καί, ἐὰν παράλληλοι ὦσιν αἱ ἐφαπτόμεναι, κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἐπάνω τὸ ἀδύνατον δειχθήσεται.

λ'.

Παραβολὴ παραβολῆς οὐκ ἐφάψεται κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ ἕν.

εἰ γὰρ δυνατόν, ἐφαπτέσθωσαν αἱ ΑΗΒ, ΑΜΒ παραβολαὶ κατὰ τὰ Α, Β, καὶ ἤχθωσαν ἐφαπτόμεναι αἱ ΑΔ, ΔΒ· ἐφάψονται δὴ αὗται τῶν τομῶν ἀμφοτέρων καὶ συμπεσοῦνται κατὰ τὸ Δ.

1. κθ'] om. Vp. 2. ὡς] p, om. V.

XXIX.

Iam uero *Γ* inter puncta contactus positum sit, ut in tertia figura.

manifestum est, lineas in *Γ* inter se non contingere; nam suppositum est, eas in duobus solis contingere. secent igitur in *Γ*, ducanturque ab *A*, *B* contingentes *AΔ*, *ΔB*, et ducatur *AB* seceturque in *Z* in duas partes aequales; itaque recta ab *Δ* ad *Z* ducta diametrus erit [II, 29]. iam per *Γ* non ueniet; nam si ueniet, recta per *Γ* rectae *AB* parallela ducta utramque sectionem continget [II, 5—6]; hoc autem fieri non potest. ducatur igitur a *Γ* rectae *AB* parallela *ΓKHM*; erit igitur [I def. 4] in altera sectione $\Gamma K = KH$, in altera autem $KM = K\Gamma$. quare etiam $KM = KH$; quod fieri non potest.

similiter autem etiam, si rectae contingentes parallelae sunt, eodem modo, quo supra, demonstrabimus fieri non posse.

XXX.


Parabola parabolam non continget in pluribus punctis quam in uno.

nam si fieri potest, parabolae *AHB*, *AMB* in *A*, *B* contingant, ducanturque contingentes *AΔ*, *ΔB*; eae igitur utramque sectionem contingent et in *Δ* concurrent.

ducatur *AB* et in *Z* in duas partes aequales secetur, ducaturque *ΔZ*. quoniam igitur duae lineae *AHB*, *AMB* inter se contingunt in duobus punctis

positiones XXV et XXVI in binas diuidamus, obstat uocabulum προειρημένῳ prop. XXVI p. 44, 2.

ἐπεζεύχθω ἡ ΑΒ καὶ δίχα τετμήσθω κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἤχθω ἡ ΔΖ. ἐπεὶ οὖν δύο γραμμαὶ αἱ ΑΗΒ, ΑΜΒ ἐφάπτονται ἀλλήλων κατὰ δύο τὰ Α, Β, οὐ συμβάλλουσιν ἀλλήλαις καθ' ἕτερον· ὥστε ἡ ΔΖ ἑκατέραν τῶν τομῶν τέμνει. τεμνέτω κατὰ τὰ Η, Μ· ἔσται δὴ διὰ μὲν τὴν ἑτέραν τομὴν ἡ ΔΗ τῇ ΗΖ ἴση, διὰ δὲ τὴν ἑτέραν ἡ ΔΜ τῇ ΜΖ ἴση· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα παραβολὴ παραβολῆς ἐφάψεται κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ ἕν.




λα'.

Παραβολὴ ὑπερβολῆς οὐκ ἐφάψεται κατὰ δύο σημεῖα ἐκτὸς αὐτῆς πίπτουσα.

ἔστω παραβολὴ μὲν ἡ ΑΗΒ, ὑπερβολὴ δὲ ἡ ΑΜΒ, καὶ εἰ δυνατόν, ἐφαπτέσθωσαν κατὰ τὰ Α, Β, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν Α, Β ἐφαπτόμεναι ἑκατέρας τῶν Α, Β τομῶν συμπίπτουσαι ἀλλήλαις κατὰ τὸ Λ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΒ καὶ τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΛΖ.

ἐπεὶ οὖν αἱ ΑΗΒ, ΑΜΒ τομαὶ κατὰ τὰ Α, Β ἐφάπτονται, κατ' ἄλλο οὐ συμβάλλουσιν· ἡ ἄρα ΛΖ κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο τέμνει τὰς τομάς. τεμνέτω κατὰ τὰ Η, Μ, καὶ προσεκβεβλήσθω ἡ ΛΖ· πεσεῖται δὴ ἐπὶ τὸ κέντρον τῆς ὑπερβολῆς. ἔστω κέντρον τὸ Δ· ἔσται δη διὰ μὲν τὴν ὑπερβολήν, ὡς ἡ ΖΔ πρὸς ΔΜ, ἡ


8. τά] p, τό V. 11. οὐκ] cpv; euan. V, add. mg. m. rec. παραβολή] p, om. V.

uerum $Z\Delta > \Delta M$; quare etiam $ZM > M\Lambda$ [Eucl. V, 14]. sed propter parabolam est $ZH = H\Lambda$ [I, 35]; quod fieri non potest.

## XXXII.

Parabola ellipsim uel arcum circuli non continget in duobus punctis intra eam cadens.

sit enim $AHB$ ellipsis uel arcus circuli, parabola autem $AMB$, et, si fieri potest, in duobus punctis contingant $A$, $B$, ducanturque ab $A$, $B$ rectae sectiones contingentes et in $\Lambda$ concurrentes, et ducatur





$AB$ seceturque in $Z$ in duas partes aequales, et ducatur $\Lambda Z$; ea igitur utramque sectionem in alio atque alio puncto secabit, sicut diximus [prop. XXXI]. secet in $H$, $M$, et $\Lambda Z$ ad $\Delta$ producatur, $\Delta$ autem centrum sit ellipsis uel circuli [II, 29]. itaque propter ellipsim circulumue erit [I, 37] $\Lambda\Delta : \Delta H = \Delta H : \Delta Z$ [Eucl. VI, 17] $= \Lambda H : HZ$ [Eucl. V, 17; V, 16]. uerum $\Lambda\Delta > \Delta H$; quare etiam $\Lambda H > HZ$ [Eucl. V, 14]. sed propter parabolam est $\Lambda M = MZ$ [I, 35]; quod fieri non potest.

## XXXIII.

Hyperbola hyperbolam non continget in duobus punctis idem centrum habens.

*ἐπεζεύχθω δὴ καὶ ἡ ΑΒ· ἡ ἄρα ΔΖ τὴν ΑΒ δίχα τέμνει κατὰ τὸ Ζ. τεμεῖ δὴ ἡ ΔΖ τὰς τομὰς κατὰ τὰ Η, Μ. ἔσται δὴ διὰ μὲν τὴν ΑΗΒ ὑπερβολὴν*




*ἴσον το ὑπὸ ΖΔΛ τῷ ἀπο ΔΗ, διὰ δὲ την ΑΜΒ τὸ ὑπὸ ΖΔΛ ἴσον τῷ ἀπὸ ΔΜ. τὸ ἄρα ἀπὸ ΜΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΔΗ· ὅπερ ἀδύνατον.*

## λδʹ.

*Ἐὰν ἔλλειψις ἐλλείψεως ἢ κύκλου περιφερείας κατὰ δύο σημεῖα ἐφάπτηται τὸ αὐτὸ κέντρον ἔχουσα, ἡ τὰς ἁφὰς ἐπιζευγνύουσα διὰ τοῦ κέντρου πεσεῖται.*

*ἐφαπτέσθωσαν γὰρ ἀλλήλων αἱ εἰρημέναι γραμμαὶ κατὰ τὰ Α, Β σημεῖα, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΒ, καὶ διὰ τῶν Α, Β ἐφαπτόμεναι τῶν τομῶν ἤχθωσαν καί, εἰ δυνατόν, συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Λ, καὶ ἡ ΑΒ δίχα τετμήσθω κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΛΖ· διάμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΛΖ τῶν τομῶν.*

*ἔστω, εἰ δυνατόν, κέντρον τὸ Δ· ἔσται ἄρα τὸ ὑπὸ ΛΔΖ διὰ μὲν τὴν ἑτέραν τομὴν ἴσον τῷ ἀπὸ ΔΗ, διὰ δὲ τὴν ἑτέραν ἴσον τῷ ἀπὸ ΜΔ· ὥστε τὸ ἀπὸ ΗΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΔΜ· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα αἱ*

---

1. *δή*] *δέ*? p. 4. *τό*] cvp; *δὲ τό* V, sed *δέ* del. m. 1. 5. *ΖΔΛ*] cv, corr. ex *ΖΜΛ* m. 1 V. 18. *ΛΔΖ*] *ΔΛΖ* V; *ΔΛ*, *ΛΖ* p; corr. Halley.

hyperbolae enim $AHB$, $AMB$ idem centrum habentes $\Delta$, si fieri potest, in $A$, $B$ contingant, ducantur autem ab $A$, $B$ eas contingentes et inter se concurrentes $A\Lambda$, $\Lambda B$, et ducatur $\Delta\Lambda$ producaturque.

iam uero etiam $AB$ ducatur; $\Delta Z$ igitur rectam $AB$ in $Z$ in duas partes aequales secat [II, 30]. itaque $\Delta Z$ sectiones in $H$, $M$ secabit [prop. XXVII—XXIX]. erit igitur [I, 37] propter hyperbolam $AHB$ $Z\Delta \times \Delta\Lambda = \Delta H^2$, propter $AMB$ autem


$$Z\Delta \times \Delta\Lambda = \Delta M^2.$$

ergo $M\Delta^2 = \Delta H^2$; quod fieri non potest.

## XXXIV.

Si ellipsis ellipsim uel arcum circuli in duobus punctis contingit idem centrum habens, recta puncta contactus coniungens per centrum cadet.

nam lineae, quas diximus, inter se contingant in punctis $A$, $B$, ducaturque $AB$, per $A$, $B$ autem rectae sectiones contingentes ducantur et, si fieri potest, in $\Lambda$ concurrant, et $AB$ in $Z$ in duas partes aequales secetur, ducaturque $\Lambda Z$; $\Lambda Z$ igitur diametrus est sectionum [II, 29].




sit $\Delta$ centrum, si fieri potest; itaque [I, 37] propter alteram sectionem erit $\Lambda\Delta \times \Delta Z = \Delta H^2$, propter alteram autem $\Lambda\Delta \times \Delta Z = M\Delta^2$. itaque $H\Delta^2 = \Delta M^2$; quod fieri non potest. rectae igitur ab $A$, $B$ con-

ἀπὸ τῶν $A$, $B$ ἐφαπτόμεναι συμπεσοῦνται· παράλληλοι ἄρα εἰσίν, καὶ διὰ τοῦτο διάμετρός ἐστιν ἡ $AB$. ὥστε διὰ τοῦ κέντρου πίπτει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

λε'.

Κώνου τομὴ ἢ κύκλου περιφέρεια κώνου τομῇ ἢ κύκλου περιφερείᾳ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ κυρτὰ ἔχουσα οὐ συμπεσεῖται κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο.

εἰ γὰρ δυνατόν, κώνου τομὴ ἢ κύκλου περιφέρεια ἡ $AB\Gamma$ κώνου τομῇ ἢ κύκλου περιφερείᾳ τῇ $A\Delta BE\Gamma$ συμβαλλέτω κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ κυρτὰ ἔχουσα τὰ $A$, $B$, $\Gamma$.

καὶ ἐπεὶ ἐν τῇ $AB\Gamma$ γραμμῇ εἴληπται τρία σημεῖα τὰ $A$, $B$, $\Gamma$ καὶ ἐπεζευγμέναι αἱ $AB$, $B\Gamma$, γωνίαν ἄρα περιέχουσιν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῖς κοίλοις τῆς $AB\Gamma$ γραμμῆς. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ αἱ $AB\Gamma$ τὴν αὐτὴν γωνίαν περιέχουσιν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῖς κοίλοις τῆς $A\Delta BE\Gamma$ γραμμῆς. αἱ εἰρημέναι ἄρα γραμμαὶ ἐπὶ τὰ αὐτα μέρη ἔχουσι τὰ κοῖλα ἅμα καὶ τὰ κυρτά· ὅπερ ἀδύνατον.

λϛ'.

Ἐὰν κώνου τομὴ ἢ κύκλου περιφέρεια συμπίπτῃ μιᾷ τῶν ἀντικειμένων κατὰ δύο σημεῖα, καὶ αἱ μεταξὺ τῶν συμπτώσεων γραμμαὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ κοῖλα ἔχωσι, προσεκβαλλομένη ἡ γραμμὴ κατὰ τὰς συμπτώσεις οὐ συμπεσεῖται τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀντικειμένων.

---


12. καὶ ἐπεὶ — $AB\Gamma$] addidi praeeunte Commandino; om. V; τῇ Halley. εἰλήφθω Halley. 13. ἐπεζεύχθωσαν Halley. p habet inde a lin. 11: ἔχουσα τῇ $A\Delta BE\Gamma$ γραμμῇ καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $AB$, $B\Gamma$. καὶ ἐπεὶ γραμμῆς τῆς $AB\Gamma$ εἴληπται τρία σημεῖα τὰ $A$, $B$, $\Gamma$ καὶ ἐπεζευγμέναι εἰσὶ αἱ $AB$, $B\Gamma$, γωνιαν ἄρα κτλ. αἱ] p, om. V. 14. τοῖς] cvp, e corr.

tingentes non concurrent; quare parallelae sunt, et ideo *AB* diametrus est [II, 27]. ergo per centrum cadit; quod erat demonstrandum.

## XXXV.

Coni sectio uel arcus circuli cum coni sectione uel arcu circuli non concurret in pluribus punctis quam in duobus conuexa ad easdem partes non habens.

nam si fieri potest, coni sectio uel arcus circuli *ABΓ* cum coni sectione uel arcu circuli *AΔBEΓ* concurrat in pluribus punctis quam in duobus *A*, *B*, *Γ* conuexa ad easdem partes non habens.




et quoniam in linea *ABΓ* sumpta sunt tria puncta *A*, *B*, *Γ* et ductae *AB*, *BΓ*, hae ad easdem partes, ad quas sunt concaua lineae *ABΓ*, angulum comprehendunt. iam eadem de causa *AB*, *BΓ* eundem angulum comprehendunt ad easdem partes, ad quas sunt concaua lineae *AΔBEΓ*. itaque lineae, quas diximus, concaua ad easdem partes habent et ideo etiam conuexa; quod fieri non potest.


## XXXVI.

Si coni sectio uel arcus circuli cum altera oppositarum in duobus punctis concurrit, et lineae inter puncta concursus positae ad easdem partes concaua habent, linea per puncta concursus producta cum altera oppositarum non concurret.

---

m. 1 V. 15. *AB*, *BΓ* Halley cum Memo. 18. ἅμα] scripsi, ἀλλά V. 24. ἔχωσι] p, ἔχουσι V.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ Δ, ΑΕΓΖ, καὶ ἔστω κώνου τομὴ ἢ κύκλου περιφέρεια ἡ ΑΒΖ συμπίπτουσα τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀντικειμένων κατὰ δύο σημεῖα τὰ Α, Ζ, καὶ ἐχέτωσαν αἱ ΑΒΖ, ΑΓΖ τομαὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ κοῖλα. λέγω, ὅτι ἡ ΑΒΖ γραμμὴ ἐκβαλλομένη οὐ συμπεσεῖται τῇ Δ.




ἐπεζεύχθω γὰρ ἡ ΑΖ. καὶ ἐπεὶ ἀντικείμεναί εἰσιν αἱ Δ, ΑΓΖ, καὶ ἡ ΑΖ εὐθεῖα κατὰ δύο τέμνει τὴν ὑπερβολήν, οὐ συμπεσεῖται ἐκβαλλομένη τῇ Δ ἀντικειμένῃ. οὐδὲ ἄρα ἡ ΑΒΖ γραμμὴ συμπεσεῖται τῇ Δ.

## λζ'.

Ἐὰν κώνου τομὴ ἢ κύκλου περιφέρεια μιᾷ τῶν ἀντικειμένων συμπίπτῃ, τῇ λοιπῇ αὐτῶν οὐ συμπεσεῖται κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ Α, Β, καὶ συμβαλλέτω τῇ Α κώνου τομὴ ἢ κύκλου περιφέρεια ἡ ΑΒΓ καὶ τεμνέτω τὴν Β ἀντικειμένην κατὰ τὰ Β, Γ. λέγω, ὅτι κατ' ἄλλο σημεῖον οὐ συμπεσεῖται τῇ ΒΓ.

εἰ γὰρ δυνατόν, συμπιπτέτω κατὰ τὸ Δ. ἡ ἄρα ΒΓΔ τῇ ΒΓ τομῇ συμβάλλει κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἔχουσα τὰ κοῖλα· ὅπερ ἀδύνατον.

ὁμοίως δὲ δειχθήσεται, καὶ ἐὰν ἡ ΑΒΓ γραμμὴ τῆς ἀντικειμένης ἐφάπτηται.

---


15. μιᾷ] p, om. V. 19. Α] p, del. punctis V; Κ c, om. v. 20. τὴν Β] τῇ ΝΒ V; τὴν ΒΓ p; corr. Memus. 24. μή] om. Vp; corr. Memus.

sint oppositae sectiones *Δ*, *ΑΕΓΖ*, sitque *ΑΒΖ* coni sectio uel arcus circuli cum altera oppositarum concurrens in duobus punctis *Α*, *Ζ*, et *ΑΒΖ*, *ΑΓΖ* sectiones concaua ad easdem partes habeant. dico, lineam *ΑΒΖ* productam cum *Δ* non concurrere.

ducatur enim *ΑΖ*. et quoniam *Δ*, *ΑΓΖ* oppositae sunt, et recta *ΑΖ* in duobus punctis hyperbolam secat, producta cum opposita *Δ* non concurret [II, 33]. ergo ne linea *ΑΒΖ* quidem cum *Δ* concurret.

## XXXVII.

Si coni sectio uel arcus circuli cum altera oppositarum concurrit, cum reliqua earum non concurret in pluribus punctis quam in duobus.




sint oppositae *Α*, *Β*, et cum *Α* concurrat coni sectio uel arcus circuli *ΑΒΓ* secetque oppositam *Β* in *Β*, *Γ*. dico, eam cum *ΒΓ* in nullo alio puncto concurrere.

nam si fieri potest, concurrat in *Δ*. *ΒΓΔ* igitur cum sectione *ΒΓ* in pluribus punctis quam in duobus concurrit concaua ad easdem partes non habens [prop. XXXVI]; quod fieri non potest [prop. XXXV].


similiter autem demonstrabimus, etiam si linea *ΑΒΓ* oppositam contingit.

ἐφάψεται κατὰ τὰ κοῖλα. ὁμοίως δὴ δειχθήσεται, ὅτι οὐδὲ τῆς *Β*. ἤχθωσαν τῶν *Α*, *Β* τομῶν ἐφαπτόμεναι αἱ *ΑΔ*, *ΒΕ*· αὗται δὴ ἐφάψονται τῆς *ΑΒΓ* γραμμῆς. εἰ γὰρ δυνατόν, τεμνέτω ἡ ἑτέρα αὐτῶν, καὶ ἔστω ἡ *ΑΖ*. μεταξὺ ἄρα τῆς *ΑΖ* ἐφαπτομένης καὶ τῆς *Α* τομῆς παρεμπέπτωκεν εὐθεῖα ἡ *ΑΗ*· ὅπερ ἀδύνατον. ἐφάψονται ἄρα τῆς *ΑΒΓ*, καὶ διὰ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἡ *ΑΒΓ* καθ' ἕτερον οὐ συμβάλλει ταῖς *Α*, *Β* ἀντικειμέναις.

μα'.

Ἐὰν ὑπερβολὴ μιᾷ τῶν ἀντικειμένων κατὰ δύο σημεῖα συμπίπτῃ ἀντεστραμμένα τὰ κυρτὰ ἔχουσα, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ οὐ συμπεσεῖται τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀντικειμένων.


ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ *ΑΒΔ*, *Ζ*, καὶ ὑπερβολὴ ἡ *ΑΒΓ* τῇ *ΑΒΔ* συμβαλλέτω κατὰ τὰ *Α*, *Β* σημεῖα ἀντεστραμμένα ἔχουσα τὰ κυρτὰ τοῖς κοίλοις, καὶ τῆς *ΑΒΓ* ἔστω ἀντικειμένη ἡ *Ε*. λέγω, ὅτι οὐ συμπεσεῖται τῇ *Ζ*.




ἐπεζεύχθω ἡ *ΑΒ* καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ *Η*. ἐπεὶ οὖν ὑπερβολὴν τὴν *ΑΒΔ* εὐθεῖα τέμνει ἡ *ΑΒΗ*, ἐκβαλλομένη δὲ ἐφ' ἑκάτερα ἐκτὸς πίπτει τῆς τομῆς, οὐ συμπεσεῖται τῇ *Ζ* τομῇ. ὁμοίως δὴ

5. Post *ΑΖ* add. Vp: ὅπως (om. p) καὶ φανερόν, ὅτι, ἐὰν ἡ *ΓΑΔ* γραμμὴ συμπίπτῃ καὶ τῇ *Β* ἀντικειμένῃ, οὐκ ἐφάψεται τῆς *Α* τοῖς κοίλοις ἑαυτῆς (αὐτῆς p)· δειχθήσεται γὰρ ἀντιστρόφως (ἡ *ΓΑΔ* γραμμὴ om. p addito λείπει), quae omisi cum Commandino; post ἀντικειμέναις lin. 8 transposuit Halley

in parte concaua non continget [prop. XXXIX]. iam eodem modo demonstrabimus, eam ne $B$ quidem ita contingere. ducantur $A\Delta$, $BE$ sectiones $A$, $B$ contingentes; eae igitur lineam $AB\Gamma$ contingent. nam si fieri potest, altera secet et sit $AZ$. itaque inter $AZ$ contingentem et sectionem $A$ recta incidit $AH$; quod fieri non potest [I, 36]. ergo $AB\Gamma$ contingent, et ideo manifestum est, $AB\Gamma$ cum oppositis $A$, $B$ in nullo alio puncto concurrere.




## XLI.

Si hyperbola cum altera oppositarum in duobus punctis concurrit conuexa habens aduersa, sectio ei opposita cum altera oppositarum non concurret.

sint oppositae $AB\Delta$, $Z$, et hyperbola $AB\Gamma$ cum $AB\Delta$ in punctis $A$, $B$ concurrat conuexa concauis aduersa habens, et sectioni $AB\Gamma$ opposita sit $E$. dico, hanc cum $Z$ non concurrere.

ducatur $AB$ et ad $H$ producatur. quoniam igitur recta $ABH$ hyperbolam $AB\Delta$ secat, et in utramque partem producta extra sectionem cadit, cum $Z$ sectione non concurret [II, 33]. similiter igitur propter

---

(ὅπως] οὕτως, $\Gamma A\Delta$] $\Gamma AB$, καί] om., δὲ ἀντιστρόφως τῇ λε′).
6. $AH$] p, $H$ V. 11. ὑπερβολή] p, ὑπερβολῇ V. 16. $AB\Gamma$] p, $AB$ V. $AB\Delta$] p, $A\Delta$ V. 19. τῆς] τῇ p 26. οὐ] scripsi; ὥστε οὐ V, οὐκ ἄρα p; possis etiam cum Commandino δέ lin. 25 delere aut in δή corrigere („utique“ Memus).

διὰ τὴν *ΑΒΓ* ὑπερβολὴν οὐδὲ τῇ *Ε* ἀντικειμένῃ συμπίπτει. οὐδὲ ἡ *Ε* ἄρα τῇ *Ζ* συμπεσεῖται.

μβ'.

Ἐὰν ὑπερβολὴ ἑκατέρᾳ τῶν ἀντικειμένων συμπίπτῃ, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ οὐδετέρᾳ τῶν ἀντικειμένων συμπεσεῖται κατὰ δύο σημεῖα.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ *Α*, *Β*, καὶ ἡ *ΑΓΒ* ὑπερβολὴ συμπιπτέτω ἑκατέρᾳ τῶν *Α*, *Β* ἀντικειμένων. λέγω, ὅτι ἡ τῇ *ΑΓΒ* ἀντικειμένη οὐ συμβάλλει ταῖς *Α*, *Β* τομαῖς κατὰ δύο σημεῖα.

εἰ γὰρ δυνατόν, συμβαλλέτω κατὰ τὰ *Δ*, *Ε*, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ *ΔΕ* ἐκβεβλήσθω. διὰ μὲν δὴ τὴν *ΔΕ* τομὴν οὐ συμπεσεῖται ἡ *ΔΕ* εὐθεῖα τῇ *ΑΒ* τομῇ, διὰ δὲ τὴν *ΑΕΔ* οὐ συμπεσεῖται τῇ *Β*· διὰ γὰρ τῶν τριῶν τόπων ἐλεύσεται· ὅπερ ἀδύνατον. ὁμοίως δὴ δειχθήσεται, ὅτι οὐδὲ τῇ *Β* τομῇ κατὰ δύο σημεῖα συμπεσεῖται.

διὰ τὰ αὐτὰ δὴ οὐδὲ ἐφάψεται ἑκατέρας αὐτῶν. ἀγαγόντες γὰρ ἐπιψαύουσαν τὴν *ΘΕ* ἐφάπτεται μὲν αὔτη ἑκατέρας τῶν τομῶν· ὥστε διὰ μὲν τὴν *ΔΕ* οὐ συμπεσεῖται τῇ *ΑΓ*, διὰ δὲ τὴν *ΑΕ* οὐ συμβάλλει τῇ *Β*. ὥστε οὐδὲ ἡ *ΑΓ* τῇ *Β* συμβάλλει· ὅπερ οὐχ ὑπόκειται.

μγ'.

Ἐὰν ὑπερβολὴ ἑκατέραν τῶν ἀντικειμένων τέμνῃ κατὰ δύο σημεῖα ἀντεστραμμένα ἔχουσα πρὸς ἑκατέραν

---


2. Ζ] p, om. lacuna 8 litt. relicta V. 9. *ΑΓΒ*] corr. ex *ΑΒ* m. 1 p, *ΑΒ* V. 11. τά] cp, om. V. 13. *ΔΕ* (pr.)] cvp et renouat. m. rec. V. 19. μέν] delendum? 20. αὔτη] αὐτή Vp.

hyperbolam $AB\Gamma$ ne cum $E$ quidem opposita concurrit. ergo ne $E$ quidem cum $Z$ concurret.

## XLII.

Si hyperbola cum utraque opposita concurrit, sectio ei opposita cum neutra oppositarum in duobus punctis concurret.

sint oppositae $A$, $B$, et hyperbola $A\Gamma B$ cum utraque opposita $A$, $B$ concurrat. dico, sectionem hyperbolae $A\Gamma B$ oppositam cum sectionibus $A$, $B$ in duobus punctis non concurrere.




nam si fieri potest, concurrat in $\Delta$, $E$, et ducta $\Delta E$ producatur. propter sectionem $\Delta E$ igitur recta $\Delta E$ cum sectione $AB$ non concurret [II, 33], propter $AE\Delta$ autem cum $B$ non concurret; nam per tria illa loca [II, 33] ueniet; quod fieri non potest. eodem modo demonstrabimus, eam ne cum $B$ quidem sectione in duobus punctis concurrere.

iam eadem de causa ne continget quidem utramque sectionem. ducta[1]) enim $\Theta E$ utramque sectionem continget; quare propter sectionem $\Delta E$ cum $A\Gamma$ non concurret, propter $AE$ autem cum $B$ non concurrit [II, 33]. ergo ne $A\Gamma$ quidem cum $B$ concurrit; quod contra hypothesim est.

---

1) Anacoluthia foeda et μέν superfluum lin. 19 significant, aliquid turbatum esse.

μδ'.

Ἐὰν ὑπερβολὴ μίαν τῶν ἀντικειμένων κατὰ τέσσαρα σημεῖα τέμνῃ, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ οὐ συμπεσεῖται τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀντικειμένων.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ $ΑΒΓΔ$, $Ε$, καὶ τεμνέτω ὑπερβολὴ τὴν $ΑΒΓΔ$ κατὰ τέσσαρα σημεῖα τὰ $Α$, $Β$, $Γ$, $Δ$, καὶ ἔστω αὐτῆς ἀντικειμένη ἡ $Κ$. λέγω, ὅτι ἡ $Κ$ οὐ συμπεσεῖται τῇ $Ε$.

εἰ γὰρ δυνατόν, συμπιπτέτω κατὰ τὸ $Κ$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $ΑΒ$, $ΓΔ$ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν· συμπεσοῦνται δὴ ἀλλήλαις. συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ $Λ$, καὶ ὃν μὲν ἔχει λόγον ἡ $ΑΛ$ πρὸς $ΛΒ$, ἐχέτω ἡ $ΑΠ$ πρὸς $ΠΒ$, ὃν δὲ ἡ $ΔΛ$ πρὸς $ΛΓ$, ἡ $ΔΡ$ πρὸς $ΡΓ$. ἡ ἄρα διὰ τῶν $Π$, $Ρ$ ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται ἑκατέρᾳ τῶν τομῶν, καὶ αἱ ἀπὸ τοῦ $Λ$ ἐπὶ τὰς συμπτώσεις ἐφάψονται. ἐπεζεύχθω δὴ ἡ $ΚΛ$ καὶ ἐκβεβλήσθω· τεμεῖ δὴ τὴν ὑπὸ $ΒΛΓ$ γωνίαν καὶ τὰς τομὰς κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον. τεμνέτω κατὰ τὰ $Ζ$, $Μ$· ἔσται δὴ διὰ μὲν τὰς $ΑΘΖΗ$, $Κ$ ἀντικειμένας, ὡς ἡ $ΝΚ$ πρὸς $ΚΛ$, ἡ $ΝΖ$ πρὸς $ΖΛ$, διὰ δὲ τὰς $ΑΒΓΔ$, $Ε$, ὡς ἡ $ΝΚ$ πρὸς $ΚΛ$, ἡ $ΝΜ$ πρὸς $ΜΛ$· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα αἱ $Ε$, $Κ$ συμπίπτουσιν ἀλλήλαις.

με'.

Ἐὰν ὑπερβολὴ τῇ μὲν τῶν ἀντικειμένων συμπίπτῃ κατὰ δύο σημεῖα ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἔχουσα αὐτῇ τὰ κοῖλα, τῇ δὲ καθ' ἓν σημεῖον, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ οὐδετέρᾳ τῶν ἀντικειμένων συμπεσεῖται.

---

26. καθ'] κατὰ τό Vp, corr. Halley.

## XLIII.

Si hyperbola utramque oppositam in binis punctis secat partem conuexam utrique aduersam habens, sectio ei opposita cum neutra oppositarum concurret.

sint oppositae *A*, *B*, et hyperbola *ΓABΔ* utramque *A*, *B* secet in binis punctis partem conuexam aduersam habens. dico, sectionem ei oppositam *EZ* cum neutra sectionum *A*, *B* concurrere.

nam si fieri potest, cum *A* in *E* concurrat, ducanturque *ΓA*, *ΔB* et producantur; concurrent igitur inter se [II, 25]. concurrant in *Θ*; *Θ* igitur in angulo ab asymptotis sectionis *ΓABΔ* comprehenso positum erit [II, 25]. et sectio eius opposita est *EZ*; itaque recta ab *E* ad *Θ* ducta intra angulum ab *AΘ*, *ΘB* comprehensum cadet. rursus quoniam *ΓAE* hyperbola est, et *ΓAΘ*, *ΘE* concurrunt, puncta autem concursus *Γ*, *A* punctum *E* non continent, punctum *Θ* intra asymptotas sectionis *ΓAE* positum erit[1]. et *BΔ* sectio eius opposita est; itaque recta a *B* ad *Θ* ducta intra angulum *ΓΘE* cadet; quod absurdum est; nam eadem in angulum *AΘB* cadebat. ergo *EZ* cum alterutra sectionum *A*, *B* non concurret.

1) Hoc ex II, 25 tum demum uerum esset, si *ΘE* sectionem *AE* aut contingeret aut in duobus punctis secaret, quod nunc non constat. praeterea in sequentibus sine demonstratione supponitur, *EΘB* unam esse rectam (et ita est in figura codicis V). itaque demonstratio falsa est, sed tota damnanda, non ultima pars cum Commandino et Halleio uiolenter mutanda.

μδʹ.

Ἐὰν ὑπερβολὴ μίαν τῶν ἀντικειμένων κατὰ τέσσαρα σημεῖα τέμνῃ, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ οὐ συμπεσεῖται τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀντικειμένων.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ $ΑΒΓΔ$, $Ε$, καὶ τεμνέτω ὑπερβολὴ τὴν $ΑΒΓΔ$ κατὰ τέσσαρα σημεῖα τὰ $Α$, $Β$, $Γ$, $Δ$, καὶ ἔστω αὐτῆς ἀντικειμένη ἡ $Κ$. λέγω, ὅτι ἡ $Κ$ οὐ συμπεσεῖται τῇ $Ε$.

εἰ γὰρ δυνατόν, συμπιπτέτω κατὰ τὸ $Κ$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $ΑΒ$, $ΓΔ$ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν· συμπεσοῦνται δὴ ἀλλήλαις. συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ $Λ$, καὶ ὃν μὲν ἔχει λόγον ἡ $ΑΛ$ πρὸς $ΛΒ$, ἐχέτω ἡ $ΑΠ$ πρὸς $ΠΒ$, ὃν δὲ ἡ $ΔΛ$ πρὸς $ΛΓ$, ἡ $ΔΡ$ πρὸς $ΡΓ$. ἡ ἄρα διὰ τῶν $Π$, $Ρ$ ἐκβαλλομένη συμπεσεῖται ἑκατέρᾳ τῶν τομῶν, καὶ αἱ ἀπὸ τοῦ $Λ$ ἐπὶ τὰς συμπτώσεις ἐφάψονται. ἐπεζεύχθω δὴ ἡ $ΚΛ$ καὶ ἐκβεβλήσθω· τεμεῖ δὴ τὴν ὑπὸ $ΒΛΓ$ γωνίαν καὶ τὰς τομὰς κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον. τεμνέτω κατὰ τὰ $Ζ$, $Μ$· ἔσται δὴ διὰ μὲν τὰς $ΑΘΖΗ$, $Κ$ ἀντικειμένας, ὡς ἡ $ΝΚ$ πρὸς $ΚΛ$, ἡ $ΝΖ$ πρὸς $ΖΛ$, διὰ δὲ τὰς $ΑΒΓΔ$, $Ε$, ὡς ἡ $ΝΚ$ πρὸς $ΚΛ$, ἡ $ΝΜ$ πρὸς $ΜΛ$· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα αἱ $Ε$, $Κ$ συμπίπτουσιν ἀλλήλαις.

μεʹ.

Ἐὰν ὑπερβολὴ τῇ μὲν τῶν ἀντικειμένων συμπίπτῃ κατὰ δύο σημεῖα ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἔχουσα αὐτῇ τὰ κοῖλα, τῇ δὲ καθ' ἓν σημεῖον, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ οὐδετέρᾳ τῶν ἀντικειμένων συμπεσεῖται.

---

*26. καθ'*] *κατά τό* Vp, corr. Halley.

## XLIV.


Si hyperbola alteram oppositarum in quattuor punctis secat, sectio ei opposita cum altera oppositarum non concurret.

sint oppositae $AB\Gamma\Delta$, $E$, et hyperbola sectionem $AB\Gamma\Delta$ in quattuor punctis secet $A$, $B$, $\Gamma$, $\Delta$, eiusque sectio opposita sit $K$. dico, $K$ cum $E$ non concurrere.

nam si fieri potest, concurrat in $K$, ducanturque $AB$, $\Gamma\Delta$ et producantur; concurrent igitur inter se [II, 25]. concurrant in $\Lambda$, et sit

$$A\Lambda : \Lambda B = A\Pi : \Pi B, \quad \Delta\Lambda : \Lambda\Gamma = \Delta P : P\Gamma.$$

itaque recta per $\Pi$, $P$ producta cum utraque sectione concurret, et rectae ab $\Lambda$ ad puncta concursus ductae contingent [prop. IX]. ducatur igitur $K\Lambda$ et producatur; secabit igitur angulum $B\Lambda\Gamma$ et sectiones in alio atque alio puncto. secet in $Z$, $M$; erit igitur [III, 39; Eucl. V, 16] propter oppositas $A\Theta ZH$, $K$





$$NK : K\Lambda = NZ : Z\Lambda,$$

propter $AB\Gamma\Delta$, $E$ autem $NK : K\Lambda = NM : M\Lambda$; quod fieri non potest. ergo $E$, $K$ inter se non concurrunt.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ ΑΒ, Γ, καὶ ὑπερβολὴ ἡ ΑΓΒ τῇ μὲν ΑΒ συμπιπτέτω κατὰ τὰ Α, Β, τῇ δὲ Γ καθ' ἓν τὸ Γ, καὶ ἔστω τῇ ΑΓΒ ἀντικειμένη ἡ Δ. λέγω, ὅτι ἡ Δ οὐδετέρᾳ τῶν ΑΒ, Γ συμπεσεῖται.

ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΑΓ, ΒΓ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν. αἱ ἄρα ΑΓ, ΒΓ τῇ Δ τομῇ οὐ συμπεσοῦνται. ἀλλ' οὐδὲ τῇ Γ τομῇ κατ' ἄλλο σημεῖον οὐ συμπεσοῦνται πλὴν τὸ Γ. εἰ γὰρ συμβάλλουσι καὶ καθ' ἕτερον, τῇ ΑΒ ἀντικειμένῃ οὐ συμπεσοῦνται· ὑπόκεινται δὲ συμπίπτουσαι. αἱ ΑΓ, ΒΓ ἄρα εὐθεῖαι τῇ μὲν Γ τομῇ καθ' ἓν συμβάλλουσι τὸ Γ, τῇ δὲ Δ τομῇ οὐδὲ ὅλως συμβάλλουσιν. ἡ Δ ἄρα ἔσται ὑπὸ τὴν γωνίαν τὴν ὑπὸ ΕΓΖ. ὥστε ἡ Δ τομὴ οὐ συμπεσεῖται ταῖς ΑΒ, Γ.




μϛ'.

Ἐὰν ὑπερβολὴ μιᾷ τῶν ἀντικειμένων κατὰ τρία σημεῖα συμβάλλῃ, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀντικειμένων οὐ συμπεσεῖται πλὴν καθ' ἕν.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ ΑΒΓ, ΔΕΖ, καὶ ὑπερβολὴ ἡ ΑΜΒΓ συμβαλλέτω τῇ ΑΒΓ κατὰ τρία σημεῖα τὰ Α, Β, Γ, ἔστω δὲ τῇ ΑΜΓ ἀντικειμένη ἡ ΔΕΚ [τῇ δὲ ΑΒΓ ἡ ΔΕΖ]. λέγω, ὅτι ἡ ΔΕΚ τῇ ΔΕΖ οὐ συμβάλλει κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ ἕν.

---

3. ΑΓΒ] p; ΑΓ, ΒΓ V. 10. συμβάλλουσι] cp, συμβάλλωσι V. 25. τῇ δὲ ΑΒΓ ἡ ΔΕΖ] V, om. p.

## XLV.

Si hyperbola cum altera oppositarum in duobus punctis concurrit concaua ad easdem partes habens, cum altera autem in uno, sectio ei opposita cum neutra oppositarum concurret.

sint oppositae *AB*, *Γ*, et hyperbola *AΓB* cum *AB* in *A*, *B* concurrat, cum *Γ* autem in uno *Γ*, sitque sectioni *AΓB* opposita *Δ*. dico, *Δ* cum neutra oppositarum *AB*, *Γ* concurrere.

ducantur enim *AΓ*, *BΓ* et producantur. itaque *AΓ*, *BΓ* cum sectione *Δ* non concurrent [II, 33]. uerum ne cum *Γ* quidem sectione in alio puncto concurrent ac *Γ*. nam si in alio quoque puncto concurrunt, cum opposita *AB* non concurrent [II, 33]; at supposuimus, eas cum illa concurrere. itaque rectae *AΓ*, *BΓ* cum sectione *Γ* in uno puncto *Γ* concurrunt, cum *Δ* autem sectione prorsus non concurrunt. quare *Δ* in angulo *EΓZ* posita est. ergo sectio *Δ* cum *AB*, *Γ* non concurret.

## XLVI.

Si hyperbola cum altera oppositarum in tribus punctis concurrit, sectio ei opposita cum altera oppositarum non concurret nisi in uno puncto.


sint oppositae *ABΓ*, *ΔEZ*, et hyperbola *AMBΓ* cum *ABΓ* in tribus punctis *A*, *B*, *Γ* concurrat, sit autem sectioni *AMΓ* opposita *ΔEK*. dico, *ΔEK* cum *ΔEZ* non concurrere in pluribus punctis quam in uno.

nam si fieri potest, concurrat in *Δ*, *E*, ducanturque *AB*, *ΔE*.

εἰ γὰρ δυνατόν, συμβαλλέτω κατὰ τὰ Δ, Ε, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΒ, ΔΕ.

ἤτοι δὴ παράλληλοί εἰσιν ἢ οὔ.

ἔστωσαν πρότερον παράλληλοι, καὶ τετμήσθωσαν αἱ ΑΒ, ΔΕ δίχα κατὰ τὰ Η, Θ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΗΘ· διάμετρος ἄρα ἐστὶ πασῶν τῶν τομῶν καὶ τεταγμένως ἐπ' αὐτὴν κατηγμέναι αἱ ΑΒ, ΔΕ. ἤχθω




δὴ ἀπὸ τοῦ Γ παρὰ τὴν ΑΒ ἡ ΓΝΞΟ· ἔσται δὴ καὶ αὐτὴ τεταγμένως ἐπὶ τὴν διάμετρον κατηγμένη καὶ συμπεσεῖται ταῖς τομαῖς κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο. εἰ γὰρ κατὰ τὸ αὐτό, οὐκέτι κατὰ τρία συμβάλλουσιν, ἀλλὰ τέσσαρα. ἔσται δὴ ἐν μὲν τῇ ΑΜΒ τομῇ ἴση ἡ ΓΝ τῇ ΝΞ, ἐν δὲ τῇ ΑΛΒ ἡ ΓΝ τῇ ΝΟ. καὶ ἡ ΟΝ ἄρα τῇ ΝΞ ἐστιν ἴση· ὅπερ ἀδύνατον.

μὴ ἔστωσαν δὴ παράλληλοι αἱ ΑΒ, ΔΕ, ἀλλ' ἐκβαλλόμεναι συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Π, καὶ ἡ ΓΟ ἤχθω παρὰ τὴν ΑΠ καὶ συμπιπτέτω τῇ ΔΠ ἐκβληθείσῃ κατὰ τὸ Ρ, καὶ τετμήσθωσαν αἱ ΑΒ, ΔΕ δίχα κατὰ τὰ Η, Θ, καὶ διὰ τῶν Η, Θ διάμετροι ἤχθωσαν

---

5. αἱ] p, om. V. 13. ΟΝ] ΟΝΡ V; corr. Comm.; ΝΟ p. 19. κατά] p, καὶ κατά V.

aut igitur parallelae sunt aut non parallelae.


prius parallelae sint, et $AB$, $\Delta E$ in $H$, $\Theta$ in binas partes aequales secentur, ducaturque $H\Theta$; ea igitur omnium sectionum diametrus est, et $AB$, $\Delta E$ ad eam ordinate ductae sunt [II, 36]. iam a $\Gamma$ rectae $AB$ parallela ducatur $\Gamma N \Xi O$; itaque et ipsa ad diametrum ordinate ducta erit et cum sectionibus in alio atque alio puncto concurret. nam si in eodem concurrit, non iam in tribus punctis concurrunt, sed in quattuor. itaque erit [I def. 4] in sectione $AMB$

$$\Gamma N = N\Xi,$$

in sectione $A\Lambda B$ autem $\Gamma N = NO$. ergo etiam

$$ON = N\Xi;$$

quod fieri non potest.




iam $AB$, $\Delta E$ parallelae ne sint, sed productae in $\Pi$ concurrant, ducaturque $\Gamma O$ rectae $A\Pi$ parallela

αἱ ΗΣΙ, ΘΛΜ, ἀπὸ δὲ τῶν Ι, Λ, Μ ἐφαπτόμεναι τῶν τομῶν αἱ ΙΥΤ, ΜΥ, ΛΤ· ἔσται δὴ ἡ μὲν ΙΤ παρὰ τὴν ΔΠ, αἱ δὲ ΛΤ, ΜΥ παρὰ τὰς ΑΠ, ΟΡ. καὶ ἐπεί ἐστιν, ὡς τὸ ἀπὸ ΜΥ πρὸς τὸ ἀπὸ ΥΙ, τὸ ὑπὸ ΑΠΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΠΕ, ἀλλ' ὡς τὸ ὑπὸ ΑΠΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΠΕ, τὸ ἀπὸ ΛΤ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΙ, καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΜΥ πρὸς τὸ ἀπὸ ΥΙ, τὸ ἀπὸ ΛΤ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΙ. διὰ τὰ αὐτὰ ἔσται, ὡς μὲν τὸ ἀπὸ ΜΥ πρὸς τὸ ἀπὸ ΥΙ, τὸ ὑπὸ ΞΡΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΡΕ, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΛΤ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΙ, τὸ ὑπὸ ΟΡΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΡΕ. ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ ΟΡΓ τῷ ὑπὸ ΞΡΓ· ὅπερ ἀδύνατον.

μζ'.

Ἐὰν ὑπερβολὴ τῆς μὲν ἐφάπτηται τῶν ἀντικειμένων, τὴν δὲ κατὰ δύο σημεῖα τέμνῃ, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ οὐδεμιᾷ τῶν ἀντικειμένων συμπεσεῖται.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ ΑΒΓ, Δ, καὶ ὑπερβολή τις ἡ ΑΒΔ τὴν μὲν ΑΒΓ τεμνέτω κατὰ τὰ Α, Β, τῆς δὲ Δ ἐφαπτέσθω κατὰ τὸ Δ, καὶ ἔστω τῆς ΑΒΔ τομῆς ἀντικειμένη ἡ ΓΕ. λέγω, ὅτι ἡ ΓΕ οὐδεμιᾷ τῶν ΑΒΓ, Δ συμπεσεῖται.

εἰ γὰρ δυνατόν, συμπιπτέτω τῇ ΑΒ κατὰ τὸ Γ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΒ, καὶ διὰ τοῦ Δ ἐφαπτομένη ἤχθω συμπίπτουσα τῇ ΑΒ κατὰ τὸ Ζ· τὸ Ζ ἄρα σημεῖον ἐντὸς ἔσται τῶν ἀσυμπτώτων τῆς ΑΒΔ τομῆς. καί ἐστιν αὐτῆς ἀντικειμένη ἡ ΓΕ· ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὸ Ζ ἐντὸς πεσεῖται τῆς ὑπὸ τῶν ΒΖΔ περιεχομένης

1. ΘΛΜ] p, ΘΛΜΣ V. 5. ἀλλ' — 6. ΤΙ] p (τῶν ΑΠ, ΠΒ; τῶν ΔΠ, ΠΕ; τῆς ΛΤ; τῆς ΤΙ); om. V. 9. ΞΡΓ] corr. ex ΞΡΠ m. 1 V, ΞΡΠ v; ΞΡ, ΡΓ p. 14. ὑπερβολή] p, ὑπερβολῆς V.

et cum $\Delta\Pi$ producta in $P$ concurrat, $AB$, $\Delta E$ autem in $H$, $\Theta$ in binas partes aequales secentur, et per $H$, $\Theta$ diametri ducantur $H\Sigma I$, $\Theta\Lambda M$, ab $I$, $\Lambda$, $M$ autem sectiones contingentes $I\Upsilon T$, $M\Upsilon$, $\Lambda T$; itaque [II, 5] $IT$ rectae $\Delta\Pi$ parallela erit, $\Lambda T$ autem et $M\Upsilon$ rectis $A\Pi$, $OP$. et quoniam est [III, 19]

$$M\Upsilon^2 : \Upsilon I^2 = A\Pi \times \Pi B : \Delta\Pi \times \Pi E,$$

$$A\Pi \times \Pi B : \Delta\Pi \times \Pi E = \Lambda T^2 : TI^2,$$

erit etiam $M\Upsilon^2 : \Upsilon I^2 = \Lambda T^2 : TI^2$. eadem de causa erit $M\Upsilon^2 : \Upsilon I^2 = \Xi P \times P\Gamma : \Delta P \times PE$ et


$$\Lambda T^2 : TI^2 = OP \times P\Gamma : \Delta P \times PE.$$

ergo [Eucl. V, 9] $OP \times P\Gamma = \Xi P \times P\Gamma$; quod fieri non potest.

## XLVII.

Si hyperbola alteram oppositarum contingit, alteram in duobus punctis secat, sectio ei opposita cum neutra oppositarum concurret.

sint oppositae $AB\Gamma$, $\Delta$, et hyperbola $AB\Delta$ sectionem $AB\Gamma$ secet in $A$, $B$, sectionem autem $\Delta$ in $\Delta$ contingat, sitque sectioni $AB\Delta$ opposita $\Gamma E$. dico, $\Gamma E$ cum neutra sectionum $AB\Gamma$, $\Delta$ concurrere.




nam si fieri potest, cum $AB$ in $\Gamma$ concurrat, ducaturque $AB$, et per $\Delta$ contingens ducatur recta in $Z$ cum $AB$ concurrens; $Z$ igitur punctum intra asymptotas sectionis $AB\Delta$ positum erit [II, 25]. et ei opposita est $\Gamma E$; itaque recta a $\Gamma$ ad $Z$ ducta intra

γωνίας. πάλιν ἐπεὶ ὑπερβολή ἐστιν ἡ $ΑΒΓ$, καὶ συμπίπτουσιν αἱ $ΑΒ$, $ΓΖ$, καὶ αἱ $Α$, $Β$ συμπτώσεις οὐ περιέχουσι τὴν $Γ$, τὸ $Ζ$ σημεῖον μεταξὺ τῶν ἀσυμπτώτων ἐστὶ τῆς $ΑΒΓ$ τομῆς. καί ἐστιν αὐτῆς ἀντικειμένη ἡ $Δ$· ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ $Δ$ ἐπὶ τὸ $Ζ$ ἐντὸς πεσεῖται τῆς ὑπὸ $ΑΖΓ$ γωνίας· ὅπερ ἄτοπον· ἔπιπτε γὰρ καὶ εἰς τὴν ὑπὸ $ΒΖΔ$. οὐκ ἄρα ἡ $ΓΕ$ μιᾷ τῶν $ΑΒΓ$, $Δ$ συμπεσεῖται.

μη'.

Ἐὰν ὑπερβολὴ μιᾶς τῶν ἀντικειμένων καθ' ἓν μὲν ἐφάπτηται, κατὰ δύο δὲ συμπίπτῃ, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ τῇ ἀντικειμένῃ οὐ συμπεσεῖται.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ $ΑΒΓ$, $Δ$, καὶ ὑπερβολή τις ἡ $ΑΗΓ$ ἐφαπτέσθω μὲν κατὰ τὸ $Α$, τεμνέτω δὲ κατὰ τὰ $Β$, $Γ$, καὶ τῆς $ΑΗΓ$ ἀντικειμένη ἔστω ἡ $Ε$. λέγω, ὅτι ἡ $Ε$ τῇ $Δ$ οὐ συμπεσεῖται.

εἰ γὰρ δυνατόν, συμπιπτέτω κατὰ τὸ $Δ$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $ΒΓ$ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ $Ζ$, καὶ ἤχθω ἀπὸ τοῦ $Α$ ἡ $ΑΖ$ ἐφαπτομένη. ὁμοίως δὴ τοῖς πρότερον δειχθήσεται, ὅτι τὸ $Ζ$ σημεῖον ἐντὸς τῆς ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων περιεχομένης γωνίας ἐστί. καὶ ἡ $ΑΖ$ ἐφάψεται τῶν τομῶν ἀμφοτέρων, καὶ ἡ $ΔΖ$ ἐκβαλλομένη τεμεῖ τὰς τομὰς μεταξὺ τῶν $Α$, $Β$ κατὰ τὰ $Η$, $Κ$. καὶ ὃν δὴ ἔχει λόγον ἡ $ΓΖ$ πρὸς $ΖΒ$, ἐχέτω ἡ $ΓΛ$ πρὸς $ΛΒ$, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ $ΑΛ$ ἐκβεβλήσθω· τεμεῖ δὴ τὰς τομὰς κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο. τεμνέτω κατὰ τὰ $Ν$, $Μ$· αἱ ἄρα ἀπὸ τοῦ $Ζ$ ἐπὶ τὰ $Ν$, $Μ$ ἐφάψονται τῶν τομῶν, καὶ ἔσται ὁμοίως τοῖς


3. περιέχουσι] cp, περιέχωσι e corr. V  5. $Δ$ (alt.)] scripsi; $Γ$ Vp.  25. $ΛΒ$] p, om. V extr. pag.

angulum $BZ\Delta$ cadet. rursus quoniam hyperbola est $AB\Gamma$, et $AB$, $\Gamma Z$ concurrunt, et puncta concursus $A$, $B$ punctum concursus $\Gamma$ non continent, punctum $Z$ intra asymptotas sectionis $AB\Gamma$ positum est.[1]) et ei opposita est $\Delta$; itaque recta a $\Delta$ ad $Z$ ducta intra angulum $AZ\Gamma$ cadet; quod absurdum est; nam etiam in angulum $BZ\Delta$ cadebat. ergo $\Gamma E$ cum neutra sectionum $AB\Gamma$, $\Delta$ concurret.

## XLVIII.

Si hyperbola alteram oppositarum in uno puncto contingit, in duobus autem cum ea concurrit, sectio ei opposita cum opposita non concurret.

sint oppositae $AB\Gamma$, $\Delta$, et hyperbola $AH\Gamma$ in $A$ contingat, in $B$, $\Gamma$ autem secet, et sectioni $AH\Gamma$ opposita sit $E$. dico, $E$ cum $\Delta$ non concurrere.




nam si fieri potest, in $\Delta$ concurrat, ducaturque $B\Gamma$ et ad $Z$ producatur, ab $A$ autem $AZ$ contingens ducatur. iam eodem modo, quo antea, demonstrabimus, punctum $Z$ intra angulum ab asymptotis comprehensum positum esse [II, 25]. et $AZ$ utramque sectionem continget, $\Delta Z$ autem producta sectiones inter $A, B$ in $H, K$ secabit. sitque $\Gamma Z : ZB = \Gamma\Lambda : \Lambda B$,


1) Hic iidem prorsus errores sunt, quos ad prop. XLIII notauimus. hic quoque $\Gamma Z\Delta$ in figura codicis V una est recta.

πρότερον διὰ μὲν τὴν ἑτέραν τομήν, ὡς ἡ ΞΔ πρὸς ΔΖ, ἡ ΞΚ πρὸς ΚΖ, διὰ δὲ τὴν ἑτέραν, ὡς ἡ ΞΔ πρὸς ΔΖ, ἡ ΞΗ πρὸς ΗΖ· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἡ ἀντικειμένη συμπεσεῖται.

μθ'.

Ἐὰν ὑπερβολὴ μιᾶς τῶν ἀντικειμένων ἐφαπτομένη καθ' ἕτερον αὐτῇ σημεῖον συμπίπτῃ, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀντικειμένων οὐ συμπεσεῖται κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ ἕν.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ ΑΒΓ, ΕΖΗ, καὶ ὑπερβολή τις ἡ ΔΑΓ ἐφαπτέσθω μὲν κατὰ τὸ Α, τεμνέτω




δὲ κατὰ τὸ Γ, καὶ ἔστω τῇ ΔΑΓ ἀντικειμένη ἡ ΕΖΘ. λέγω, ὅτι οὐ συμπεσεῖται τῇ ἑτέρᾳ ἀντικειμένῃ κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ ἕν.

εἰ γὰρ δυνατόν, συμβαλλέτω κατὰ δύο τὰ Ε, Ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΖ, καὶ διὰ τοῦ Α ἐφαπτομένη τῶν τομῶν ἤχθω ἡ ΑΚ.

ἤτοι δὴ παράλληλοί εἰσιν ἢ οὔ.

ἔστωσαν πρότερον παράλληλοι, καὶ ἤχθω ἡ διχο-

---

2. διά — 3. ΗΖ] p, om. V. 4. ἡ ἀντικειμένη τῇ ἀντικειμένῃ p.

et ducta $A\Delta$ producatur; secabit igitur sectiones in alio atque alio puncto. secet in $N$, $M$; itaque rectae a $Z$ ad $N, M$ ductae sectiones contingent [prop. I], et eodem modo, quo antea, erit [III, 39; Eucl. V, 16] propter alteram sectionem $\Xi\Delta : \Delta Z = \Xi K : KZ$, propter alteram autem $\Xi\Delta : \Delta Z = \Xi H : HZ$; quod fieri non potest. ergo sectio opposita non concurret.

## XLIX.

Si hyperbola alteram oppositarum contingens in alio quoque puncto cum ea concurrit, sectio ei opposita cum altera oppositarum in pluribus punctis non concurret quam in uno.

sint oppositae $AB\Gamma$, $EZH$, et hyperbola $\Delta A\Gamma$ in $A$ contingat, in $\Gamma$ autem secet, sitque $EZ\Theta$ sectioni $\Delta A\Gamma$ opposita. dico, eam cum altera oppositarum in pluribus punctis non concurrere quam in uno.

nam si fieri potest, concurrat in duobus $E$, $Z$, ducaturque $EZ$, et per $A$ sectiones contingens ducatur $AK$.

aut igitur parallelae sunt aut non parallelae.

prius parallelae sint, et diametrus rectam $EZ$ in duas partes aequales diuidens ducatur; ea igitur per $A$ ueniet et diametrus erit sectionum coniugatarum [II, 34]. per $\Gamma$ rectis $AK$, $EZ$ parallela ducatur $\Gamma\Lambda\Delta B$; ea igitur sectiones in alio atque alio puncto secabit. erit igitur [I def. 4] in altera $\Gamma\Lambda = \Lambda\Delta$, in reliqua autem $\Gamma\Lambda = \Lambda B$. hoc uero fieri non potest.

$AK$, $EZ$ igitur parallelae ne sint, sed in $K$ concurrant, et $\Gamma\Delta$ rectae $AK$ parallela ducta cum $EZ$ in $N$ concurrat, $AB$ autem rectam $EZ$ in duas par-

τομοῦσα διάμετρος τὴν ΕΖ· ἥξει ἄρα διὰ τοῦ Δ καὶ ἔσται διάμετρος τῶν δύο συζυγῶν. ἤχθω διὰ τοῦ Γ παρὰ τὰς ΑΚ, ΕΖ ἡ ΓΛΔΒ· τεμεῖ ἄρα τὰς τομὰς κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον. ἔσται δὴ ἐν μὲν τῇ ἑτέρᾳ ἴση ἡ ΓΛ τῇ ΛΔ, ἐν δὲ τῇ λοιπῇ ἡ ΓΛ τῇ ΛΒ. τοῦτο δὲ ἀδύνατον.

μὴ ἔστωσαν δὴ παράλληλοι αἱ ΑΚ, ΕΖ, ἀλλὰ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Κ, καὶ ἡ ΓΔ παρὰ τὴν ΑΚ ἠγμένη συμπιπτέτω τῇ ΕΖ κατὰ τὸ Ν, ἡ δὲ ΑΒ διχοτομοῦσα τὴν ΕΖ τεμνέτω τὰς τομὰς κατὰ τὰ Ξ, Ο, καὶ ἐφαπτόμεναι ἤχθωσαν τῶν τομῶν ἀπὸ τῶν Ξ, Ο αἱ ΞΠ, ΟΡ. ἔσται ἄρα, ὡς τὸ ἀπὸ ΑΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΞ, τὸ ἀπὸ ΑΡ πρὸς τὸ ἀπὸ ΡΟ, καὶ διὰ τοῦτο ὡς τὸ ὑπὸ ΔΝΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΝΖ, τὸ ὑπὸ ΒΝΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΝΖ. ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ ΔΝΓ τῷ ὑπὸ ΒΝΓ· ὅπερ ἀδύνατον.

## ν'.


Ἐὰν ὑπερβολὴ μιᾶς τῶν ἀντικειμένων καθ' ἓν σημεῖον ἐπιψαύῃ, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀντικειμένων οὐ συμπεσεῖται κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ ΑΒ, ΕΔΗ, καὶ ὑπερβολὴ ἡ ΑΓ τῆς ΑΒ ἐφαπτέσθω κατὰ τὸ Α, καὶ ἔστω τῆς ΑΓ ἀντικειμένη ἡ ΕΔΖ. λέγω, ὅτι ἡ ΕΔΖ τῇ ΕΔΗ οὐ συμπεσεῖται κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο.

εἰ γὰρ δυνατόν, συμβαλλέτω κατὰ τρία τὰ Δ, Ε, Θ, καὶ ἤχθω τῶν ΑΒ, ΑΓ ἐφαπτομένη ἡ ΑΚ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΔΕ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἔστωσαν πρότε-

8. ΓΛΔΒ] p, ΓΛΒΔ V. 10. τά] p, τό V. 22. ΕΔΗ] p, ΔΕΗ V. 24. ΕΔΖ] p, ΔΕΖ V. ΕΔΖ] p, ΔΕΖ V. ΕΔΗ] p, ΔΕΗ V. 26. κατά] cp, κατὰ τά V.

tes aequales diuidens sectiones in $\Xi$, $O$ secet, sectionesque contingentes ab $\Xi$, $O$ ducantur $\Xi\Pi$, $OP$. erit




igitur [II, 5; Eucl. VI, 4] $A\Pi^2 : \Pi\Xi^2 = AP^2 : PO^2$; quare [III, 19]

$\Delta N \times N\Gamma : EN \times NZ = BN \times N\Gamma : EN \times NZ.$

ergo $\Delta N \times N\Gamma = BN \times N\Gamma$ [Eucl. V, 9]; quod fieri non potest.

## L.


Si hyperbola alteram oppositarum in uno puncto contingit[1]), sectio ei opposita cum altera oppositarum in pluribus punctis non concurret quam in duobus.

sint oppositae $AB$, $E\Delta H$, et hyperbola $A\Gamma$ sectionem $AB$ in $A$ contingat, sitque sectioni $A\Gamma$ op-

1) Sc. ad easdem partes concaua habens; cf. prop. LIV.

ρον παράλληλοι αἱ $AK$, $\Delta E$· καὶ τετμήσθω ἡ $\Delta E$ δίχα κατὰ τὸ $\Lambda$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $A\Lambda$. ἔσται δὴ διάμετρος ἡ $A\Lambda$ τῶν δύο συζυγῶν καὶ τέμνει τὰς τομὰς μεταξὺ τῶν $\Delta$, $E$ κατὰ τὰ $M$, $N$ [ὥστε ἡ $\Delta\Lambda E$ δίχα τέτμηται κατὰ τὸ $\Lambda$]. ἤχθω ἀπὸ τοῦ $\Theta$ παρὰ τὴν $\Delta E$ ἡ $\Theta Z H$· ἔσται δὴ ἐν μὲν τῇ ἑτέρᾳ τομῇ ἴση ἡ $\Theta\Xi$ τῇ $\Xi Z$, ἐν δὲ τῇ ἑτέρᾳ ἴση ἡ $\Theta\Xi$ τῇ $\Xi H$. ὥστε καὶ ἡ $\Xi Z$ τῇ $\Xi H$ ἐστιν ἴση· ὅπερ ἀδύνατον.

μὴ ἔστωσαν δὴ αἱ $AK$, $\Delta E$ παράλληλοι, ἀλλὰ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ $K$, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ αὐτὰ γεγονέτω, καὶ ἐκβληθεῖσα ἡ $AK$ συμπιπτέτω τῇ $Z\Theta$ κατὰ τὸ $P$. ὁμοίως δὴ δείξομεν τοῖς πρότερον, ὅτι ἐστίν, ὡς τὸ ὑπὸ $\Delta K E$ πρὸς τὸ ἀπὸ $AK$, ἐν μὲν τῇ $Z\Delta E$ τομῇ τὸ ὑπὸ $ZP\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $PA$, ἐν δὲ





τῇ $H\Delta E$ τὸ ὑπὸ $HP\Theta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $PA$. τὸ ἄρα ὑπὸ $HP\Theta$ ἴσον τῷ ὑπὸ $ZP\Theta$· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἡ $E\Delta Z$ τῇ $E\Delta H$ κατὰ πλείονα σημεῖα συμβάλλει ἢ δύο.

4. ὥστε] ἐπεί Halley praeeunte Commandino; ego ὥστε — $\Lambda$ lin. 5 deleuerim. 6. $\Theta Z H$] p, $\Theta H Z$ V. 7. ἐν — τῇ $\Xi H$] p, om. V. 21. $Z\Delta E$] $\Xi\Delta E$ V, $Z\Delta E\Theta$ p; corr. Memus. 25. ἀπό] p, om. V. 27. $E\Delta Z$] p, $\Delta E Z$ V. $E\Delta H$] p, $\Delta E H$ V.

posita $E\Delta Z$. dico, $E\Delta Z$ cum $E\Delta H$ in pluribus punctis non concurrere quam in duobus.

nam si fieri potest, in tribus concurrat $\Delta$, $E$, $\Theta$, ducaturque sectiones $AB$, $A\Gamma$ contingens $AK$, et ducta $\Delta E$ producatur[1]), prius autem parallelae sint $AK$, $\Delta E$; et $\Delta E$ in $\Lambda$ in duas partes aequales secetur, ducaturque $A\Lambda$. $A\Lambda$ igitur diametrus erit sectionum coniugatarum [II, 34] sectionesque inter $\Delta$, $E$ in $M$, $N$ secat. a $\Theta$ rectae $\Delta E$ parallela ducatur $\Theta ZH$; itaque erit [I def. 4] in altera sectione $\Theta\Xi = \Xi Z$, in altera autem $\Theta\Xi = \Xi H$. quare etiam $\Xi Z = \Xi H$; quod fieri non potest.




$AK$, $\Delta E$ igitur parallelae ne sint, sed in $K$ concurrant, et reliqua eadem comparentur, productaque $AK$ cum $Z\Theta$ in $P$ concurrat. eodem igitur modo, quo antea, demonstrabimus, esse [III, 19; Eucl. V, 16] in sectione $Z\Delta E$ $\Delta K \times KE : AK^2 = ZP \times P\Theta : PA^2$, in $H\Delta E$ autem $\Delta K \times KE : AK^2 = HP \times P\Theta : PA^2$. itaque $HP \times P\Theta = ZP \times P\Theta$ [Eucl. V, 9]; quod fieri non potest. ergo $E\Delta Z$ cum $E\Delta H$ in pluribus punctis non concurrit quam in duobus.

---

1) Hoc addidit propter secundam figuram.

να'.

Ἐὰν ὑπερβολὴ ἑκατέρας τῶν ἀντικειμένων ἐφάπτηται, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ οὐδεμιᾷ τῶν ἀντικειμένων συμπεσεῖται.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ $A$, $B$, καὶ ὑπερβολὴ ἡ $AB$ ἑκατέρας αὐτῶν ἐφαπτέσθω κατὰ τὰ $A$, $B$, ἀντικειμένη δὲ αὐτῆς ἔστω ἡ $E$. λέγω, ὅτι ἡ $E$ οὐδετέρᾳ τῶν $A$, $B$ συμπεσεῖται.

εἰ γὰρ δυνατόν, συμπιπτέτω τῇ $A$ κατὰ τὸ $\Delta$, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν $A$, $B$ ἐφαπτόμεναι τῶν τομῶν· συμπεσοῦνται δὴ ἀλλήλαις ἐντὸς τῶν ἀσυμπτώτων τῆς $AB$ τομῆς. συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ $\Gamma$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $\Gamma\Delta$· ἡ ἄρα $\Gamma\Delta$ ἐν τῷ μεταξὺ τόπῳ ἔσται τῶν $A\Gamma$, $\Gamma B$. ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν $B\Gamma$, $\Gamma Z$· ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἡ $E$ συμπεσεῖται ταῖς $A$, $B$.

νβ'.

Ἐὰν ἑκατέρα τῶν ἀντικειμένων ἑκατέρας τῶν ἀντικειμένων καθ' ἓν ἐφάπτηται ἐπὶ τὰ αὐτὰ τὰ κοῖλα ἔχουσα, οὐ συμπεσεῖται καθ' ἕτερον σημεῖον.

ἐφαπτέσθωσαν γὰρ ἀλλήλων ἀντικείμεναι κατὰ τὰ $A$, $\Delta$ σημεῖα. λέγω, ὅτι καθ' ἕτερον σημεῖον οὐ συμβάλλουσιν.


εἰ γὰρ δυνατόν, συμβαλλέτωσαν κατὰ τὸ $E$. ἐπεὶ οὖν ὑπερβολὴ μιᾶς τῶν ἀντικειμένων ἐφαπτομένη κατὰ τὸ $\Delta$ συμπέπτωκε κατὰ τὸ $E$, ἡ ἄρα $AB$ τῇ $A\Gamma$ οὐ συμβάλλει κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ ἕν. ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν $A$, $\Delta$ τῶν τομῶν ἐφαπτόμεναι αἱ $A\Theta$,

17. ἑκατέρας τῶν ἀντικειμένων] p, om. V.

## LI.

Si hyperbola utramque oppositam contingit, sectio ei opposita cum neutra oppositarum concurret.

sint oppositae $A$, $B$, et hyperbola $AB$ in $A$, $B$ utramque contingat, ei autem opposita sit $E$. dico, $E$ cum neutra sectionum $A$, $B$ concurrere.




nam si fieri potest, cum $A$ in $\Delta$ concurrat, et ab $A$, $B$ rectae ducantur sectiones contingentes; eae igitur intra asymptotas sectionis $AB$ inter se concurrent [II,25]. concurrant in $\Gamma$, ducaturque $\Gamma\Delta$; $\Gamma\Delta$ igitur in spatio inter $A\Gamma$, $\Gamma B$ posito erit. uerum eadem inter $B\Gamma$, $\Gamma Z$[1]) cadet; quod absurdum est. ergo $E$ cum $A$, $B$ non concurret.

## LII.

Si utraque opposita utramque oppositam in singulis punctis contingit ad easdem partes concaua habens, in alio puncto non concurret.

nam oppositae in punctis $A$, $\Delta$ inter se concurrant. dico, eas in nullo alio puncto concurrere.

nam si fieri potest, concurrant in $E$. quoniam igitur hyperbola alteram oppositarum in $\Delta$ contingens cum ea in $E$ concurrit, $AB$ cum $A\Gamma$ in pluribus punctis non concurrit quam in uno [prop. XLIX]. ab

1) Quia ex II, 33 recta $\Gamma B$ cum sectione $A\Delta$ non concurrit, h. e. extra $\Delta\Gamma$, quae cum $A\Delta$ concurrit, cadit.


*ΘΔ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΔ, καὶ διὰ τοῦ Ε παρὰ τὴν ΑΔ ἤχθω ἡ ΕΒΓ, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ δευτέρα διάμετρος ἤχθω τῶν ἀντικειμένων ἡ ΘΚΛ· τεμεῖ δὴ τὴν ΑΔ δίχα κατὰ τὸ Κ. καὶ ἑκατέρα ἄρα τῶν ΕΒ, ΕΓ δίχα τέτμηται κατὰ τὸ Λ. ἴση ἄρα ἡ ΒΛ τῇ ΛΓ· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα συμπεσοῦνται κατ' ἄλλο σημεῖον.*

*νγ'.*

*Ἐὰν ὑπερβολὴ μιᾶς τῶν ἀντικειμένων κατὰ δύο σημεῖα ἐφάπτηται, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀντικειμένων οὐ συμπεσεῖται.*


*ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ ΑΔΒ, Ε, καὶ ὑπερβολὴ ἡ ΑΓ τῆς ΑΔΒ ἐφαπτέσθω κατὰ δύο σημεῖα τὰ Α, Β, καὶ ἔστω ἀντικειμένη τῆς ΑΓ ἡ Ζ. λέγω, ὅτι ἡ Ζ τῇ Ε οὐ συμπεσεῖται.*

*εἰ γὰρ δυνατόν, συμπιπτέτω κατὰ τὸ Ε, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν Α, Β ἐφαπτόμεναι τῶν τομῶν αἱ ΑΗ, ΗΒ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΒ καὶ ἡ ΕΗ καὶ ἐκβεβλήσθω· τεμεῖ δὴ κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον τὰς τομάς. ἔστω δὴ ὡς ἡ ΕΗΓΔΘ. ἐπεὶ οὖν ἐφάπτονται*




*αἱ ΑΗ, ΗΒ, καὶ ἡ ΑΒ τὰς ἁφὰς ἐπέζευξεν, ἔσται ἐν μὲν τῇ ἑτέρᾳ συζυγίᾳ, ὡς ἡ ΘΕ πρὸς ΕΗ, ἡ ΘΔ πρὸς ΔΗ, ἐν δὲ τῇ ἑτέρᾳ ἡ ΘΓ πρὸς ΓΗ· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἡ Ζ τῇ Ε συμβάλλει.*

$A$, $\Delta$ sectiones contingentes ducantur $A\Theta$, $\Theta\Delta$, ducaturque $A\Delta$, et per $E$ rectae $A\Delta$ parallela ducatur $EB\Gamma$, a $\Theta$ autem secunda diametrus oppositarum ducatur $\Theta K\Lambda$[1]; ea igitur in $K$ rectam $A\Delta$ in duas partes aequales secabit [II, 39]. itaque etiam utraque $EB$, $E\Gamma$ in $\Lambda$ in binas partes aequales secta est [I def. 4]. quare $B\Lambda = \Lambda\Gamma$; quod fieri non potest. ergo in alio puncto non concurrent.




## LIII.

Si hyperbola alteram oppositarum in duobus punctis contingit, sectio ei opposita cum altera oppositarum non concurret.

sint oppositae $A\Delta B$, $E$, et hyperbola $A\Gamma$ sectionem $A\Delta B$ in duobus punctis $A$, $B$ contingat, sitque sectioni $A\Gamma$ opposita $Z$. dico, $Z$ cum $E$ non concurrere.

nam si fieri potest, in $E$ concurrat, et ab $A$, $B$ sectiones contingentes ducantur $AH$, $HB$, et ducatur $AB$ et $EH$, quae producatur; sectiones igitur in alio atque alio puncto secabit. uelut sit $EH\Gamma\Delta\Theta$. quoniam igitur $AH$, $HB$ contingunt, et $AB$ puncta contactus coniungit, in alteris sectionibus coniugatis erit $\Theta E : EH = \Theta\Delta : \Delta H$, in alteris autem

$$\Theta E : EH = \Theta\Gamma : \Gamma H$$

1) Aut cum Comm. $\Theta\Lambda K$ scribendum aut figura cum Halleio mutanda (in fig. codicis $\Gamma$, $B$ permutatae sunt). sed omnino haec demonstratio minus recte expressa est.

νδ'.


Ἐὰν ὑπερβολὴ μιᾶς τῶν ἀντικειμένων ἐπιψαύῃ ἀντεστραμμένα τὰ κυρτὰ ἔχουσα, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀντικειμένων οὐ συμπεσεῖται.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ Α, Β, καὶ τῆς Α τομῆς ἐφαπτέσθω ὑπερβολή τις ἡ ΑΔ κατὰ τὸ Α, ἀντικειμένη δὲ τῆς ΑΔ ἔστω ἡ Ζ. λέγω, ὅτι ἡ Ζ τῇ Β οὐ συμπεσεῖται.

ἤχθω ἀπὸ τοῦ Α ἐφαπτομένη τῶν τομῶν ἡ ΑΓ· ἡ ἄρα ΑΓ διὰ μὲν τὴν ΑΔ οὐ συμπεσεῖται τῇ Ζ, διὰ δὲ τὴν Α οὐ συμπεσεῖται τῇ Β. ὥστε ἡ ΑΓ μεταξὺ πεσεῖται τῶν Β, Ζ τομῶν. καὶ φανερόν, ὅτι ἡ Β τῇ Ζ οὐ συμπεσεῖται.

νε'.

Ἀντικείμεναι ἀντικειμένας οὐ τέμνουσι κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ τέσσαρα.





ἔστωσαν γὰρ ἀντικείμεναι αἱ ΑΒ, ΓΔ καὶ ἕτεραι ἀντικείμεναι αἱ ΑΒΓΔ, ΕΖ, καὶ τεμνέτω πρότερον ἡ ΑΒΓΔ τομὴ ἑκατέραν τῶν ΑΒ, ΓΔ κατὰ τέσσαρα σημεῖα τὰ Α, Β, Γ, Δ ἀντεστραμμένα τὰ κυρτὰ ἔχουσα, ὡς ἐπὶ τῆς πρώτης καταγραφῆς. ἡ ἄρα ἀντικειμένη τῇ ΑΒΓΔ, τουτέστιν ἡ ΕΖ, οὐδεμιᾷ τῶν ΑΒ, ΓΔ συμπεσεῖται.

13. τῇ Ζ] cvp, τῇ ιξ V, ut saepius. 16. τέσσαρα] p, δ V. 19. ΑΒΔΓ p. 21. ΑΒΔΓ p. 23. Γ, Δ] Δ, Γ p. 26. ΑΒΔΓ p.

[III, 39; Eucl. V, 16]; quod fieri non potest. ergo $Z$ cum $E$ non concurrit.

## LIV.

Si hyperbola alteram oppositarum contingit partem conuexam aduersam habens, sectio ei opposita cum altera oppositarum non concurret.




sint oppositae $A, B$, et sectionem $A$ contingat hyperbola $A\Delta$ in $A$, sectioni autem $A\Delta$ opposita sit $Z$. dico, $Z$ cum $B$ non concurrere.

ab $A$ sectiones contingens ducatur $A\Gamma$; $A\Gamma$ igitur propter $A\Delta$ cum $Z$ non concurret, propter $A$ autem cum $B$ non concurret [II, 33]. ergo $A\Gamma$ inter sectiones $B, Z$ cadet; et manifestum est, $B$ cum $Z$ non concurrere.

## LV.

Oppositae oppositas in pluribus punctis quam in quattuor non secant.


sint enim oppositae $AB$, $\Gamma\Delta$ et aliae oppositae $AB\Gamma\Delta$[1]), $EZ$, et prius sectio $AB\Gamma\Delta$ utramque $AB, \Gamma\Delta$ in quattuor punctis secet $A, B, \Gamma, \Delta$ partem conuexam habens aduersam, ut in prima figura. ergo sectio sectioni $AB\Gamma\Delta$ opposita, hoc est $EZ$, cum neutra sectionum $AB$, $\Gamma\Delta$ concurret [prop. XLIII].

---

1) In figura codicis V et hic et infra $\Gamma$, $\Delta$ permutatae sunt. unde scriptura codicis p orta est. sed praestat figuram cum Memo mutare.

ἀλλὰ δὴ ἡ *ΑΒΓΔ* τὴν μὲν *ΑΒ* τεμνέτω κατὰ τὰ *Α*, *Β*, τὴν δὲ *Γ* καθ' ἓν τὸ *Γ*, ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς δευτέρας καταγραφῆς· ἡ *ΕΖ* ἄρα τῇ *Γ* οὐ συμπεσεῖται. εἰ δὲ τῇ *ΑΒ* συμβάλλει ἡ *ΕΖ*, καθ' ἓν μόνον συμβάλλει· εἰ γὰρ κατὰ δύο συμβάλλει τῇ *ΑΒ*, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ ἡ *ΑΒΓ* τῇ ἑτέρᾳ ἀντικειμένῃ τῇ *Γ* οὐ συμπεσεῖται· ὑπόκειται δὲ καθ' ἓν τὸ *Γ* συμβάλλουσα.

εἰ δέ, ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς τρίτης καταγραφῆς, ἡ *ΑΒΓ* τὴν μὲν *ΑΒΕ* τέμνει κατὰ δύο τὰ *Α*, *Β*, τῇ δὲ *ΑΒΕ* συμβάλλει ἡ *ΕΖ*, τῇ μὲν *Δ* οὐ συμπεσεῖται, τῇ δὲ *ΑΒΕ* συμπίπτουσα οὐ συμπεσεῖται κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο.





εἰ δέ, ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς τετάρτης καταγραφῆς, ἡ *ΑΒΓΔ* ἑκατέραν τέμνει καθ' ἓν σημεῖον, ἡ *ΕΖ* οὐδετέρᾳ συμπεσεῖται κατὰ δύο σημεῖα. ὥστε διὰ τὰ εἰρημένα καὶ τὰ ἀντίστροφα αὐτῶν αἱ *ΑΒΓΔ*, *ΓΖ* ἀντικειμέναις ταῖς *ΒΕ*, *ΕΖ* τομαῖς οὐ συμπεσοῦνται κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ τέσσαρα.

ἐὰν δὲ αἱ τομαὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τὰ κοῖλα ἔχωσι, καὶ ἡ ἑτέρα τὴν ἑτέραν τέμνῃ κατὰ τέσσαρα τὰ *Α*, *Β*, *Γ*, *Δ*, ὡς ἐπὶ τῆς πέμπτης καταγραφῆς, ἡ *ΕΖ* τῇ ἑτέρᾳ


---

1. *ΑΒΓΔ*] *ΑΒΔ* p, *ΑΒΓ* Halley cum Comm. 2. *Γ*] scripsi, *ΓΔ* Vp. *Γ*] *Δ* p. 3. *Γ*] *ΓΔ* p. 6. *ΑΒΓ*] vc, *Β* e corr. m. 1 V; *ΑΒΔ* p. *Γ*] *ΓΔ* p. 7. *Γ*] *Δ* p. 8. *ΑΒΔ* p. 9. δέ] p, om. V. 11. *Δ*] *ΓΔ* p. 18. *ΑΒΔΓ* p. 20. τά] om. Vp, corr. Halley. *ΑΒΔ*, *ΓΔΖ* p; *ΑΒΓΔ*, *ΕΖ* Halley cum Comm. 21. ἀντικείμεναι Halley. *ΕΖ*] *ΓΖ* Halley cum Comm. 22. τέσσαρα] p, δ̄ V.

iam uero $AB\Gamma\Delta$ sectionem $AB$ in $A$, $B$ secet, sectionem autem $\Gamma$ in uno $\Gamma$, ut in secunda figura est; itaque $EZ$ cum $\Gamma$ non concurret [prop. XLI]. sin $EZ$ cum $AB$ concurrit, in uno puncto solo concurrit. si enim in duobus cum $AB$ concurrit, sectio ei opposita $AB\Gamma$ cum altera opposita $\Gamma$ non concurret [prop. XLIII]; supposuimus autem, eam in uno puncto $\Gamma$ concurrere.





sin, ut est in figura tertia, $AB\Gamma$ sectionem $ABE$ in duobus punctis $A$, $B$ secat, $EZ$ autem cum $ABE$ concurrit, cum $\Delta$ non concurret [prop. XLI], et cum $ABE$ concurrens in pluribus punctis quam in duobus non concurret [prop. XXXVII]. sin, ut est in figura quarta, $AB\Gamma\Delta$ utramque in uno puncto secat, $EZ$ cum neutra in duobus punctis concurret [prop. XLII]. ergo propter ea, quae diximus, et conuersa sectiones $AB\Gamma\Delta$, $\Gamma Z$ cum sectionibus iis oppositis $BE$, $EZ$ in pluribus punctis non concurrent quam in quattuor.[1]




1) Uerba ὥστε lin. 19 — τέσσαρα lin. 22 inutilia sunt et suspecta; nam ordo litterarum parum rectus est, nec ἀντίστροφα propositionum hic locum habent.

οὐ συμπεσεῖται. οὐδὲ μὴν ἡ $EZ$ οὐ συμπεσεῖται τῇ $AB$· πάλιν γὰρ ἔσται ἡ $AB$ ταῖς $AB\Gamma\Delta$, $EZ$ ἀντικειμέναις συμπίπτουσα κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ τέσσαρα [ἀλλ' οὐδὲ ἡ $\Gamma\Delta$ τῇ $EZ$ συμπέσειται].

εἰ δέ, ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς ἕκτης καταγραφῆς, ἡ $AB\Gamma\Delta$ τῇ ἑτέρᾳ τομῇ συμβάλλει κατὰ τρία σημεῖα, ἡ $EZ$ τῇ ἑτέρᾳ καθ' ἓν μόνον συμπεσεῖται.




καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν τὰ αὐτὰ τοῖς προτέροις ἐροῦμεν.

ἐπεὶ οὖν κατὰ πάσας τὰς ἐνδεχομένας διαστολὰς δῆλόν ἐστι τὸ προτεθέν, ἀντικείμεναι ἀντικειμέναις οὐ συμβάλλουσι κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ τέσσαρα.

νϛ'.


Ἐὰν ἀντικείμεναι ἀντικειμένων καθ' ἓν σημεῖον ἐπιψαύωσιν, οὐ συμπεσοῦνται καὶ κατ' ἄλλα σημεῖα πλείονα ἢ δύο.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ $AB$, $B\Gamma$ καὶ ἕτεραι αἱ $\Delta$, $EZ$, καὶ ἡ $B\Gamma\Delta$ τῆς $AB$ ἐφαπτέσθω κατὰ τὸ $B$, καὶ ἐχέτωσαν ἀντεστραμμένα τὰ κυρτά, καὶ συμπιπτέτω πρῶτον ἡ $B\Gamma\Delta$ τῇ $\Gamma\Delta$ κατὰ δύο σημεῖα τὰ $\Gamma$, $\Delta$, ὡς ἐπὶ τοῦ πρώτου σχήματος.

---

1. οὐ (alt.)] om. p. 4. $\Gamma\Delta$] $H\Theta$ Halley, ne eaedem litterae bis ponantur, sed potius ἀλλ' — συμπεσεῖται delenda et in fig. litterae $\Gamma$, $\Delta$ in opposita. 20. ἐπιψαύωσιν] p, ἐπιψαύουσιν V, et c, sed corr. m. 1. 22. $B\Gamma$] $\Gamma\Delta$ Halley cum Comm. 23. $\Delta$] $B\Gamma$ Halley praeeunte Comm. $EZ$] cvp, Z e corr. m. 1 V.

sin sectiones ad easdem partes concaua habent, et altera alteram in quattuor punctis *Α, Β, Γ, Δ* secat,




ut in quinta figura, *ΕΖ* cum altera non concurret [prop. XLIV]. iam uero cum *ΑΒ* non concurret *ΕΖ*; ita enim rursus *ΑΒ* cum oppositis *ΑΒΓΔ, ΕΖ* in pluribus punctis concurret quam in quattuor [prop. XXXVIII].

sin, ut est in figura sexta, *ΑΒΓΔ* cum altera sectione in tribus punctis concurrit, *ΕΖ* cum altera in uno solo concurret [prop. XLVI].

et in reliquis[1]) eadem, quae supra, dicemus.

quoniam igitur in omnibus, quae excogitari possunt, distributionibus adparet propositum, oppositae cum oppositis in pluribus punctis non concurrunt quam in quattuor.


## LVI.

Si oppositae oppositas in uno puncto contingunt, in aliis quoque punctis non concurrent pluribus quam duobus.

sint oppositae *ΑΒ, ΒΓ* et alterae *Δ, ΕΖ*, et *ΒΓΔ* sectionem *ΑΒ* in *Β* contingat, habeant autem partem conuexam aduersam; et primum *ΒΓΔ* cum *ΓΔ* in duobus punctis concurrat *Γ, Δ*, ut in figura prima.

1) Adsunt praeterea in V duae figurae, sed falsae; significat Apollonius duos illos casus, ubi *ΑΒΓΔ* alteram in duobus, alteram in uno puncto tangit [prop. XLV], et ubi in uno puncto concurrit.


ἐπεὶ οὖν ἡ $B\Gamma\Delta$ κατὰ δύο τέμνει ἀντεστραμμένα ἔχουσα τὰ κυρτά, ἡ $EZ$ τῇ $AB$ οὐ συμπεσεῖται. πάλιν ἐπεὶ ἡ $B\Gamma\Delta$ τῆς $AB$ ἐφάπτεται κατὰ τὸ $B$ ἀντεστραμμένα ἔχουσα τὰ κυρτά, ἡ $EZ$ τῇ $\Gamma\Delta$ οὐ συμπεσεῖται. ἡ ἄρα $EZ$ οὐδετέρᾳ τῶν $AB$, $\Gamma\Delta$ τομῶν συμπεσεῖται· κατὰ δύο μόνον ἄρα τὰ $\Gamma$, $\Delta$ συμβάλλουσιν.




ἀλλὰ δὴ τὴν $\Gamma\Delta$ ἡ $B\Gamma$ τεμνέτω καθ' ἓν σημεῖον τὸ $\Gamma$, ὡς ἐπὶ τοῦ δευτέρου σχήματος. ἡ ἄρα $EZ$ τῇ μὲν $\Gamma\Delta$ οὐ συμπεσεῖται, τῇ δὲ $AB$ συμπεσεῖται καθ' ἓν μόνον. εἰ γὰρ κατὰ δύο συμβάλλει η $EZ$ τῇ $AB$, η $B\Gamma$ τῇ $\Gamma\Delta$ οὐ συμπεσεῖται· ὑπόκειται δὲ συμβάλλουσα καθ' ἕν.

εἰ δὲ ἡ $B\Gamma$ τῇ $\Delta$ τομῇ μὴ συμπίπτῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ τρίτου σχήματος, διὰ μὲν τὰ προειρημένα ἡ $EZ$ τῇ $\Delta$ οὐ συμπεσεῖται, ἡ δὲ $EZ$ τῇ $AB$ οὐ συμπεσεῖται κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο.




ἐὰν δὲ αἱ τομαὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τὰ κοῖλα ἔχωσιν, αἱ αὐταὶ ἀποδείξεις ἁρμόσουσι.


κατὰ πάσας οὖν τὰς ἐνδεχομένας διαστολὰς δῆλόν ἐστιν ἐκ τῶν δεδειγμένων τὸ προτεθέν.

---


7. δύο] p, τὸ $\bar{\beta}$ V. 13. $B\Gamma$] $B\Gamma\Delta$ Vp, corr. Comm. 17. $\Delta$] $\Gamma\Delta$ Vp, corr. Comm.

quoniam igitur $B\Gamma\Delta$ in duobus punctis secat partem conuexam habens aduersam, $EZ$ cum $AB$ non concurret [prop. XLI]. rursus quoniam $B\Gamma\Delta$ sectionem $AB$ in $B$ contingit partem conuexam habens aduersam, $EZ$ cum $\Gamma\Delta$ non concurret [prop. LIV]. $EZ$ igitur cum neutra sectionum $AB$, $\Gamma\Delta$ concurret; ergo in duobus[1]) solis $\Gamma$, $\Delta$ concurrunt.

iam uero $B\Gamma$ sectionem $\Gamma\Delta$ in uno puncto $\Gamma$ secet, ut in secunda figura. itaque $EZ$ cum $\Gamma\Delta$ non concurret [prop. LIV], cum $AB$ autem in uno solo concurret. nam si $EZ$ cum $AB$ in duobus concurrit, $B\Gamma$ cum $\Gamma\Delta$ non concurret [prop. XLI]; supposuimus autem, eam in uno concurrere.




sin $B\Gamma$ cum sectione $\Delta$ non concurrit, ut in tertia figura, propter ea, quae antea diximus, $EZ$ cum $\Delta$ non concurret [prop. LIV], cum $AB$ autem non concurret $EZ$ in pluribus punctis quam in duobus [prop. XXXVII].




sin sectiones concaua ad easdem partes posita habent, eaedem demonstrationes conuenient [u. propp. XLVIII, XLIX, L].

1) Neque enim $B\Gamma\Delta$ cum $\Gamma\Delta$ in tribus punctis concurrit (prop. XXXVII).

νζ'.


Ἐὰν ἀντικείμεναι ἀντικειμένων κατὰ δύο ἐπιψαύωσι, καθ' ἕτερον σημεῖον οὐ συμπεσοῦνται.

ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ $AB$, $\Gamma\Delta$ καὶ ἕτεραι αἱ $A\Gamma$, $EZ$ καὶ ἐφαπτέσθωσαν πρῶτον, ὡς ἐπὶ τοῦ πρώτου σχήματος, κατὰ τὰ $A$, $\Gamma$.

ἐπεὶ οὖν ἡ $A\Gamma$ ἑκατέρας τῶν $AB$, $\Gamma\Delta$ ἐφάπτεται κατὰ τὰ $A$, $\Gamma$ σημεῖα, ἡ $EZ$ ἄρα οὐδετέρᾳ τῶν $AB$, $\Gamma\Delta$ συμπεσεῖται.

ἐφαπτέσθωσαν δή, ὡς ἐπὶ τοῦ δευτέρου. ὁμοίως δὴ δειχθήσεται, ὅτι ἡ $\Gamma\Delta$ τῇ $EZ$ οὐ συμπεσεῖται.

ἐφαπτέσθω δή, ὡς ἐπὶ τοῦ τρίτου σχήματος, ἡ μὲν $\Gamma A$ τῆς $AB$ κατὰ τὸ $A$, ἡ δὲ $\Delta$ τῆς $EZ$ κατὰ τὸ $Z$. ἐπεὶ οὖν ἡ $A\Gamma$ τῆς $AB$ ἐφάπτεται ἀντεστραμμένα τὰ




κυρτὰ ἔχουσα, ἡ $EZ$ τῇ $AB$ οὐ συμπεσεῖται. πάλιν ἐπεὶ ἡ $Z\Delta$ τῆς $EZ$ ἐφάπτεται, ἡ $\Gamma A$ τῇ $\Delta Z$ οὐ συμπεσεῖται.

εἰ δὲ ἡ μὲν $A\Gamma$ τῆς $AB$ ἐφάπτεται κατὰ τὸ $A$, ἡ δὲ $E\Gamma$ τῆς $\Gamma\Delta$ κατὰ το $\Gamma$, καὶ ἔχουσιν ἐπὶ τὰ

9. Post $\Gamma\Delta$ del. ἐφάπτεται m. 1 V; non hab. cvp. 12. ἐφαπτέσθωσαν p. ἡ μὲν $\Gamma A$ τῆς $AB$] cp, bis V. 19. $E\Gamma$] $EZ$ Halley cum Comm., ne littera $\Gamma$ bis ponatur. $\Gamma\Delta$] $E\Delta$ Halley cum Comm. $\Gamma$] $E$ Halley cum Comm. ἔχουσιν] cp, ἔχωσιν V.


ergo in omnibus, quae excogitari possunt, distributionibus propositum ex demonstratis adparet[1]).


## LVII.

Si oppositae oppositas in duobus punctis contingunt, in alio puncto non concurrent.

sint oppositae $AB$, $\Gamma\Delta$ et alterae $A\Gamma$, $EZ$, primum autem, ut in prima figura, in $A$, $\Gamma$ contingant.

quoniam igitur $A\Gamma$ utramque $AB$, $\Gamma\Delta$ in punctis $A$, $\Gamma$ contingit, $EZ$ cum neutra sectionum $AB$, $\Gamma\Delta$ concurret [prop. LI][2]).




iam contingant, ut in figura secunda. similiter igitur demonstrabimus, $\Gamma\Delta$ cum $EZ$ non concurrere [prop. LIII][3]).

iam uero, sicut in tertia figura, $\Gamma\Delta$ sectionem $AB$ in $A$ contingat, $\Delta$ autem sectionem $EZ$ in $Z$[4]). quoniam igitur $A\Gamma$ contingit $AB$ partem conuexam habens

1) Tres figurae ultimae in V deprauatae sunt.

2) Neque uero $A\Gamma$ cum $AB$, $\Gamma\Delta$ in pluribus punctis concurrit (prop. XL).

3) Neque uero $AB$ cum sectione, quam contingit, in pluribus punctis concurret (prop. XXVII).

4) At hoc, monente Commandino, fieri non potest ob prop. LIV.

*αὐτα τὰ κοῖλα, ὡς ἐπὶ τοῦ τετάρτου σχήματος, καθ' ἕτερον οὐ συμπεσοῦνται. οὐδὲ μὴ ἡ ΕΖ τῇ ΑΒ συμπεσεῖται.*

*κατὰ πάσας οὖν τὰς ἐνδεχομένας διαστολὰς δῆλόν ἐστιν ἐκ τῶν δεδειγμένων τὸ προτεθέν.*

---

2. *μή*] V p, *μήν* Halley. In fine: *Ἀπολλωνίου κωνικῶν δ̄: — ἐκδόσεως Εὐτοκίου Ἀσκαλωνίτου* V; seq. una pagina (fol. 160ᵛ) cum figuris huius prop.; deinde: *Ἀπολλωνίου κωνικῶν δ̄.*

aduersam, $EZ$ cum $AB$ non concurret. rursus quoniam $Z\Delta$ contingit $EZ$, $\Gamma A$ cum $\Delta Z$ non concurret.

sin $A\Gamma$ sectionem $AB$ in $A$ contingit, $E\Gamma$ autem sectionem $\Gamma\Delta$ in $\Gamma$, et concaua ad easdem partes posita habent, ut in quarta figura, in nullo alio puncto concurrent [prop. LII]. neque uero $EZ$ cum $AB$ concurret [prop. XXXIX].

ergo in omnibus, quae excogitari possunt, distributionibus propositum ex demonstratis adparet.

# FRAGMENTA.

## Conica.

1. Pappus VII, 30 p. 672 sq. ed. Hultsch:

### Κωνικῶν $\bar{\eta}$.

Τὰ Εὐκλείδου βιβλία $\bar{\delta}$ κωνικῶν Ἀπολλώνιος ἀναπληρώσας καὶ προσθεὶς ἕτερα $\bar{\delta}$ παρέδωκεν $\bar{\eta}$ κωνικῶν τεύχη. Ἀρισταῖος δέ, ὃς γράφει μέχρι τοῦ νῦν ἀναδιδόμενα στερεῶν τόπων τεύχη $\bar{\epsilon}$ συνεχῆ τοῖς κωνικοῖς, ἐκάλει — καὶ οἱ πρὸ Ἀπολλωνίου — τῶν τριῶν κωνικῶν γραμμῶν τὴν μὲν ὀξυγωνίου, τὴν δὲ ὀρθογωνίου, τὴν δὲ ἀμβλυγωνίου κώνου τομήν. ἐπεὶ δ' ἐν ἑκάστῳ τῶν τριῶν τούτων κώνων διαφόρως τεμνομένων αἱ $\bar{\gamma}$ γίνονται γραμμαί, διαπορήσας, ὡς φαίνεται, Ἀπολλώνιος, τί δήποτε ἀποκληρώσαντες οἱ πρὸ αὐτοῦ ἣν μὲν ἐκάλουν ὀξυγωνίου κώνου τομὴν δυναμένην καὶ ὀρθογωνίου καὶ ἀμβλυγωνίου εἶναι, ἣν δὲ ὀρθογωνίου εἶναι δυναμένην ὀξυγωνίου τε καὶ ἀμβλυγωνίου, ἣν δὲ ἀμβλυγωνίου δυναμένην εἶναι ὀξυγωνίου τε καὶ ὀρθογωνίου, μεταθεὶς τὰ ὀνόματα καλεῖ τὴν μὲν ὀξυγωνίου καλουμένην ἔλλειψιν, τὴν δὲ ὀρθογωνίου παραβολήν, τὴν δὲ ἀμβλυγωνίου ὑπερβολήν, ἑκάστην δ' ἀπό τινος ἰδίου συμβεβηκότος· χωρίον γάρ τι παρά τινα γραμμὴν παραβαλλόμενον ἐν μὲν τῇ ὀξυγωνίου κώνου τομῇ ἐλλεῖπον γίνεται τετραγώνῳ, ἐν δὲ τῇ

6. γέγραφε Hultsch. μέχρι] τὰ μέχρι Hultsch cum Halleio. 8. καὶ οἱ πρὸ Ἀπολλωνίου] del. Hultsch. 21. ἀπό uel γ' ἀπό Hultsch.

ἀμβλυγωνίου ὑπερβάλλον τετραγώνῳ, ἐν δὲ τῇ ὀρθογωνίου οὔτε ἐλλεῖπον οὔθ' ὑπερβάλλον. τοῦτο δ' ἔπαθεν μὴ προσνοήσας, ὅτι κατά τινα μίαν πτῶσιν τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου τὸν κῶνον καὶ γεννῶντος τὰς τρεῖς γραμμὰς ἐν ἑκάστῳ τῶν κώνων ἄλλη καὶ ἄλλη τῶν γραμμῶν γίνεται, ἣν ὠνόμασαν ἀπὸ τῆς ἰδιότητος τοῦ κώνου. ἐὰν γὰρ τὸ τέμνον ἐπίπεδον ἀχθῇ παράλληλον μιᾷ τοῦ κώνου πλευρᾷ, γίνεται μία μόνη τῶν τριῶν γραμμῶν ἀεὶ ἡ αὐτή, ἣν ὠνόμασεν ὁ Ἀρισταῖος ἐκείνου τοῦ τμηθέντος κώνου τομήν.

Ὁ δ' οὖν Ἀπολλώνιος, οἷα περιέχει τὰ ὑπ' αὐτοῦ γραφέντα κωνικῶν η̄ βιβλία, λέγει κεφαλαιώδη θεὶς προδήλωσιν ἐν τῷ προοιμίῳ τοῦ πρώτου ταύτην· "περιέχει δὲ τὸ μὲν πρῶτον τὰς γενέσεις τῶν τριῶν τομῶν καὶ τῶν ἀντικειμένων καὶ τὰ ἐν αὐταῖς ἀρχικὰ συμπτώματα ἐπὶ πλεῖον καὶ καθόλου μᾶλλον ἐξητασμένα παρὰ τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων γεγραμμένα. τὸ δὲ δεύτερον τὰ περὶ τὰς διαμέτρους καὶ τοὺς ἄξονας τῶν τομῶν καὶ τῶν ἀντικειμένων συμβαίνοντα καὶ τὰς ἀσυμπτώτους καὶ ἄλλα γενικὴν καὶ ἀναγκαίαν χρείαν παρεχόμενα πρὸς τοὺς διορισμούς· τίνας δὲ διαμέτρους ἢ τίνας ἄξονας καλῶ, εἰδήσεις ἐκ τούτου τοῦ βιβλίου. τὸ δὲ τρίτον πολλὰ καὶ παντοῖα χρήσιμα πρός τε τὰς συνθέσεις τῶν στερεῶν τόπων καὶ τοὺς διορισμούς, ὧν τὰ πλείονα καὶ καλὰ καὶ ξένα κατανοήσαντες εὕρομεν μὴ συντιθέμενον ὑπὸ Εὐκλείδου τὸν ἐπὶ τρεῖς καὶ δ̄ γραμμὰς τόπον, ἀλλὰ μόριόν τι αὐτοῦ καὶ τοῦτο οὐκ εὐτυχῶς· οὐ γὰρ δυνατὸν ἄνευ τῶν προειρημένων

2. τοῦτο δ' ἔπαθεν — 10. τομήν] interpolatori tribuit Hultsch. 3. προσεννοήσας Hultsch. μίαν] ἰδίαν Hultsch. 4. τάς] addidi. 6. ὠνόμασεν Hultsch.

*τελειωθῆναι τὴν σύνθεσιν. τὸ δὲ δ', ποσαχῶς αἱ τῶν κώνων τομαὶ ἀλλήλαις τε καὶ τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ συμπίπτουσιν καὶ ἐκ περισσοῦ, ὧν οὐδέτερον ὑπὸ τῶν πρὸ ἡμῶν γέγραπται, κώνου τομὴ κύκλου περιφερείᾳ κατὰ πόσα σημεῖα συμβάλλει καὶ ἀντικείμεναι ἀντικειμέναις κατὰ πόσα σημεῖα συμβάλλουσιν. τὰ δὲ λοιπὰ $\overline{δ}$ περιουσιαστικώτερα· ἔστι γὰρ τὸ μὲν περὶ ἐλαχίστων καὶ μεγίστων ἐπὶ πλεῖον, τὸ δὲ περὶ ἴσων καὶ ὁμοίων τομῶν, τὸ δὲ διοριστικῶν θεωρημάτων, τὸ δὲ κωνικῶν προβλημάτων διωρισμένων".*

*Ἀπολλώνιος μὲν ταῦτα.*

2. Pappus VII, 42 p. 682, 21:

*Ἔχει δὲ τὰ $\overline{η}$ βιβλία τῶν Ἀπολλωνίου κωνικῶν θεωρήματα ἤτοι διαγράμματα $\overline{υπζ}$, λήμματα δὲ ἤτοι λαμβανόμενά ἐστιν εἰς αὐτὰ $\overline{ο}$.*

3. Pappus IV, 59 p. 270:

*Δοκεῖ δέ πως ἁμάρτημα τὸ τοιοῦτον οὐ μικρὸν εἶναι τοῖς γεωμέτραις, ὅταν ἐπίπεδον πρόβλημα διὰ τῶν κωνικῶν ἢ τῶν γραμμικῶν ὑπό τινος εὑρίσκηται, καὶ τὸ σύνολον, ὅταν ἐξ ἀνοικείου λύηται γένους, οἷόν ἐστιν τὸ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν Ἀπολλωνίου κωνικῶν ἐπὶ τῆς παραβολῆς πρόβλημα.*

4. Eutocius in Archimedem III p. 332 ed. Heiberg:

*Τὰ ὅμοια τμήματα τῶν τοῦ κώνου τομῶν Ἀπολλώνιος ὡρίσατο ἐν τῷ ἕκτῳ βιβλίῳ τῶν κωνικῶν, ἐν*

5. *κατά — συμβάλλει*] del. Hultsch. 13. $\overline{η}$] Hultsch cum Halleio, $\overline{ε}$ codd. 14. *ἤτοι* (alt.) — 15. *αὐτά*] del. Hultsch. 21. *πέμπτῳ*] *πρώτῳ* Hultsch, sed u. Tannery Mémoires de la société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 2e série V p. 51 sq., qui recte haec ad con. V, 62 rettulit. 25. *ἕκτῳ*] def. 7.

*οἷς ἀχθεισῶν ἐν ἑκάστῳ παραλλήλων τῇ βάσει ἴσων τὸ πλῆθος αἱ παράλληλοι καὶ αἱ βάσεις πρὸς τὰς ἀποτεμνομένας ἀπὸ τῶν διαμέτρων πρὸς ταῖς κορυφαῖς ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις εἰσὶ καὶ αἱ ἀποτεμνόμεναι πρὸς τὰς ἀποτεμνομένας.*

5. Eutocius in Archimedem III p. 332, 11:

*Καὶ ὅτι αἱ παραβολαὶ πᾶσαι ὅμοιαί εἰσιν.*

6. Eutocius in Archimedem III p. 328, 2 sq.:

*Ἐπειδὴ αἱ ΕΘ, ΖΚ παράλληλοί εἰσι καὶ ἴσαι, διάμετροι οὖσαι τῶν ἴσων τμημάτων καὶ ἐφαρμόζουσαι ἀλλήλαις, ὡς ἐν τῷ ϛ' τῶν κωνικῶν δέδεικται.*

De duabus mediis proportionalibus.

7. Pappus III, 21 p. 56:

*Οὗτοι γὰρ ὁμολογοῦντες στερεὸν εἶναι τὸ πρόβλημα τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ μόνον ὀργανικῶς πεποίηνται συμφώνως Ἀπολλωνίῳ τῷ Περγαίῳ, ὃς καὶ τὴν ἀνάλυσιν αὐτοῦ πεποίηται διὰ τῶν τοῦ κώνου τομῶν.*

8. Eutocius in Archimedem III p. 76 sq.:


*Ὡς Ἀπολλώνιος.*

*Ἔστωσαν αἱ δοθεῖσαι δύο εὐθεῖαι, ὧν δεῖ δύο μέσας ἀνάλογον εὑρεῖν, αἱ ΒΑΓ ὀρθὴν περιέχουσαι γωνίαν τὴν πρὸς τῷ Α. καὶ κέντρῳ μὲν τῷ Β, διαστήματι δὲ τῷ ΑΓ κύκλου περιφέρεια γεγράφθω ἡ ΚΘΛ. καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ Γ καὶ διαστήματι τῷ ΑΒ κύκλου περιφέρεια γεγράφθω ἡ ΜΘΝ καὶ τεμ-*

---

6. Fragm. 5 continuatio est praecedentis et ideo et ipsum ad Apollonium referendum; est VI, 11. 11. ϛ'] cfr. VI, 19. 12. Cfr. Conic. V, 52 p. 37, 8 ed. Halley. 16. *συμφώνως κτλ.* interpolatori tribuit Hultsch.

*νέτω τὴν ΚΘΛ κατὰ τὸ Θ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΘΑ, ΘΒ, ΘΓ. παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶν τὸ ΒΓ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἡ ΘΑ. τετμήσθω δίχα ἡ ΘΑ τῷ Ξ, καὶ κέντρῳ τῷ Ξ γεγράφθω κύκλος τέμνων τὰς ΑΒ, ΑΓ ἐκβληθείσας κατὰ τὰ Δ, Ε, ὥστε μέντοι τὰ Δ, Ε ἐπ' εὐθείας εἶναι τῷ Θ· ὅπερ ἂν*




*γένοιτο κανονίου κινουμένου περὶ τὸ Θ τέμνοντος τὰς ΑΔ, ΑΕ καὶ παραγομένου ἐπὶ τοσοῦτον, ἄχρις ἂν αἱ ἀπὸ τοῦ Ξ ἐπὶ τὰ Δ, Ε ἴσαι γένωνται.*

9. Ioannes Philoponus in Analyt. post. I p. 24 ed. Ald. 1534:

*Τοῦ μέντοι Ἀπολλωνίου τοῦ Περγαίου ἐστὶν εἰς τοῦτο ἀπόδειξις, ὡς Παρμενίων φησίν, ἣν καὶ ἐκθήσομεν ἔχουσαν οὕτως·*


*δύο δοθεισῶν εὐθειῶν ἀνίσων δύο μέσας ἀναλόγους εὑρεῖν.*

*ἔστωσαν δὲ αἱ δοθεῖσαι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ ΑΒ, ΒΓ καὶ κείσθωσαν, ὥστε ὀρθὴν γωνίαν περιέχειν τὴν ὑπὸ ΑΒΓ, καὶ συμπεπληρώσθω τὸ ΒΔ παραλληλόγραμμον, καὶ διάμετρος αὐτοῦ ἤχθω ἡ ΑΓ, καὶ περὶ τὸ ΑΓΔ τρίγωνον γεγράφθω ἡμικύκλιον τὸ ΑΔΕΓ, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΒΑ καὶ ΒΓ ἐπ' εὐθείας κατὰ τὰ Ζ, Η, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΗ διὰ τοῦ Δ σημείου*

---

23. δέ] δή? 27. ἡμικύκλους ed. Ald. 29. ἐπιζεύχθω ed. Ald.

οὕτως, ὥστε τὴν ΖΔ ἴσην εἶναι τῇ ΕΗ· τοῦτο δὲ ὡς αἴτημα λαμβάνεται ἀναπόδεικτον. φανερὸν δή, ὅτι καὶ ἡ ΖΕ τῇ ΔΗ ἴση ἐστίν. ἐπεὶ οὖν κύκλου τοῦ ΑΔΓ εἴληπται σημεῖον ἐκτὸς τὸ Ζ, ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ δύο εὐθεῖαι αἱ ΖΒ, ΖΕ προσπίπτουσαι τέμνουσι τὸν κύκλον κατὰ τὰ Α, Δ σημεῖα, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΒΖ, ΖΑ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΕΖ, ΖΔ. δια τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΗ, ΗΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΔΗ, ΗΕ. ἴσον δὲ το ὑπὸ τῶν ΔΗ, ΗΕ τῷ ὑπὸ τῶν ΕΖ, ΖΔ· ἴσαι γάρ εἰσιν ἑκατέρα ἑκατέρᾳ η μὲν ΖΕ τῇ ΔΗ, ἡ δὲ ΖΔ τῇ ΕΗ· καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΖ, ΖΑ ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΒΗ, ΗΓ. ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΖΒ πρὸς τὴν ΒΗ, ἡ ΗΓ πρὸς τὴν ΖΑ. ἀλλ' ὡς ἡ ΖΒ πρὸς τὴν ΒΗ, οὕτως ἥ τε ΖΑ πρὸς τὴν ΑΔ καὶ ἡ ΔΓ πρὸς τὴν ΓΗ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων. ἴση δὲ ἡ μὲν ΔΓ τῇ ΑΒ, ἡ δὲ ΑΔ τῇ ΒΓ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΓΗ, οὕτως ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΑΔ. ἦν δὲ καί, ὡς ἡ ΖΒ πρὸς τὴν ΒΗ, τουτέστιν ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΗΓ, ἡ ΗΓ πρὸς τὴν ΖΑ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΗΓ, οὕτως ἥ τε ΗΓ πρὸς τὴν ΖΑ καὶ ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΒΓ. αἱ τέσσαρες ἄρα




---

In fig. litt. Ζ et *Η* permutat ed. Ald.

εὐθεῖαι αἱ $AB$, $H\Gamma$, $Z\Delta$, $B\Gamma$ ἐφεξῆς ἀνάλογόν εἰσι [καὶ διὰ τοῦτο ἔσται, ὡς ἡ $AB$ πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς $AB$ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς $H\Gamma$. εἰ οὖν διπλασίων ὑποτεθείη ἡ $AB$ τῆς $B\Gamma$, ἔσται καὶ ὁ ἀπὸ τῆς $AB$ κύβος διπλασίων τοῦ ἀπὸ τῆς $H\Gamma$].

## Opera analytica cetera.

10. Pappus VII, 1 p. 634, 8 sq.:

Γέγραπται δὲ (sc. ἡ ὕλη τοῦ ἀναλυομένου τόπου) ὑπὸ τριῶν ἀνδρῶν, Εὐκλείδου τε τοῦ στοιχειωτοῦ καὶ Ἀπολλωνίου τοῦ Περγαίου καὶ Ἀρισταίου τοῦ πρεσβυτέρου, κατὰ ἀνάλυσιν καὶ σύνθεσιν ἔχουσα τὴν ἔφοδον.

Enumerantur omnia:

11. Pappus VII, 3 p. 636, 18 sq.:

Τῶν δὲ προειρημένων τοῦ ἀναλυομένου βιβλίων ἡ τάξις ἐστὶν τοιαύτη· Εὐκλείδου δεδομένων βιβλίον ᾱ, Ἀπολλωνίου λόγου ἀποτομῆς β̄, χωρίου ἀποτομῆς β̄, διωρισμένης τομῆς δύο, ἐπαφῶν δύο, Εὐκλείδου πορισμάτων τρία, Ἀπολλωνίου νεύσεων δύο, τοῦ αὐτοῦ τόπων ἐπιπέδων δύο, κωνικῶν η̄.

Deinde ordine singula excerpuntur:

## De sectione rationis.

12. Pappus VII, 5 p. 640, 4 sq.:

Τῆς δ' ἀποτομῆς τοῦ λόγου βιβλίων ὄντων β̄ πρότασίς ἐστιν μία ὑποδιῃρημένη, διὸ καὶ μίαν πρότασιν οὕτως γράφω· διὰ τοῦ δοθέντος σημείου εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν τέμνουσαν ἀπὸ τῶν τῇ θέσει δοθεισῶν δύο εὐθειῶν πρὸς τοῖς ἐπ' αὐτῶν δοθεῖσι σημείοις

λόγον ἐχούσας τὸν αὐτὸν τῷ δοθέντι. τὰς δὲ γραφὰς διαφόρους γενέσθαι καὶ πλῆθος λαβεῖν συμβέβηκεν ὑποδιαιρέσεως γενομένης ἕνεκα τῆς τε πρὸς ἀλλήλας θέσεως τῶν διδομένων εὐθειῶν καὶ τῶν διαφόρων πτώσεων τοῦ διδομένου σημείου καὶ διὰ τὰς ἀναλύσεις καὶ συνθέσεις αὐτῶν τε καὶ τῶν διορισμῶν. ἔχει γὰρ τὸ μὲν πρῶτον βιβλίον τῶν λόγου ἀποτομῆς τόπους $\overline{\zeta}$, πτώσεις $\overline{\kappa\delta}$, διορισμοὺς δὲ $\overline{\varepsilon}$, ὧν τρεῖς μέν εἰσιν μέγιστοι, δύο δὲ ἐλάχιστοι, καί ἐστι μέγιστος μὲν κατὰ τὴν τρίτην πτῶσιν τοῦ ε′ τόπου, ἐλάχιστος δὲ κατὰ τὴν δευτέραν τοῦ ϛ′ τόπου καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τοῦ ζ′ τόπου, μέγιστοι δὲ οἱ κατὰ τὰς τετάρτας τοῦ ϛ′ καὶ τοῦ ζ′ τόπου. τὸ δὲ δεύτερον βιβλίον λόγου ἀποτομῆς ἔχει τόπους $\overline{\iota\delta}$, πτώσεις δὲ $\overline{\xi\gamma}$, διορισμοὺς δὲ τοὺς ἐκ τοῦ πρώτου· ἀπάγεται γὰρ ὅλον εἰς τὸ πρῶτον.

*Λήμματα* δὲ ἔχει τὰ λόγου ἀποτομῆς $\overline{\kappa}$, αὐτὰ δὲ τὰ δύο βιβλία τῶν λόγου ἀποτομῆς θεωρημάτων ἐστὶν $\overline{\rho\pi\alpha}$, κατὰ δὲ Περικλέα πλειόνων ἢ τοσούτων.

## De sectione spatii.

13. Pappus VII, 7 p. 640, 26 sq.:

Τῆς δ' ἀποτομῆς τοῦ χωρίου βιβλία μέν ἐστιν δύο, πρόβλημα δὲ κἀν τούτοις ἓν ὑποδιαιρούμενον δίς, καὶ τούτων μία πρότασίς ἐστιν τὰ μὲν ἄλλα ὁμοίως ἔχουσα τῇ προτέρᾳ, μόνῳ δὲ τούτῳ διαφέρουσα τῷ δεῖν τὰς ἀποτεμνομένας δύο εὐθείας ἐν ἐκείνῃ μὲν λόγον ἐχούσας δοθέντα ποιεῖν, ἐν δὲ ταύτῃ χωρίον περιεχούσας δοθέν. ῥηθήσεται γὰρ οὕτως· διὰ τοῦ

---


4. δεδομένων Hultsch cum aliis. 5. δεδομένου Hultsch cum aliis. 6 sq. repetuntur paucis mutatis Papp. VII, 65 p. 702.

*δοθέντος σημείου εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν τέμνουσαν ἀπὸ τῶν δοθεισῶν θέσει δύο εὐθειῶν πρὸς τοῖς ἐπ' αὐτῶν δοθεῖσι σημείοις χωρίον περιεχούσας ἴσον τῷ δοθέντι. καὶ αὕτη δὲ διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας τὸ πλῆθος ἔσχηκε τῶν γραφομένων. ἔχει δὲ τὸ μὲν α' βιβλίον χωρίου ἀποτομῆς τόπους ζ̅, πτώσεις κδ̅, διορισμοὺς ζ̅, ὧν δ̅ μὲν μέγιστοι, τρεῖς δὲ ἐλάχιστοι, καί ἐστι μέγιστος μὲν κατὰ τὴν δευτέραν πτῶσιν τοῦ πρώτου τόπου καὶ ὁ κατὰ τὴν πρώτην πτῶσιν τοῦ β' τόπου καὶ ὁ κατὰ τὴν β' τοῦ δ' καὶ ὁ κατὰ τὴν τρίτην τοῦ ϛ' τόπου, ἐλάχιστος δὲ ὁ κατὰ τὴν τρίτην πτῶσιν τοῦ τρίτου τόπου καὶ ὁ κατὰ τὴν δ' τοῦ δ' τόπου καὶ ὁ κατὰ τὴν πρώτην τοῦ ἕκτου τόπου. τὸ δὲ δεύτερον βιβλίον τῶν χωρίου ἀποτομῆς ἔχει τόπους ιγ̅, πτώσεις δὲ ξ̅, διορισμοὺς δὲ τοὺς ἐκ τοῦ πρώτου· ἀπάγεται γὰρ εἰς αὐτό.*

*Θεωρήματα δὲ ἔχει τὸ μὲν πρῶτον βιβλίον μη̅, τὸ δὲ δεύτερον οϛ̅.*

14. Pappus VII, 232 p. 918, 9 sq.:

(problema hoc est: dato $B\Gamma$ a dato $E$ rectam $EZ$ ita ducere, ut fiat $Z\Gamma H = B\Gamma$)




*Δοθὲν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΖΓΗ· καὶ δοθέντος τοῦ Ε εἰς θέσει τὰς ΑΓ, ΓΔ διῆκται εἰς χωρίου ἀποτομήν· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΖ.*

15. Pappus VII, 67 p. 702, 28 sq.:

*Ἐπιστήσειεν ἄν τις, διὰ τί ποτε μὲν τὸ λόγου ἀπο-*

5 sq. repetuntur paucis mutatis Papp. VII, 66 p. 702. 8. ὁ κατά p. 702, 21. 9. β'] Halley, δ' codd. 15. ξ̅] Halley, ζ̅ codd. 24. καί] καὶ ἀπό Hultsch. 25. εἰς] ἡ ΕΖ εἰς Hultsch.

τομῆς δεύτερον ἔχει τόπους ιδ̄, τὸ δὲ τοῦ χωρίου ιγ̄. ἔχει δὲ διὰ τόδε, ὅτι ὁ ζ′ ἐν τῷ τοῦ χωρίου ἀποτομῆς τόπος παραλείπεται ὡς φανερός· ἐὰν γὰρ αἱ παράλληλοι ἀμφότεραι ἐπὶ τὰ πέρατα πίπτωσιν, οἷα ἂν διαχθῇ, δοθὲν ἀποτέμνει χωρίον· ἴσον γὰρ γίνεται τῷ ὑπὸ τῶν μεταξὺ τῶν περάτων καὶ τῆς ἀμφοτέρων τῶν ἐξ ἀρχῆς τῇ θέσει δοθεισῶν εὐθειῶν συμβολῆς. ἐν δὲ τῷ λόγου ἀποτομῆς οὐκέτι ὁμοίως. διὰ τοῦτο οὖν προέχει τόπον ἕνα εἰς τὸ ἕβδομον τοῦ δευτέρου, καὶ τὰ λοιπὰ ὄντα τὰ αὐτά.

## De sectione determinata.

16. Pappus VII, 9 p. 642, 19 sq.:


Ἑξῆς τούτοις ἀναδέδονται τῆς διωρισμένης τομῆς βιβλία β̄, ὧν ὁμοίως τοῖς πρότερον μίαν πρότασιν πάρεστιν λέγειν, διεζευγμένην δὲ ταύτην· τὴν δοθεῖσαν ἄπειρον εὐθεῖαν ἑνὶ σημείῳ τεμεῖν, ὥστε τῶν ἀπολαμβανομένων εὐθειῶν πρὸς τοῖς ἐπ᾽ αὐτῆς δοθεῖσι σημείοις ἤτοι τὸ ἀπὸ μιᾶς τετράγωνον ἢ τὸ ὑπὸ δύο ἀπολαμβανομένων περιεχόμενον ὀρθογώνιον δοθέντα λόγον ἔχειν ἤτοι πρὸς τὸ ἀπὸ μιᾶς τετράγωνον ἢ πρὸς τὸ ὑπὸ μιᾶς ἀπολαμβανομένης καὶ τῆς ἔξω δοθείσης ἢ πρὸς τὸ ὑπὸ δύο ἀπολαμβανομένων περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ἐφ᾽ ὁπότερα χρὴ τῶν δοθέντων σημείων. καὶ ταύτης ἅτε δὶς διεζευγμένης καὶ περισκελεῖς διορισμοὺς ἐχούσης διὰ πλειόνων ἡ δεῖξις γέγονεν ἐξ ἀνάγκης.

2. τοῦ] del. Hultsch. 10. αὐτά] coni. Hultsch, ὄντα codd. Deinde lacuna uidetur esse (uelut τὸ προτέρημα διατηρεῖ). 13. ἑξῆς δέ Hultsch cum al. ἀναδέδοται Hultsch. 20. τετράγωνον — 21. μιᾶς] Hultsch cum Simsono, om. codd. 23. ὁπότερ᾽ ἂν χρῇ Hultsch.

*δείκνυσι δὲ ταύτην Ἀπολλώνιος μὲν πάλιν ἐπὶ ψιλῶν τῶν εὐθειῶν τριβακώτερον πειρώμενος, καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου βιβλίου τῶν πρώτων στοιχείων Εὐκλείδου, καὶ [ταύτην] πάλιν εἰσαγωγικώτερον ἐπαναγράφων δείξαντος καὶ εὐφυῶς διὰ τῶν ἡμικυκλίων· ἔχει δὲ τὸ μὲν πρῶτον βιβλίον προβλήματα ϛ̄, ἐπιτάγματα ιϛ̄, διορισμοὺς ε̄, ὧν μεγίστους μὲν δ̄, ἐλάχιστον δὲ ἕνα· καί εἰσιν μέγιστοι μὲν ὅ τε κατὰ τὸ δεύτερον ἐπίταγμα τοῦ δευτέρου προβλήματος καὶ ὁ κατὰ τὸ γʹ τοῦ δʹ προβλήματος καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ εʹ καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ ἕκτου, ἐλάχιστος δὲ ὁ κατὰ τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος. τὸ δὲ δεύτερον διωρισμένης τομῆς ἔχει προβλήματα τρία, ἐπιτάγματα θ̄, διορισμοὺς γ̄, ὧν εἰσιν ἐλάχιστοι μὲν δύο, μέγιστος δὲ ᾱ, καί εἰσιν ἐλάχιστοι μὲν ὅ τε κατὰ τὸ τρίτον τοῦ πρώτου καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ δευτέρου, μέγιστος δὲ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ τρίτου προβλήματος.*

*Λήμματα δὲ ἔχει τὸ μὲν πρῶτον βιβλίον κζ̄, τὸ δὲ δεύτερον κδ̄, θεωρημάτων δέ ἐστιν τὰ δύο βιβλία διωρισμένης τομῆς πγ̄.*

17. Pappus VII, 142 p. 798, 11 sq.:




*Ἀπῆκται ἄρα εἰς διωρισμένης· δεδομένων τριῶν εὐθειῶν τῶν ΘΔ, ΔΚ, Λ τεμεῖν τὴν ΔΚ κατὰ τὸ Η καὶ ποιεῖν λόγον τοῦ ὑπὸ ΘΗΚ πρὸς τὸ ὑπὸ Λ, ΗΔ ἴσου πρὸς ἴσον.*

---

1. *δείκνυσι* — 5. *ἡμικυκλίων*] interpolatori tribuit Hultsch. 1. *μὲν πάλιν*] corrupta, om. Halley. 4. *ταύτην*] deleo. 5. *δείξαντος*] corruptum, *δείξας τε* Halley; fort. *δεξιῶς τε.* 6 sq. rep. Pappus VII, 119 p. 770. 11. *τοῦ ἕκτου* — 12. *τρίτον*] e VII, 119 add. Halley, om. codd. 14. *εἰσιν* — 15. *καί*] addidi e p. 770, 19 (ubi tamen *εἰσιν* om.); p. 644, 16 om. codd. 22. *διωρισμένης*] *διωρισμένην* Commandinus, *διωρισμένης αʹ* Hultsch.

Eadem propositio significatur a Pappo VII, 143 p. 802, 8: *ἐν γὰρ τῇ διωρισμένῃ δέδεικται μεῖζον* et VII, 144 p. 804, 13: *ἐν δὲ τῇ διωρισμένῃ μεῖζον ἔσται τὸ ὑπὸ ΘΗΚ τοῦ ὑπὸ ΘΤΚ.*

## De tactionibus.

18. Pappus VII, 11 p. 644, 23 sq.:

*Ἑξῆς δὲ τούτοις τῶν ἐπαφῶν ἐστιν βιβλία δύο. προτάσεις δὲ ἐν αὐτοῖς δοκοῦσιν εἶναι πλείονες, ἀλλὰ καὶ τούτων μίαν τίθεμεν οὕτως ἔχουσαν ἑξῆς· σημείων καὶ εὐθειῶν καὶ κύκλων τριῶν ὁποιωνοῦν θέσει δοθέντων κύκλον ἀγαγεῖν δι᾿ ἑκάστου τῶν δοθέντων σημείων, εἰ δοθείη, ἢ ἐφαπτόμενον ἑκάστης τῶν δοθεισῶν γραμμῶν. ταύτης διὰ πλήθη τῶν ἐν ταῖς ὑποθέσεσι δεδομένων ὁμοίων ἢ ἀνομοίων κατὰ μέρος διαφόρους προτάσεις ἀναγκαῖον γίνεσθαι δέκα· ἐκ τῶν τριῶν γὰρ ἀνομοίων γενῶν τριάδες διάφοροι ἄτακτοι γίνονται ῑ. ἤτοι γὰρ τὰ διδόμενα τρία σημεῖα ἢ τρεῖς εὐθεῖαι ἢ δύο σημεῖα καὶ εὐθεῖα ἢ δύο εὐθεῖαι καὶ σημεῖον ἢ δύο σημεῖα καὶ κύκλος ἢ δύο κύκλοι καὶ σημεῖον ἢ δύο εὐθεῖαι καὶ κύκλος ἢ δύο κύκλοι καὶ εὐθεῖα ἢ σημεῖον καὶ εὐθεῖα καὶ κύκλος ἢ τρεῖς κύκλοι. τούτων δύο μὲν τὰ πρῶτα δέδεικται ἐν τῷ δ' βιβλίῳ τῶν πρώτων στοιχείων, διὸ παρίει μὴ γράφων· τὸ μὲν γὰρ τριῶν δοθέντων σημείων μὴ ἐπ᾿ εὐθείας ὄντων τὸ αὐτό ἐστιν τῷ περὶ τὸ δοθὲν τρίγωνον κύκλον περιγράψαι, τὸ δὲ γ̄ δοθεισῶν εὐθειῶν μὴ παραλλή-*

---

9. *ἔχουσαν· ἑξῆς* Hultsch („ἑξῆς abundare videtur" adn.). 12. *ἢ*] addidi. 17. *τά*] del. Hultsch. *δεδομένα* Hultsch cum aliis. 23. *διὸ παρίει μὴ γράφων*] scripsi, *ὁπερημεν γράφων* codd., *ὃ παρεῖμεν γράφειν* Hultsch (sed necessario Apollonius, non Pappus, hos duos casus omisit).

λων οὐσῶν, ἀλλὰ τῶν τριῶν συμπιπτουσῶν, τὸ αὐτό ἐστιν τῷ εἰς τὸ δοθὲν τρίγωνον κύκλον ἐγγράψαι· τὸ δὲ δύο παραλλήλων οὐσῶν καὶ μιᾶς ἐμπιπτούσης ὡς μέρος ὂν τῆς β' ὑποδιαιρέσεως προγράφεται ἐν τούτοις πάντων. καὶ τὰ ἑξῆς ϛ̄ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ, τὰ δὲ λειπόμενα δύο, τὸ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν καὶ κύκλου ἢ τριῶν δοθέντων κύκλων μόνον ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ διὰ τὰς πρὸς ἀλλήλους θέσεις τῶν κύκλων τε καὶ εὐθειῶν πλείονας οὔσας καὶ πλειόνων διορισμῶν δεομένας.

19. Pappus VII, 12 p. 648, 14 sq.:

Ἔχει δὲ τὸ πρῶτον τῶν ἐπαφῶν προβλήματα ζ̄, τὸ δὲ δεύτερον προβλήματα δ̄. λήμματα δὲ ἔχει τὰ δύο βιβλία κᾱ, αὐτὰ δὲ θεωρημάτων ἐστὶν ξ̄.

Pappus VII, 184 p. 852, 13: τὸ πρῶτον τῶν ἐπαφῶν προβλήματα ἑπτά, τὸ δεύτερον προβλήματα δ̄.

## De inclinationibus.

20. Pappus VII, 27 p. 670, 3 sq.:

### Νεύσεων δύο.

Προβλήματος δὲ ὄντος καθολικοῦ τούτου· δύο δοθεισῶν γραμμῶν θέσει θεῖναι μεταξὺ τούτων εὐθεῖαν τῷ μεγέθει δεδομένην νεύουσαν ἐπὶ δοθὲν σημεῖον, ἐπὶ τούτου τῶν ἐπὶ μέρους διάφορα τὰ ὑποκείμενα ἐχόντων, ἃ μὲν ἦν ἐπίπεδα, ἃ δὲ στερεά, ἃ

---

3. δέ] scripsi (respondet ad μέν p. 112, 22), γάρ codd. (ab hac igitur propositione incepit liber I Apollonii). 4. ὂν τῆς] Halley, ὄντος τοῦ codd., ὂν τῆς τοῦ Hultsch cum aliis. β'] Halley, ϛ codd. 16. ἔχει προβλήματα Hultsch. 23. τούτου] Horsley, ταύτης codd. 24. ἦν] del. Hultsch.

δὲ γραμμικά, τῶν δ' ἐπιπέδων ἀποκληρώσαντες τὰ πρὸς πολλὰ χρησιμώτερα ἔδειξαν τὰ προβλήματα ταῦτα·

θέσει δεδομένων ἡμικυκλίου τε καὶ εὐθείας πρὸς ὀρθὰς τῇ βάσει ἢ δύο ἡμικυκλίων ἐπ' εὐθείας ἐχόντων τὰς βάσεις θεῖναι δοθεῖσαν τῷ μεγέθει εὐθεῖαν μεταξὺ τῶν δύο γραμμῶν νεύουσαν ἐπὶ γωνίαν ἡμικυκλίου·

καὶ ῥόμβου δοθέντος καὶ ἐπεκβεβλημένης μιᾶς πλευρᾶς ἁρμόσαι ὑπὸ τὴν ἐκτὸς γωνίαν δεδομένην τῷ μεγέθει εὐθεῖαν νεύουσαν ἐπὶ τὴν ἀντικρὺς γωνίαν·

καὶ θέσει δοθέντος κύκλου ἐναρμόσαι εὐθεῖαν μεγέθει δεδομένην νεύουσαν ἐπὶ δοθέν.

τούτων δὲ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τεύχει δέδεικται τὸ ἐπὶ τοῦ ἑνὸς ἡμικυκλίου καὶ εὐθείας ἔχον πτώσεις δ̅ καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ κύκλου ἔχον πτώσεις δύο καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ ῥόμβου πτώσεις ἔχον β̅, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τεύχει τὸ ἐπὶ τῶν δύο ἡμικυκλίων τῆς ὑποθέσεως πτώσεις ἐχούσης ι̅, ἐν δὲ ταύταις ὑποδιαιρέσεις πλείονες διοριστικαὶ ἕνεκα τοῦ δεδομένου μεγέθους τῆς εὐθείας.

21. Pappus VII, 29 p. 672, 15:

Ἔχει δὲ τὰ τῶν νεύσεων βιβλία δύο θεωρήματα μὲν ἤτοι διαγράμματα ρ̅κ̅ε̅, λήμματα δὲ λ̅η̅.

Pappus VII, 157 p. 820, 18 sq.:

Τὸ πρῶτον τῶν νεύσεων ἔχει προβλήματα θ̅, διορισμοὺς τρεῖς, καί εἰσιν οἱ τρεῖς ἐλάσσονες, ὅ τε κατὰ τὸ πέμπτον καὶ ὁ κατὰ τὸ ζ' πρόβλημα καὶ ὁ κατὰ τὸ θ'. τὸ δεύτερον νεύσεων ἔχει προβλήματα μ̅ε̅,

---

1. τῶν δ'] Halley, τῶν codd.; fort. καὶ τῶν. 22. δύο βιβλία coni. Hultsch.

*διορισμοὺς τρεῖς τόν τε κατὰ τὸ ιζ' πρόβλημα καὶ τὸν κατὰ τὸ ιθ' καὶ τὸν κατὰ τὸ κγ'· καί εἰσιν οἱ τρεῖς ἐλάσσονες.* Cfr. frag. 51.

## De locis planis.

22. Pappus VII, 21 p. 660, 17 sq.:

*Τόπων ἐπιπέδων δύο.*

*Τῶν τόπων καθόλου οἱ μέν εἰσιν ἐφεκτικοί, οὓς καὶ Ἀπολλώνιος πρὸ τῶν ἰδίων στοιχείων λέγει, σημείου μὲν τόπον σημεῖον, γραμμῆς δὲ τόπον γραμμήν, ἐπιφανείας δὲ ἐπιφάνειαν, στερεοῦ δὲ στερεόν, οἱ δὲ διεξοδικοί, ὡς σημείου μὲν γραμμή, γραμμῆς δ' ἐπιφάνεια, ἐπιφανείας δὲ στερεόν, οἱ δὲ ἀναστροφικοί, ὡς σημείου μὲν ἐπιφάνεια, γραμμῆς δὲ στερεόν.*

23. Pappus VII, 23 p. 662, 19 sq.:

*Οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι εἰς τὴν τῶν ἐπιπέδων τούτων τόπων τάξιν ἀποβλέποντες ἐστοιχείωσαν· ἧς ἀμελήσαντες οἱ μετ' αὐτοὺς προσέθηκαν ἑτέρους, ὡς οὐκ ἀπείρων τὸ πλῆθος ὄντων, εἰ θέλοι τις προσγράφειν οὐ τῆς τάξεως ἐκείνης ἐχόμενα. θήσω οὖν τὰ μὲν προσκείμενα ὕστερα, τὰ δ' ἐκ τῆς τάξεως πρότερα μιᾷ περιλαβὼν προτάσει ταύτῃ·*

*ἐὰν δύο εὐθεῖαι ἀχθῶσιν ἤτοι ἀπὸ ἑνὸς δεδομένου σημείου ἢ ἀπὸ δύο καὶ ἤτοι ἐπ' εὐθείας ἢ παράλληλοι ἢ δεδομένην περιέχουσαι γωνίαν καὶ ἤτοι λόγον ἔχουσαι πρὸς ἀλλήλας ἢ χωρίον περιέχουσαι δεδομένον,*

---

7. *οὓς*] *ὡς* Hultsch. 9. *γραμμή* codd. 10. *ἐπιφάνεια* codd. 11. *γραμμή*] scripsi, *γραμμήν* codd. *ἐπιφάνεια*] scripsi, *ἐπιφάνειαν* codd. 13. *ἐπιφάνεια*] scripsi, *ἐπιφάνειαν* codd. 15. *τούτων*] del. Hultsch. 19. *οὐ*] *τὰ* Hultsch.

ἅπτηται δὲ τὸ τῆς μιᾶς πέρας ἐπιπέδου τόπου θέσει δεδομένου, ἅψεται καὶ τὸ τῆς ἑτέρας πέρας ἐπιπέδου τόπου θέσει δεδομένου ὁτὲ μὲν τοῦ ὁμογενοῦς, ὁτὲ δὲ τοῦ ἑτέρου, καὶ ὁτὲ μὲν ὁμοίως κειμένου πρὸς τὴν εὐθεῖαν, ὁτὲ δὲ ἐναντίως. ταῦτα δὲ γίνεται παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν ὑποκειμένων.

24. Pappus VII, 26 p. 666, 14 sq.:

Τὸ δὲ δεύτερον βιβλίον περιέχει τάδε·

ἐὰν ἀπὸ δύο δεδομένων σημείων εὐθεῖαι κλασθῶσιν, καὶ ᾖ τὰ ἀπ' αὐτῶν δοθέντι χωρίῳ διαφέροντα, τὸ σημεῖον ἅψεται θέσει δεδομένης εὐθείας·

ἐὰν δὲ ὦσιν ἐν λόγῳ δοθέντι, ἤτοι εὐθείας ἢ περιφερείας·

ἐὰν ᾖ θέσει δεδομένη εὐθεῖα καὶ ἐπ' αὐτῆς δοθὲν σημεῖον καὶ ἀπὸ τούτου διαχθεῖσά τις πεπερασμένη, ἀπὸ δὲ τοῦ πέρατος ἀχθῇ πρὸς ὀρθὰς ἐπὶ τὴν θέσει, καὶ ᾖ τὸ ἀπὸ τῆς διαχθείσης ἴσον τῷ ὑπὸ δοθείσης καὶ ἧς ἀπολαμβάνει ἤτοι πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ ἢ πρὸς ἑτέρῳ δοθέντι σημείῳ ἐπὶ τῆς θέσει δεδομένης, τὸ πέρας τῆσδε ἅψεται θέσει δεδομένης περιφερείας·

ἐὰν ἀπὸ δύο δοθέντων σημείων εὐθεῖαι κλασθῶσιν, καὶ ᾖ το ἀπὸ τῆς μιᾶς τοῦ ἀπὸ τῆς ἑτέρας δοθέντι μεῖζον ἢ ἐν λόγῳ, τὸ σημεῖον ἅψεται θέσει δεδομένης περιφερείας·

ἐὰν ἀπὸ ὁσωνοῦν δεδομένων σημείων κλασθῶσιν εὐθεῖαι πρὸς ἑνὶ σημείῳ, καὶ ᾖ τὰ ἀπὸ πασῶν εἴδη ἴσα δοθέντι χωρίῳ, τὸ σημεῖον ἅψεται θέσει δεδομένης περιφερείας·

---

16. θέσει δεδομένην Hultsch cum Halleio. 20. τῆσδε] τῆς διαχθείσης coni. Hultsch.

*ἐὰν ἀπὸ δύο δοθέντων σημείων κλασθῶσιν εὐθεῖαι, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου παρὰ θέσει ἀχθεῖσα εὐθεῖα ἀπολαμβάνῃ ἀπὸ θέσει δεδομένης εὐθείας πρὸς δοθέντι σημείῳ, καὶ ᾖ τὰ ἀπὸ τῶν κεκλασμένων εἴδη ἴσα τῷ ὑπὸ δοθείσης καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης, τὸ πρὸς τῇ κλάσει σημεῖον ἅψεται θέσει δεδομένης περιφερείας·*

*ἐὰν ἐν κύκλῳ θέσει δεδομένῳ δοθέν τι σημεῖον ᾖ, καὶ δι' αὐτοῦ ἀχθῇ τις εὐθεῖα, καὶ ἐπ' αὐτῆς ληφθῇ τι σημεῖον ἐκτός, καὶ ᾖ τὸ ἀπὸ τῆς ἄχρι τοῦ δοθέντος ἐντὸς σημείου ἴσον τῷ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τῆς ἐκτὸς ἀπολαμβανομένης ἤτοι μόνον ἢ τοῦτό τε καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ἐντὸς δύο τμημάτων, τὸ ἐκτὸς σημεῖον ἅψεται θέσει δεδομένης εὐθείας·*

*καὶ ἐὰν τοῦτο μὲν τὸ σημεῖον ἅπτηται θέσει δεδομένης εὐθείας, ὁ δὲ κύκλος μὴ ὑπόκειται, τὰ ἐφ' ἑκάτερα τοῦ δεδομένου σημεῖα ἅψεται θέσει δεδομένης περιφερείας τῆς αὐτῆς.*

*Ἔχει δὲ τὰ τόπων ἐπιπέδων δύο βιβλία θεωρήματα ἤτοι διαγράμματα ρμζ, λήμματα δὲ η.*

25. Eutocius ad Apollonium I deff.; u. infra. est libri II prop. 2 apud Pappum; cfr. Studien über Euklid p. 70 sq.

## De cochlea.

26. Proclus in Elementa p. 105, 1 sq. ed. Friedlein:

*Τὴν περὶ τὸν κύλινδρον ἕλικα γραφομένην, ὅταν εὐθείας κινουμένης περὶ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίν-*

---

12. *μόνον — τό*] Hultsch cum Simsono, *μόνῳ ἢ τούτῳ τε καὶ τῷ* codd.

*δρου σημεῖον ὁμοταχῶς ἐπ' αὐτῆς κινῆται. γίνεται γὰρ ἕλιξ, ἧς ὁμοιομερῶς πάντα τὰ μέρη πᾶσιν ἐφαρμόζει, καθάπερ Ἀπολλώνιος ἐν τῷ περὶ τοῦ κοχλίου γράμματι δείκνυσιν.* Cfr. p. 105, 14.

27. Pappus VIII, 49 p. 1110, 16 sq.:

*Ἐν ᾧ γὰρ χρόνῳ τὸ Α ἐπὶ τὸ Β παραγίνεται ὁμαλῶς κινούμενον, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΑΒ κατὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυλίνδρου κινηθεῖσα εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκαθίσταται, καὶ τὸ εἰρημένον φέρεσθαι σημεῖον κατὰ τῆς ΑΒ εὐθείας γράψει τὴν μονόστροφον ἕλικα· τοῦτο γὰρ Ἀπολλώνιος ὁ Περγεὺς ἀπέδειξεν.*

## Comparatio dodecaedri et icosaedri.

28. Hypsicles (Elementorum liber XIV qui fertur) V p. 2, 1 sq. ed. Heiberg:

*Βασιλείδης ὁ Τύριος, ὦ Πρώταρχε, παραγενηθεὶς εἰς Ἀλεξάνδρειαν καὶ συσταθεὶς τῷ πατρὶ ἡμῶν διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ μαθήματος συγγένειαν συνδιέτριψεν αὐτῷ τὸν πλεῖστον τῆς ἐπιδημίας χρόνον. καί ποτε ζητοῦντες τὸ ὑπὸ Ἀπολλωνίου συγγραφὲν περὶ τῆς συγκρίσεως τοῦ δωδεκαέδρου καὶ τοῦ εἰκοσαέδρου τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων, τίνα ἔχει λόγον πρὸς ἄλληλα, ἔδοξαν ταῦτα μὴ ὀρθῶς γεγραφηκέναι τὸν Ἀπολλώνιον, αὐτοὶ δὲ ταῦτα καθάραντες ἔγραψαν, ὡς ἦν ἀκούειν τοῦ πατρός. ἐγὼ δὲ ὕστερον περιέπεσον ἑτέρῳ βιβλίῳ ὑπὸ Ἀπολλωνίου ἐκδεδομένῳ περιέχοντί τινα ἀπόδειξιν περὶ τοῦ προκειμένου, καὶ μεγάλως ἐψυχαγωγήθην ἐπὶ τῇ τοῦ προβλήματος ζητήσει. τὸ μὲν οὖν ὑπὸ Ἀπολλωνίου ἐκδοθὲν ἔοικε κοινῇ σκοπεῖν· καὶ γὰρ περιφέρεται δοκοῦν ὕστερον γεγράφθαι φιλοπόνως.*

29. Hypsicles p. 6, 19 sq.:[1])

Ὁ αὐτὸς κύκλος περιλαμβάνει τό τε τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνον καὶ τὸ τοῦ εἰκοσαέδρου τρίγωνον τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων. τοῦτο δὲ γράφεται ὑπὸ μὲν Ἀρισταίου ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ τῶν ε̄ σχημάτων συγκρίσει, ὑπὸ δὲ Ἀπολλωνίου ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐκδόσει τῆς συγκρίσεως τοῦ δωδεκαέδρου πρὸς τὸ εἰκοσάεδρον, ὅτι ἐστίν, ὡς ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν, οὕτως καὶ αὐτὸ τὸ δωδεκάεδρον πρὸς τὸ εἰκοσάεδρον διὰ τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι κάθετον ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἐπὶ τὸ τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνον καὶ τὸ τοῦ εἰκοσαέδρου τρίγωνον. γραπτέον δὲ καὶ ἡμῖν αὐτοῖς.

## De irrationalibus inordinatis.

30. Proclus in Elementa p. 74, 23 sq.:

Τὰ περὶ τῶν ἀτάκτων ἀλόγων, ἃ ὁ Ἀπολλώνιος ἐπὶ πλέον ἐξειργάσατο.

31. Scholia in Elementa X, 1 p. 414, 12 sq. ed. Heiberg, quae e commentario Pappi petita esse conieci Studien über Euklid p. 170, demonstraui Videnskabernes Selskabs Skrifter, 6. Raekke, hist.-philos. Afd. II p. 236 sq. (Hauniae 1888):

Ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς περὶ ῥητῶν καὶ ἀλόγων οὐ πασῶν· τινὲς γὰρ αὐτῷ ὡς ἐνιστάμενοι ἐγκαλοῦσιν·

---

1) Sicut dubitari nequit, quin etiam sequentium apud Hypsiclem propositionum multae uel eodem modo uel similiter apud Apollonium propositae et demonstratae fuerint, ita difficile est dictu, quae fuerint, quia de genere operis eius nihil scimus. quare ea tantum recepi, quae diserte ad eum referuntur.

ἀλλὰ τῶν ἁπλουστάτων εἰδῶν, ὧν συντιθεμένων γίνονται ἄπειροι ἄλογοι, ὧν τινας καὶ ὁ Ἀπολλώνιος ἀναγράφει.

32. Pappi commentarius in Elementorum libr. X, qui Arabice exstat et ex parte a Woepckio (Mémoires présentées par divers savans à l'académie des sciences 1856. XIV) cum interpretatione Francogallica editus est, p. 691:

Plus tard le grand Apollonius, dont le génie atteignit au plus haut degré de supériorité dans les mathématiques, ajouta à ces découvertes[1]) d'admirables théories après bien des efforts et de travaux.

33. Pappus in Elem. X p. 693 ed. Woepcke:

Enfin, Apollonius distingua[2]) les espèces des irrationnelles ordonnées, et découvrit la science des quantités appelées (irrationnelles) inordonnées, dont il produisit un très-grand nombre par des méthodes exactes.

34. Pappus in Elem. X p. 694 sq.:

Il faut aussi qu'on sache que, non-seulement lorsqu' on joint ensemble deux lignes rationnelles et commensurables en puissance, on obtient la droite de deux noms, mais que trois ou quatre lignes produisent d'une manière analogue la même chose. Dans le premier cas, on obtient la droite de trois noms, puisque la ligne entière est irrationnelle; et, dans le second cas, on obtient la droite de quatre noms, et

1) Theaeteti de irrationalibus.

2) H. e. ab inordinatis distinxit ut proprium quoddam genus.

ainsi de suite jusqu'à l'infini. La démonstration [de l'irrationnalité] de la ligne composée de trois lignes rationnelles et commensurables en puissance est exactement la même que la démonstration relative à la combinaison de deux lignes.

Mais il faut recommencer encore et dire que nous pouvons, non-seulement prendre une seule ligne moyenne entre deux lignes commensurables en puissance, mais que nous pouvons en prendre trois ou quatre, et ainsi de suite jusqu'à l'infini, puisque nous pouvons prendre entre deux lignes droites données quelconques autant de lignes que nous voulons, en proportion continue.

Et, de même, dans les lignes formées par addition, nous pouvons, non-seulement construire la droite de deux noms, mais nous pouvons aussi construire celle de trois noms, ainsi que la première et la seconde de trois médiales; puis, la ligne composée de trois droites incommensurables en puissance et telles que l'une d'elles donne avec chacune des deux autres une somme des carrés rationnelle, tandis que le rectangle compris sous les deux lignes est médial, de sorte qu'il en résulte une majeure composée de trois lignes. Et, d'une manière analogue, on obtient la droite qui peut une rationnelle et une médiale, composée de trois droites, et de même celle qui peut deux médiales.

Car, supposons trois lignes rationnelles commensurables en puissance seulement. La ligne composée de deux de ces lignes, à savoir la droite de deux noms, est irrationnelle, et, en conséquence, l'espace compris sous cette ligne et sous la ligne restante est irrationnel,

et, de même, le double de l'espace compris sous ces deux lignes sera irrationnel. Donc, le carré de la ligne entière, composée de trois lignes, est irrationnel, et, conséquemment, la ligne est irrationnelle, et on l'appelle droite de trois noms.

Et, si l'on a quatres lignes commensurables en puissance, comme nous l'avons dit, le procédé sera exactement le même; et on traitera les lignes suivantes d'une manière analogue.

Qu'on ait ensuite trois lignes médiales commensurables en puissance, et dont l'une comprenne avec chacune des deux autres un rectangle rationnel; alors la droite composée des deux lignes est irrationnelle et s'appelle la première de deux médiales; la ligne restante est médiale, et l'espace compris sous ces deux lignes est irrationnel. Conséquemment, le carré de la ligne entière est irrationnel. Le reste des autres lignes se trouve dans les mêmes circonstances. Les lignes composées s'étendent donc jusqu'à l'infini dans toutes les espèces formées au moyen de l'addition.

De même, il n'est pas nécessaire que, dans les lignes irrationnelles formées au moyen de la soustraction, nous nous bornions à n'y faire qu'une seule soustraction, de manière à obtenir l'apotome, ou le premier apotome de la médiale, ou le second apotome de la médiale, ou la mineure, ou la droite qui fait avec une surface rationnelle un tout médial, ou celle qui fait avec une surface médiale un tout médial; mais nous pourrons y effectuer deux ou trois ou quatre soustractions.

Lorsque nous faisons cela, nous démontrons, d'une

manière analogue à ce qui précède, que les lignes restantes sont irrationnelles, et que chacune d'elles est une des lignes formées par soustraction. C'est-à-dire que, si d'une ligne rationnelle nous retranchons une autre ligne rationnelle commensurable à la ligne entière en puissance, nous obtenons pour ligne restante un apotome; et si nous retranchons de cette ligne retranchée et rationnelle, qu' Euclide appelle la congruente, une autre ligne rationnelle qui lui est commensurable en puissance, nous obtenons, comme partie restante, un apotome; de même que, si nous retranchons de la ligne rationnelle et retranchée de cette ligne une autre ligne qui lui est commensurable en puissance, le reste est un apotome. Il en est de même pour la soustraction des autres lignes.

Il est donc alors impossible de s'arrêter, soit dans les lignes formées par addition, soit dans celles formées par soustraction; mais on procède à l'infini, dans celles-là, en ajoutant, et dans celles-ci, en ôtant la ligne retranchée. Et, naturellement, l'infinité des quantités irrationnelles se manifeste par des procédés tels que les précédents, vu que la proportion continue ne s'arrête pas à un nombre déterminé pour les médiales, que l'addition n'a pas de fin pour les lignes formées par addition, et que la soustraction n'arrive pas non plus à un terme quelconque.[1])

---

1) Quid hinc de opere Apollonii concludi possit, exposuit Woepcke p. 706 sqq. uestigia doctrinae Apollonianae fortasse in additamento subditiuo Eucl. Elem. X, 112—115 p. 356—70 exstare, suspicatus sum in ed. Eucl. V p. LXXXV. Pappus tamen sine suspicione X, 115 legit; u. Woepcke p. 702.

35. Pappus in Elem. X p. 701:

Les irrationnelles se divisent premièrement en inordonnées, c'est-à-dire celles qui tiennent de la matière qu'on appelle corruptible, et qui s'étendent à l'infini; et, secondement, en ordonnées, qui forment le sujet limité d'une science, et qui sont aux inordonnées comme les rationnelles sont aux irrationnelles ordonnées. Or Euclide s'occupa seulement des ordonnées qui sont homogènes aux rationnelles, et qui ne s'en éloignent pas considérablement; ensuite Apollonius s'occupa des inordonnées, entre lesquelles et les rationnelles la distance est très-grande.

### *Ὠκυτόκιον.*

36. Eutocius in Archimedis dimens. circuli III p. 300, 16 sq.:

*Ἰστέον δέ, ὅτι καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος ἐν τῷ Ὠκυτοκίῳ ἀπέδειξεν αὐτὸ* [rationem ambitus circuli ad diametrum] *δι' ἀριθμῶν ἑτέρων ἐπὶ τὸ σύνεγγυς μᾶλλον ἀγαγών.*

37. Pappus[1]) II, 22 p. 24, 25 sq.:

*Φατέον οὖν τὸν ἐξ ἀρχῆς στίχον*

*Ἀρτέμιδος κλεῖτε κράτος ἔξοχον ἐννέα κοῦραι*

*πολλαπλασιασθέντα δι' ἀλλήλων δύνασθαι μυριάδων πλῆθος τρισκαιδεκαπλῶν* $\overline{\text{ϙϛ}}$, *δωδεκαπλῶν* $\overline{\text{τξη}}$, *ἐν-*

---

1) Cum ab imagine operis Apolloniani, quod a Pappo citatur, qualem animo concepi, computatio ab Eutocio significata minime abhorreat, malui haec fragmenta sub uno titulo coniungere quam putare, Apollonium methodum magnos numeros computandi in duobus operibus exposuisse.

E fragm. 37 adparet, Apollonium initio operis, sine dubio in praefatione, iocandi causa uersum illum proposuisse et ut

*δεκαπλῶν* ,*δω*, *συμφώνως τοῖς ὑπὸ Ἀπολλωνίου κατὰ την μέθοδον ἐν ἀρχῇ τοῦ βιβλίου προγεγραμμένοις.*

38. Pappus II, 3 p. 4, 9 sq. (cfr. fragm. 47):

*Ἀλλ' ὁ διπλάσιος τοῦ πλήθους τῶν ἐφ' ὧν τὰ B μὴ μετρείσθω ὑπὸ τετράδος· μετρούμενος ἄρα λείψει δυάδα ἐξ ἀνάγκης· τοῦτο γὰρ προδέδεικται.*

39. Pappus II, 1 p. 2, 1 sq.:

* *γὰρ αὐτοὺς ἐλάσσονας μὲν εἶναι ἑκατοντάδος, μετρεῖσθαι δὲ ὑπὸ δεκάδος, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐξ αὐτῶν στερεὸν εἰπεῖν μὴ πολλαπλασιάσαντα αὐτούς.*

40. Pappus II, 2 p. 2, 14 sq.:

*Ἔστωσαν δὴ πάλιν ὁσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ ἐφ' ὧν τὰ B, ὧν ἕκαστος ἐλάσσων μὲν χιλιάδος, μετρείσθω δὲ ὑπὸ ἑκατοντάδος, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐξ αὐτῶν στερεὸν εἰπεῖν μὴ πολλαπλασιάσαντα τοὺς ἀριθμούς.*

E Pappo p. 4, 3 sq. ad demonstrationem Apollonii haec pertinent: *δείκνυται οὖν διὰ τῶν γραμμῶν* .... *ὁ διὰ τῶν ἐφ' ὧν τὰ B στερεὸς ἴσος ... τῷ διὰ τῶν ἑκατοντάδων στερεῷ ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν πυθμένων στερεόν.* Hoc si duplicatam multitudinem numerorum *B* metitur numerus 4, sin minus (cfr. fragm. 38), *ὁ διὰ τῶν ἐφ' ὧν τὰ B μυριάδες εἰσὶν* $\bar{\varrho}$ *ὁμώνυμοι τῷ Z*

---

exemplum numeri ingentis productum litterarum eius pro numeralibus sumptarum indicasse. deinde methodum, qua tanti numeri computari possint, exposuit. in qua enarranda Pappus propositiones ipsas excerpsit et per numeros confirmauit; demonstrationes ipsius Apollonii, quae in lineis factae erant, h. e. uniuersaliter, sicut in Elem. VII—IX, omisit. hinc adparet, quid in opere Apollonii e commentariis Pappi restituendo secutus sim. cfr. Tannery Mémoires de la soc. des sciences physiques et natur. de Bordeaux, 2ᵉ sér. III p. 352 sq.

γενόμεναι ἐπὶ τὸν *E*, Pappus p. 4, 16 sq. De *Z*, *E* u. fragm. 42.

41. Pappus II, 4 p. 4, 19 sq.:

Ἔστωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ *A*, *B*, καὶ ὁ μὲν *A* ὑποκείσθω ἐλάσσων μὲν χιλιάδος, μετρούμενος δὲ ὑπὸ ἑκατοντάδος, ὁ δὲ *B* ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος, μετρούμενος δὲ ὑπὸ δεκάδος, .... καὶ δέον ἔστω τὸν ἐξ αὐτῶν ἀριθμὸν εἰπεῖν μὴ πολλαπλασιάσαντα αὐτούς.

De demonstratione Pappus p. 6, 4: τὸ δὲ γραμμικὸν δῆλον ἐξ ὧν ἔδειξεν Ἀπολλώνιος.

42. Pappus II, 5 p. 6, 6 sq.:

Ἐπὶ δὲ τοῦ ιη' θεωρήματος. Ἔστω πλῆθος ἀριθμῶν τὸ ἐφ' ὧν τὰ *A*, ὧν ἕκαστος ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος, μετρούμενος δὲ ὑπὸ δεκάδος, καὶ ἄλλο πλῆθος ἀριθμῶν τὸ ἐφ' ὧν τὰ *B*, ὧν ἕκαστος ἐλάσσων μὲν χιλιάδος, μετρούμενος δὲ ὑπὸ ἑκατοντάδος, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐκ τῶν ἐφ' ὧν τὰ *A*, *B* στερεὸν εἰπεῖν μὴ πολλαπλασιάσαντα αὐτούς.

De demonstratione Pappus p. 6, 19 sq.: καὶ δείκνυσιν ὁ Ἀπολλώνιος τὸν ἐκ πάντων τῶν ἐφ' ὧν τὰ *A*, *B* στερεὸν μυριάδων τοσούτων, ὅσαι εἰσὶν ἐν τῷ *E* [producto τῶν πυθμένων] μονάδες, ὁμωνύμων τῷ *Z* ἀριθμῷ [qui indicat, quoties numerus 4 metiatur summam multitudinis numerorum *A* et duplicatae multitudinis numerorum *B*]. De casibus secundo, tertio, quarto Pappus p. 6, 29 sq.: ἀλλὰ δὴ τὸ πλῆθος τῶν ἐφ' ὧν τὰ *A* προσλαβὸν τὸν διπλασίονα τοῦ πλήθους τῶν ἐφ' ὧν τὰ *B* μετρούμενον ὑπὸ τετράδος καταλειπέτω πρότερον ἕνα· καὶ συνάγει ὁ Ἀπολλώνιος, ὅτι

12. ιη'] om. codd.

ὁ ἐκ τῶν ἀριθμῶν ἐφ' ὧν τὰ $A$, $B$ στερεὸς μυριάδες εἰσὶν τοσαῦται ὁμώνυμοι τῷ $Z$, ὅσος ἐστὶν ὁ δεκαπλασίων τοῦ $E$. ἐὰν δὲ τὸ προειρημένον πλῆθος μετρούμενον ὑπὸ τετράδος καταλείπῃ δύο, ὁ ἐκ τῶν ἀριθμῶν στερεὸς τῶν ἐφ' ὧν τὰ $A$, $B$ μυριάδες εἰσὶν τοσαῦται ὁμώνυμοι τῷ $Z$, ὅσος ἐστὶν ὁ ἑκατονταπλάσιος τοῦ $E$ ἀριθμοῦ. ὅταν δὲ τρεῖς καταλειφθῶσιν, ἴσος ἐστὶν ὁ ἐξ αὐτῶν στερεὸς μυριάσιν τοσαύταις ὁμωνύμοις τῷ $Z$, ὅσος ἐστὶν ὁ χιλιαπλάσιος τοῦ $E$ ἀριθμοῦ.

43. Pappus II, 7 p. 8, 12 sq.:

Ἐπὶ δὲ τοῦ ιθ' θεωρήματος. Ἔστω τις ἀριθμὸς ὁ $A$ ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος, μετρούμενος δὲ ὑπὸ δεκάδος, καὶ ἄλλοι ὁσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ ἐλάσσονες δεκάδος, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐκ τῶν $A$, $B$, $\Gamma$, $\Delta$, $E$ στερεὸν εἰπεῖν.

Ἔστω γὰρ καθ' ὃν μετρεῖται ὁ $A$ ὑπὸ τῆς δεκάδος ὁ $Z$, τουτέστιν ὁ πυθμὴν τοῦ $A$, καὶ εἰλήφθω ὁ ἐκ τῶν $Z$, $B$, $\Gamma$, $\Delta$, $E$ στερεὸς καὶ ἔστω ὁ $H$· λέγω, ὅτι ὁ διὰ τῶν $A$, $B$, $\Gamma$, $\Delta$, $E$ στερεὸς δεκάκις εἰσὶν οἱ $H$.

De demonstratione Pappus p. 8, 27: τὸ δὲ γραμμικὸν ὑπὸ τοῦ Ἀπολλωνίου δέδεικται.

44. Pappus II, 8 p. 10, 1 sq.:

Ἀλλὰ δὴ ἔστωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ $A$, $B$, ὧν ἑκάτερος ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος, μετρούμενος δὲ ὑπὸ

---

Lin. 24 sq. ab Apollonio abiudicat Tannery, sed cfr. p. 128, 7. contra iure idem Papp. p. 10, 15—30 negat apud Apollonium fuisse, nec ibi τὸ γραμμικόν citatur; a Pappo additum uidetur, quo magis gradatim ad fragm. 45 transeatur.

---

15. δεκάδος οἷον οἱ $B$, $\Gamma$, $\Delta$, $E$ Hultsch cum aliis.

δεκάδος, τῶν δὲ Γ, Δ, Ε ἕκαστος ἐλάσσων δεκάδος ἔστω, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐκ τῶν Α, Β, Γ, Δ, Ε στερεὸν εἰπεῖν.

Ἔστωσαν γὰρ τῶν Α, Β πυθμένες οἱ Ζ, Η· λέγω, ὅτι ὁ ἐκ τῶν Α, Β, Γ, Δ, Ε στερεὸς τοῦ ἐκ τῶν Ζ, Η, Γ, Δ, Ε στερεοῦ ἑκατονταπλάσιός ἐστιν.

De demonstratione Pappus p. 10, 14: τὸ δὲ γραμμικὸν ἐκ τῶν Ἀπολλωνίου.

45. Pappus II, 10 p. 10, 31 sq.:

Ἀλλὰ δὴ ἔστωσαν πλείους τριῶν οἱ Α, Β, Γ, Δ, Ε καὶ ἕκαστος ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος, μετρούμενος δὲ ὑπὸ δεκάδος, τῶν δὲ Ζ, Η, Θ ἕκαστος ἔστω ἐλάσσων δεκάδος.

Τὸ πλῆθος τῶν Α, Β, Γ, Δ, Ε πρότερον μετρείσθω ὑπὸ τετράδος κατὰ τὸν Ο, καὶ ἔστωσαν τῶν Α, Β, Γ, Δ, Ε πυθμένες οἱ Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ· ὅτι ὁ ἐκ τῶν Α, Β, Γ, Δ, Ζ, Η, Θ στερεὸς ἴσος ἐστὶν μυριάσιν ὁμωνύμοις τῷ Ο, ὅσαι μονάδες εἰσὶν ἐν τῷ στερεῷ τῷ ἐκ τῶν Κ, Λ, Μ, Ν ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν Ζ, Η, Θ.

De casibus secundo, tertio, quarto Pappus p. 12, 20 sq.:

Ἀλλὰ δὴ τὸ πλῆθος τῶν Α, Β, Γ, Δ, Ε μὴ μετρείσθω ὑπὸ τετράδος· μετρούμενον δὴ ἤτοι $\bar{α}$ ἢ $\bar{β}$ ἢ $\bar{γ}$ λείψει. εἰ μὲν οὖν ἕνα λείψει, ἔσται ὁ ἐκ των Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ στερεὸς μυριάδων ὁμωνύμων τῷ Ο, ὅσος ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ στερεὸς ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν Ζ, Η, Θ καὶ ὁ γενόμενος δεκάκις· εἰ

---

10. πλείους τριῶν] Apollonius scripserat ὁσοιδηποτοῦν. 10 sq. Hultschio suspecta. 24. Ζ, Η, Θ] Hultsch, om. codd. 25. Ο τοσούτων coni. Hultsch. Ξ] Hultsch cum Wallisio, om. codd. 26. καὶ ὁ] del. Hultsch cum Wallisio.

δὲ δύο λείπει, ἑκατοντάκις γενόμενος ὁ εἰρημένος στερεός. εἰ δὲ τρεῖς λείψει, ὁ ἐκ τῶν Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν Ζ, Η, Θ χιλιάκις γενόμενος [ἔσται μυριάδων τοσούτων ὁμωνύμων τῷ Ο]. τὸ δὲ γραμμικὸν ἐκ τοῦ στοιχείου δῆλον.

46. Pappus II, 12 p. 14, 4 sq.:

Ἔστω ὁ μὲν Α ἐλάσσων μὲν χιλιάδος, μετρούμενος δὲ ὑπὸ ἑκατοντάδος, ἕκαστος δὲ τῶν Β, Γ, Δ ἐλάσσων δεκάδος, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐκ τῶν Α, Β, Γ, Δ στερεὸν εἰπεῖν.

Κείσθω γὰρ τοῦ μὲν Α πυθμὴν ὁ Ε, τῷ δὲ ἐκ τῶν Ε, Β, Γ, Δ στερεῷ ἴσος ὁ Ζ· ὅτι ὁ ἐκ τῶν Α, Β, Γ, Δ στερεὸς ἑκατοντάκις ἐστὶν ὁ Ζ.

De demonstratione Pappus p. 14, 15: τὸ δὲ γραμμικὸν ἐκ τοῦ στοιχείου.

47. Pappus II, 13 p. 14, 16: Ἐπὶ δὲ τοῦ κδ' θεωρήματος (de producto quotlibet unitatum et quotlibet centenariorum).

In priore casu nihil de Apollonio sumpsit Pappus, sed numeros tantum de suo adfert; in altero haec p. 14, 24 sq. (cfr. fragm. 38):

Ἐὰν δὲ τὸ διπλάσιον τοῦ πλήθους τῶν Α, Β μὴ μετρῆται ὑπὸ τετράδος, δῆλον, ὅτι μετρούμενον κατὰ τὸν Κ λείψει δύο· τοῦτο γὰρ ἀνώτερον ἐδείχθη. διὰ

---

1. λείψει Hultsch. γενόμενος — 2. στερεός] del. Hultsch. 2. ὁ] ὅσων ὁ Hultsch. Ξ] Hultsch cum Wallisio, om. codd. 3. ἔσται μονάδων τοσούτων μυριάδων Hultsch; malim delere ἔσται — 4. τῷ Ο. 7 sq. Hultschio suspecta. 11. τῷ] ὁ Hultsch cum Wallisio. 12. στερεῷ ἴσος] Eberhard (qui praeterea add. ἔστω), om. codd. 15. στοιχείου δῆλον Hultsch cum Wallisio.

δὴ τοῦτο ἐκ τῶν *Α*, *Β* καὶ μιᾶς τῶν λειπομένων δύο ἑκατοντάδων μυριάδες εἰσὶν ἑκατὸν ὁμώνυμοι τῷ *Κ*· καὶ ἔτι ὁ ἐκ τῶν *Ζ*, *Η*, *Γ*, *Δ*, *Ε* στερεὸς ὁ *Θ* ἐπὶ τὰς ἑκατὸν μυριάδας ὁμωνύμους τῷ *Κ*. τὸ γραμμικὸν ὡς Ἀπολλώνιος.

48. Pappus II, 14 p. 16, 3:

Ἐπὶ δὲ τοῦ κε΄ θεωρήματος.

Quae sequuntur p. 16, 3 sq. tam corrupta sunt, ut sensus idoneus sine uiolentia elici non possit. sed cum hic τὸ γραμμικόν Apollonii non citetur, dubito, an non sit propositio operis Apolloniani, sed lemma ipsius Pappi. cfr. Tannery l. c. p. 355 sq.

49. Pappus II, 15 p. 16, 17 sq.:

Τὸ δ' ἐπὶ πᾶσι θεώρημα κϛ΄ πρότασιν ἔχει καὶ ἀπόδειξιν τοιαύτην.

Ἔστωσαν δύο ἀριθμοὶ ἢ πλείους οἱ *Α*, *Β*, ὧν ἕκαστος ἐλάσσων μὲν χιλιάδος, μετρούμενος δὲ ὑπὸ ἑκατοντάδος, καὶ ἄλλοι ἀριθμοὶ ὁσοιδήποτε οἱ *Γ*, *Δ*, *Ε*, ὧν ἕκαστος ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος, μετρούμενος δὲ ὑπὸ δεκάδος, καὶ ἄλλοι πάλιν ὁσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ οἱ *Ζ*, *Η*, *Θ*, ὧν ἕκαστος ἐλάσσων δεκάδος, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐκ τῶν *Α*, *Β*, *Γ*, *Δ*, *Ε*, *Ζ*, *Η*, *Θ* στερεὸν εἰπεῖν.

ἔστωσαν γὰρ τῶν *Α*, *Β*, *Γ*, *Δ*, *Ε* πυθμένες οἱ *Λ*, *Μ*, *Ν*, *Ξ*, *Ο*. ὁ δὴ διπλάσιος τῶν *Α*, *Β* μετὰ τῶν

---

1. *Α*, *Β* καὶ μιᾶς τῶν] dubitans addidi, om. codd. (per *Α*, *Β* significatur ea pars seriei, cuius multitudo duplicata est 4 *K*). λειπομένων] Bredow, λ̄μ̄ codd. Pro ἐκ — 2. ἑκατοντάδων Hultsch: ἐκ τοῦ λείπεσθαι δύο, quod deinde delet. 2. ἑκατόν] Hultsch cum Wallisio, χιλίαι codd. 3. ἔτι] scripsi, ἔστιν codd. *Z*, *H*] scripsi, *A*, *B* codd. (sed u. Papp. p. 14, 22). Ante ἐπί add. ἴσος τῷ ἐκ τῶν *Z*, *H*, *Γ*, *Δ*, *E* στερεῷ Hultsch. τὰς ἑκατόν] Hultsch et Wallis, χιλιας codd. 24. διπλάσιος τοῦ πλήθους τῶν Hultsch. μετά] μετὰ τοῦ Hultsch, καί codd.

*Γ, Δ, Ε ἁπλῶς ἀριθμῶν ἤτοι μετρεῖται ὑπὸ τετράδος ἢ οὔ.*

*μετρείσθω πρότερον ὑπὸ τετράδος κατὰ τὸν Κ, καὶ ὑποτετάχθωσαν τοῖς μὲν Α, Β ἑκατοντάδες αἱ Π, Ρ, τοῖς δὲ Γ, Δ, Ε δεκάδες αἱ Σ, Τ, Υ· καὶ ὁ διπλάσιος ἄρα τῶν Π, Ρ μετὰ τοῦ πλήθους τῶν Σ, Τ, Υ μετρεῖται ὑπὸ τετράδος κατὰ τὸν Κ. καὶ φανερόν, ὅτι ὁ ἐκ τῶν Α, Β, Γ, Δ, Ε στερεὸς ἴσος ἐστὶ τῷ ἐκ τῶν Π, Ρ, Σ, Τ, Υ ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο. εἰλήφθω δὴ ὁ ἐκ τῶν Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ζ, Η, Θ στερεὸς καὶ ἔστω ὁ Φ· ὅτι ὁ ἐκ τῶν Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ στερεὸς μυριάδες εἰσὶν τοσαῦται ὁμώνυμοι τῷ Κ, ὅσαι μονάδες εἰσὶν ἐν τῷ Φ. τοῦτο δὲ γραμμικῶς Ἀπολλώνιος ἀπέδειξεν.*

*Ἐὰν δὲ ὁ διπλάσιος τοῦ πλήθους τῶν Α, Β μετὰ τοῦ πλήθους τῶν Γ, Δ, Ε μὴ μετρῆται ὑπὸ τετράδος, μετρούμενος ἄρα κατὰ τὸν Κ λείψει ἢ ἕνα ἢ δύο ἢ τρεῖς. εἰ μὲν οὖν ἕνα λείψει, ὁ ἐκ τῶν Π, Ρ, Σ, Τ, Υ στερεὸς μυριάδες εἰσὶν δέκα ὁμώνυμοι τῷ Κ, εἰ δὲ δύο, μυριάδες ἑκατὸν ὁμώνυμοι τῷ Κ, εἰ δὲ τρεῖς, μυριάδες χίλιαι ὁμώνυμοι τῷ Κ. καὶ δῆλον ἐκ τῶν γενομένων, ὅτι ὁ ἐκ τῶν Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ στερεὸς μυριάδες εἰσὶν τοσαῦται, ὅσος ὁ δεκαπλάσιος τοῦ Φ, ὁμώνυμοι τῷ Κ ἀριθμῷ, ἢ ὅσος ὁ ἑκατονταπλάσιος τοῦ Φ, ὁμώνυμοι τῷ Κ, ἢ ὅσος ὁ χιλιαπλάσιος τοῦ Φ, ὁμώνυμοι τῷ Κ.*

*Τούτου δὴ τοῦ θεωρήματος προτεθεωρημένου πρό-*

1. *ἁπλοῦ ἀριθμοῦ* Hultsch. 5. *καὶ ὁ* — 7. *Κ*] interpolatori tribuit Hultsch. 6. *ἄρα τοῦ πλήθους τῶν* Hultsch cum Wallisio. 8. *Λ — ἐκ τῶν*] addidi, om. codd.; post *Ο* lin. 9 add. *ἴσος ἐστὶ τῷ ἐκ τῶν Α, Β, Γ, Δ, Ε στερεῷ* Hultsch cum Wallisio. 21. *γενομένων*] *γεγραμμένων* Hultsch. 26. *τοῦ θεωρήματος*] del. Hultsch.

*δηλον, πῶς ἔστιν τὸν δοθέντα στίχον πολλαπλασιάσαι καὶ εἰπεῖν τὸν γενόμενον ἀριθμὸν ἐκ τοῦ τὸν πρῶτον τῶν ἀριθμῶν, ὃν εἴληφε τὸ πρῶτον τῶν γραμμάτων, ἐπὶ τὸν δεύτερον ἀριθμόν, ὃν εἴληφε τὸ δεύτερον τῶν γραμμάτων, πολυπλασιασθῆναι καὶ τὸν γενόμενον ἐπὶ τὸν τρίτον ἀριθμόν, ὃν εἴληφε τὸ τρίτον γράμμα, καὶ κατὰ τὸ ἑξῆς περαίνεσθαι μέχρι τοῦ διεξοδεύεσθαι τὸν στίχον, ὡς εἶπεν Ἀπολλώνιος ἐν ἀρχῇ.*[1] *κατὰ τὸν στίχον οὕτως·*

*Ἀρτέμιδος κλεῖτε κράτος ἔξοχον ἐννέα κοῦραι*

(*τὸ δὲ κλεῖτε φησὶν ἀντὶ τοῦ ὑπομνήσατε*).

50. Pappus II, 18 p. 20, 10 sq.:

*Ἐὰν ἄρα τοὺς δέκα ἀριθμοὺς* [centenarios uersus illius] *διπλασιάσωμεν καὶ τοὺς γενομένους κ̄ προσθῶμεν τοῖς εἰρημένοις ἁπλῶς ἀριθμοῖς ἑπτακαίδεκα,*[2] *τὰ γενόμενα ὁμοῦ λ̄ζ̄ ἕξομεν τῶν ὑπ' αὐτοῦ λεγομένων ἀναλόγων. κἂν τοῖς μὲν δέκα ἀριθμοῖς ὑποτάξωμεν ἰσαρίθμους δέκα κατὰ τάξιν ἑκατοντάδος, τοῖς δὲ ῑζ̄ ὁμοίως ὑποτάξωμεν δεκάδας ῑζ̄, φανερὸν ἐκ τοῦ ἀνώτερον λογιστικοῦ θεωρήματος ιβʹ, ὅτι δέκα ἑκατοντάδες μετὰ τῶν ῑζ̄ δεκάδων ποιοῦσι μυριάδας ἐνναπλᾶς δέκα.*

---

1) Hic incipere uidetur expositio amplior Pappi eorum, quae Apollonius initio operis breuiter significauerat.

2) Sc. denariis uersus.

---

3. *τῶν ἀριθμῶν*] *ἀριθμόν* Hultsch. 5. *πολλαπλασιασθῆναι* Hultsch cum Wallisio. 8. *ὡς*] *ὃν* Hultsch. *κατὰ τὸν στίχον*] del. Hultsch. 13. *τούς* — 17. *κἂν*] del. Hultsch. 16. *λεγομένων*] Eberhard, *γενομένων* codd.

## De principiis mathematicis.

51. Marinus in Data Euclidis p. 2 ed. Hardy:

Διὸ τῶν ἁπλουστέρως καὶ μιᾷ τινι διαφορᾷ περιγράφειν τὸ δεδομένον προθεμένων οἱ μὲν τεταγμένον, ὡς Ἀπολλώνιος ἐν τῇ περὶ νεύσεων καὶ ἐν τῇ καθόλου πραγματείᾳ.

52. Proclus in Elem. p. 100, 5 sq.[1])

Ἀποδεξώμεθα δὲ καὶ τοὺς περὶ Ἀπολλώνιον λέγοντας, ὅτι γραμμῆς ἔννοιαν μὲν ἔχομεν, ὅταν τὰ μήκη μόνον ἢ τῶν ὁδῶν ἢ τῶν τοίχων ἀναμετρεῖν κελεύωμεν· οὐ γὰρ προσποιούμεθα τότε τὸ πλάτος, ἀλλὰ τὴν ἐφ' ἓν διάστασιν ἀναλογιζόμεθα, καθάπερ δὴ καί, ὅταν χωρία μετρῶμεν, τὴν ἐπιφάνειαν ὁρῶμεν, ὅταν δὲ φρέατα, τὸ στερεόν· πάσας γὰρ ὁμοῦ τὰς διαστάσεις συλλαβόντες ἀποφαινόμεθα τοσόνδε εἶναι τὸ διάστημα τοῦ φρέατος κατά τε μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος. αἴσθησιν δὲ αὐτῆς λάβοιμεν ἂν ἀπιδόντες εἰς τοὺς διορισμοὺς τῶν πεφωτισμένων τόπων ἀπὸ τῶν ἐσκιασμένων καὶ ἐπὶ τῆς σελήνης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τοῦτο γὰρ τὸ μέσον κατὰ μὲν πλάτος ἀδιάστατόν ἐστι, μῆκος δὲ ἔχει τὸ συμπαρεκτεινόμενον τῷ φωτὶ καὶ τῇ σκιᾷ.

53. Proclus in Elem. p. 123, 14 sq.:

Τοῦ μὲν Εὐκλείδου κλίσιν λέγοντος τὴν γωνίαν, τοῦ δὲ Ἀπολλωνίου συναγωγὴν ἐπιφανείας ἢ στερεοῦ πρὸς ἑνὶ σημείῳ ὑπὸ κεκλασμένῃ γραμμῇ ἢ ἐπιφανείᾳ· δοκεῖ γὰρ οὗτος καθόλου πᾶσαν ἀφορίζεσθαι γωνίαν.

---

1) De his fragmentis u. Tannery Bulletin des sciences mathématiques, 2e série, V p. 124, et cfr. quae monui Philolog. XLIII p. 488. ibidem suspicatus sum, etiam Procl. p. 227, 9 sq. ad Apollonium pertinere.

Cfr. p. 124, 17 sq.: *τὴν ἰδιότητα τῆς γωνίας εὑρήσομεν συναγωγὴν μὲν οὐκ οὖσαν, ὥσπερ [καὶ] ὁ Ἀπολλώνιός φησιν, ἐπιφανείας ἢ στερεοῦ*; u. etiam p. 125, 17.

54. Proclus in Elem. p. 183, 13 sq.:

*Μάτην οὖν τῶν ἀξιωμάτων Ἀπολλώνιος ἐπεχείρησεν ἀποδείξεις παραδιδόναι. ὀρθῶς γὰρ καὶ ὁ Γεμῖνος ἐπέστησεν, ὅτι οἱ μὲν καὶ τῶν ἀναποδείκτων ἀποδείξεις ἐπενόησαν καὶ ἀπὸ ἀγνωστοτέρων μέσων τὰ γνώριμα πᾶσιν κατασκευάζειν ἐπεχείρησαν· ὃ δὴ πέπονθεν ὁ Ἀπολλώνιος δεικνύναι βουλόμενος, ὅτι ἀληθὲς τὸ ἀξίωμα τὸ λέγον τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἴσα εἶναι.*

Cfr. p. 194, 9: *πολλοῦ ἄρα δεήσομεν ἡμεῖς τὸν γεωμέτρην Ἀπολλώνιον ἐπαινεῖν, ὃς καὶ τῶν ἀξιωμάτων, ὡς οἴεται, γέγραφεν ἀποδείξεις ἀπ' ἐναντίας Εὐκλείδῃ φερόμενος· ὁ μὲν γὰρ καὶ τὸ ἀποδεικτὸν ἐν τοῖς αἰτήμασι κατηρίθμησεν, ὁ δὲ καὶ τῶν ἀναποδείκτων ἐπεχείρησεν ἀποδείξεις εὑρίσκειν.*

Ipsam demonstrationem Apollonii habet Proclus p. 194, 20 sq.: *ὅτι δὲ καὶ ἡ ἀπόδειξις, ἣν ὁ Ἀπολλώνιος εὑρηκέναι πέπεισται τοῦ πρώτου τῶν ἀξιωμάτων, οὐδὲν μᾶλλον ἔχει τὸν μέσον τοῦ συμπεράσματος γνωριμότερον, εἰ μὴ καὶ πλέον ἀμφισβητούμενον, μάθοι τις ἂν ἐπιβλέψας εἰς αὐτὴν καὶ σμικρόν.*

*ἔστω γάρ, φησί, τὸ Α τῷ Β ἴσον, τοῦτο δὲ τῷ Γ. λέγω, ὅτι καὶ τὸ Α τῷ Γ ἴσον. ἐπεὶ γὰρ τὸ Α τῷ Β ἴσον, τὸν αὐτὸν αὐτῷ κατέχει τόπον. καὶ ἐπεὶ τὸ Β*


---

2. *καί*] deleo. 23. *τὸν μέσον*] sc. *ὅρον*, *τὸ μέσον* Friedlein.

*τῷ Γ ἴσον, τὸν αὐτὸν καὶ τούτῳ κατέχει τόπον. καὶ τὸ Α ἄρα τῷ Γ τὸν αὐτὸν κατέχει τόπον· ἴσα ἄρα ἐστίν.*

55. Proclus in Elem. p. 279, 16 sq.:

*Ἀπολλώνιος δὲ ὁ Περγαῖος τέμνει τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν πεπερασμένην δίχα τοῦτον τὸν τρόπον.*




*ἔστω, φησίν, ἡ ΑΒ εὐθεῖα πεπερασμένη, ἣν δεῖ δίχα τεμεῖν, καὶ κέντρῳ τῷ Α, διαστήματι δὲ τῷ ΑΒ γεγράφθω κύκλος, καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ Β, διαστήματι δὲ τῷ ΒΑ ἕτερος κύκλος, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ἐπὶ τὰς τομὰς τῶν κύκλων ἡ ΓΔ. αὕτη δίχα τέμνει τὴν ΑΒ εὐθεῖαν.*

*ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΓΑ, ΓΒ καὶ αἱ ΔΑ, ΔΒ. ἴσαι ἄρα εἰσὶν αἱ ΓΑ, ΓΒ· ἑκατέρα γὰρ ἴση τῇ ΑΒ· κοινὴ δὲ ἡ ΓΔ, καὶ ἡ ΔΑ τῇ ΔΒ ἴση διὰ τὰ αὐτά. ἡ ἄρα ὑπὸ ΑΓΔ γωνία ἴση τῇ ὑπὸ ΒΓΔ· ὥστε δίχα τέτμηται ἡ ΑΒ διὰ τὸ τέταρτον.*

*τοιαύτη τίς ἐστιν ἡ κατὰ Ἀπολλώνιον τοῦ προκειμένου προβλήματος* [Elem. I, 10] *ἀπόδειξις ἀπὸ μὲν τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ αὐτὴ ληφθεῖσα, ἀντὶ δὲ τοῦ λαβεῖν δίχα τεμνομένην τὴν πρὸς τῷ Γ γωνίαν*

---


19. *καί* — 20. *ΓΒ*] addidi, om. Friedlein. 23. *ἡ*] scripsi, *ὁ* Friedlein. 24. *ἡ*] scripsi, *καὶ ἡ* Friedlein.

δεικνύουσα, ὅτι δίχα τέτμηται, διὰ τὴν ἰσότητα τῶν βάσεων.

56. Proclus in Elem. p. 282, 8 sq.:

Ἀπολλώνιος δὲ τὴν πρὸς ὀρθὰς ἄγει τὸν τρόπον τοῦτον·


ἐπὶ τῆς ΑΓ τυχὸν τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τῆς ΓΒ ἴση τῇ ΓΔ ἡ ΓΕ, καὶ κέντρῳ τῷ Δ, τῷ δὲ ΕΔ διαστήματι γεγράφθω κύκλος, καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ Ε, διαστήματι δὲ τῷ ΔΕ κύκλος γεγράφθω, καὶ ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ Γ ἤχθω. λέγω, ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ πρὸς ὀρθάς.





ἐὰν γὰρ ἐπιζευχθῶσιν αἱ ΖΔ, ΖΕ, ἴσαι ἔσονται. ἴσαι δὲ καὶ αἱ ΔΓ, ΓΕ, καὶ κοινὴ ἡ ΖΓ· ὥστε καὶ αἱ πρὸς τῷ Γ γωνίαι ἴσαι διὰ τὸ ὄγδοον. ὀρθαὶ ἄρα εἰσίν.

57. Proclus in Elem. p. 335, 16 sq.:

Τὴν δὲ Ἀπολλωνίου δεῖξιν οὐκ ἐπαινοῦμεν ὡς δεομένην τῶν ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ δεικνυμένων. λαβὼν γὰρ ἐκεῖνος γωνίαν τυχοῦσαν τὴν ὑπὸ ΓΔΕ καὶ εὐθεῖαν τὴν ΑΒ κέντρῳ τῷ Δ, διαστήματι δὲ τῷ ΓΔ, γράφει τὴν ΓΕ περιφέρειαν καὶ ὡσαύτως κέντρῳ τῷ Α, διαστήματι δὲ τῷ ΑΒ τὴν ΖΒ, καὶ ἀπολαβὼν τῇ ΓΕ ἴσην τὴν ΖΒ ἐπιζεύγνυσι τὴν ΑΖ καὶ ἐπὶ ἴσων περι-




2. βάσεων] h. e. ΑΔ, ΔΒ.    13. ἤχθω ἡ ΖΓ Friedlein.

φερειῶν βεβηκυίας τὰς *A*, *Δ* γωνίας ἴσας ἀποφαίνει. δεῖ δὲ προλαβεῖν καί, ὅτι ἡ *AB* ἴση τῇ *ΓΔ*, ἵνα καὶ οἱ κύκλοι ἴσοι ὦσι.

58. Scholium[1]) ad Euclidis Data deff. 13—15:

Τούτους Ἀπολλωνίου φασὶν εἶναι τοὺς τρεῖς ὅρους.

## Astronomica.

59. Ptolemaeus σύνταξις XII, 1 (II p. 312 sq. ed. Halma):

Τούτων ἀποδεδειγμένων ἀκόλουθον ἂν εἴη καὶ τὰς καθ' ἕκαστον τῶν πέντε πλανωμένων γινομένας προηγήσεις ἐλαχίστας τε καὶ μεγίστας ἐπισκέψασθαι καὶ δεῖξαι καὶ τὰς τούτων πηλικότητας. ἀπὸ τῶν ἐκκειμένων ὑποθέσεων συμφώνους, ὡς ἔνι μάλιστα, γινομένας ταῖς ἐκ τῶν τηρήσεων καταλαμβανομέναις. εἰς δὲ τὴν τοιαύτην διάληψιν προαποδεικνύουσι μὲν καὶ οἵ τε ἄλλοι μαθηματικοὶ καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος ὡς ἐπὶ μιᾶς τῆς παρὰ τὸν ἥλιον ἀνωμαλίας, ὅτι, ἐάν τε διὰ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως γίνηται, τοῦ μὲν ἐπικύκλου περὶ τὸν ὁμόκεντρον τῷ ζῳδιακῷ κύκλον τὴν κατὰ μῆκος πάροδον εἰς τὰ ἑπόμενα τῶν ζῳδίων ποιουμένου, τοῦ δὲ ἀστέρος ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου περὶ τὸ

1) Hoc scholium, quod ad opus Apollonii de principiis mathematicis referre non dubito — nam ibi sine dubio, sicut de axiomatis, ita etiam de definitionibus et de uera definiendi ratione disputauerat —, mecum communicauit H. Menge. exstat in codd. Vatt. gr. 190 et 204 et in cod. Laur. 28, 10, ne plures.

5. τούτου Vat. 190. Ἀπολλώνιος Vat. 190. φησίν Vat. 190. εἶναί φησι Vat. 204. τούτους τοὺς τρεῖς ὅρους Ἀπολλωνίου φασὶν εἶναι Laur. 28, 10.

κέντρον αὐτοῦ τὴν τῆς ἀνωμαλίας ὡς ἐπὶ τὰ ἑπόμενα τῆς ἀπογείου περιφερείας, καὶ διαχθῇ τις ἀπὸ τῆς ὄψεως ἡμῶν εὐθεῖα τέμνουσα τὸν ἐπίκυκλον οὕτως ὥστε τοῦ ἀπολαμβανομένου αὐτῆς ἐν τῷ ἐπικύκλῳ τμήματος τὴν ἡμίσειαν πρὸς τὴν ἀπὸ τῆς ὄψεως ἡμῶν μέχρι τῆς κατὰ τὸ περίγειον τοῦ ἐπικύκλου τομῆς λόγον ἔχειν, ὃν τὸ τάχος τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος, τὸ γινόμενον σημεῖον ὑπὸ τῆς οὕτως διαχθείσης εὐθείας πρὸς τῇ περιγείῳ περιφερείᾳ τοῦ ἐπικύκλου διορίζει τάς τε ὑπολείψεις καὶ τὰς προηγήσεις, ὥστε κατ' αὐτοῦ γινόμενον τὸν ἀστέρα φαντασίαν ποιεῖσθαι στηριγμοῦ· ἐάν τε διὰ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως ἡ παρὰ τὸν ἥλιον ἀνωμαλία συμβαίνῃ τῆς τοιαύτης ἐπὶ μόνων τῶν πᾶσαν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ποιουμένων τριῶν ἀστέρων προχωρεῖν δυναμένης, τοῦ μὲν κέντρου τοῦ ἐκκέντρου περὶ τὸ τοῦ ζῳδιακοῦ κέντρον εἰς τὰ ἑπόμενα τῶν ζῳδίων ἰσοταχῶς τῷ ἡλίῳ φερομένου, τοῦ δὲ ἀστέρος ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου περὶ τὸ κέντρον αὐτοῦ εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζῳδίων ἰσοταχῶς τῇ τῆς ἀνωμαλίας παρόδῳ, καὶ διαχθῇ τις εὐθεῖα ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου κύκλου διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ζῳδιακοῦ, τουτέστι τῆς ὄψεως, οὕτως ἔχουσα ὥστε τὴν ἡμίσειαν αὐτῆς ὅλης πρὸς τὸ ἔλασσον τῶν ὑπὸ τῆς ὄψεως γινομένων τμημάτων λόγον ἔχειν, ὃν τὸ τάχος τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὸ τάχος τοῦ ἀστέρος, κατ' ἐκεῖνο τὸ σημεῖον γιγνόμενος ὁ ἀστήρ, καθ' ὃ τέμνει ἡ εὐθεῖα τὴν περίγειον τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν, τὴν τῶν στηριγμῶν φαντασίαν ποιήσεται.

De demonstrationibus Apollonii u. Delambre apud Halma II² p. 19.

Cfr. Procli hypotyposes p. 128 ed. Halma: *ἔστι μὲν οὖν Ἀπολλωνίου τοῦ Περγαίου τὸ εὕρημα, χρῆται δὲ αὐτῷ ὁ Πτολεμαῖος ἐν τῷ ιβ' τῆς συντάξεως.*

60. Hippolytus refutat. omnium haeres. IV, 8 p. 66 ed. Duncker:

*Καὶ ἀπόστημα δὲ ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς ἐπὶ τὸν σεληνιακὸν κύκλον ὁ μὲν Σάμιος Ἀρίσταρχος ἀναγράφει σταδίων .... ὁ δὲ Ἀπολλώνιος μυριάδων ϕ̄.*

De numero aut corrupto aut ab Hippolyto male intellecto u. Tannery Mémoires de la société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 2e série, V p. 254.

61. Ptolemaeus Chennus apud Photium cod. CXC p. 151b 18 ed. Bekker:

*Ἀπολλώνιος δ' ὁ ἐν τοῖς τοῦ Φιλοπάτορος χρόνοις ἐπ' ἀστρονομίᾳ περιβόητος γεγονὼς ε̄ ἐκαλεῖτο, διότι τὸ σχῆμα τοῦ ε̄ συμπεριφέρεται τῷ τῆς σελήνης, περὶ ἣν ἐκεῖνος μάλιστα ἠκρίβωτο.*

## Optica.

62. Fragmentum mathematicum Bobiense ed. Belger Hermes XVI p. 279 sq. (quae male legerat ille, emendaui Zeitschr. f. Math. u. Phys. XXVIII, hist. Abth. p. 124 sq.):

*Οἱ μὲν οὖν παλαιοὶ ὑπέλαβον τὴν ἔξαψιν ποιεῖσθαι περὶ τὸ κέντρον τοῦ κατόπτρου, τοῦτο δὲ ψεῦδος* Ἀπολλώνιος *μάλα δεόντως ..... (ἐν τῷ)* πρὸς τοὺς κατοπτρικοὺς *ἔδειξεν, καὶ περὶ τίνα δὲ τόπον ἡ ἐκπύρωσις ἔσται, διασεσάφηκεν ἐν τῷ* περὶ τοῦ πυρίου. *ὃν δὲ τρόπον ἀποδεικνύουσιν, οὐ δια....... δε, ὃ καὶ δυσέργως καὶ διὰ μακροτέρων συνίστησιν. οὐ μὴν ἀλλὰ τὰς μὲν ὑπ' αὐτοῦ κομιζομένας ἀποδείξεις παρῶμεν.*

# COMMENTARIA ANTIQUA.

# I.


# PAPPI
## LEMMATA IN CONICORUM LIBROS I—IV.

Pappus VII, 233—272 p. 918, 22—952, 23 ed. Hultsch.

### *Τοῦ α′.*

*α′. Ἔστω κῶνος, οὗ βάσις μὲν ὁ ΑΒ κύκλος, κορυφὴ δὲ τὸ Γ σημεῖον. εἰ μὲν οὖν ἰσοσκελής ἐστιν ὁ κῶνος, φανερόν, ὅτι πᾶσαι αἱ ἀπὸ τοῦ Γ πρὸς τὸν ΑΒ κύκλον προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, εἰ δὲ σκαληνός, ἔστω εὑρεῖν, τίς μεγίστη καὶ τίς ἐλαχίστη.*


*ἤχθω γαρ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου ἐπὶ τὸ τοῦ ΑΒ κύκλου ἐπίπεδον κάθετος καὶ πιπτέτω πρότερον ἐντὸς τοῦ ΑΒ κύκλου καὶ ἔστω ἡ ΓΔ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Ε, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΔΕ ἐκβεβλήσθω ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ τὰ Α, Β σημεῖα, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ, ΓΒ. λέγω, ὅτι μεγίστη μέν ἐστιν ἡ ΒΓ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΑΓ πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Γ πρὸς τὸν ΑΒ προσπιπτουσῶν.*




*προσβεβλήσθω γάρ τις καὶ ἑτέρα ἡ ΓΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΖ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΔ τῆς ΔΖ*

[Eucl. III, 7]. *κοινὴ δὲ ἡ ΓΔ, καί εἰσιν αἱ πρὸς τῷ Δ γωνίαι ὀρθαί· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΓ τῆς ΓΖ. κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ ΓΖ τῆς ΓΑ μείζων ἐστίν· ὥστε μεγίστη μέν ἐστιν ἡ ΓΒ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΓΑ.*

*β'. Ἀλλὰ δὴ πάλιν ἡ ἀπὸ τοῦ Γ κάθετος ἀγομένη πιπτέτω ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ ΑΒ κύκλου καὶ ἔστω ἡ ΓΑ, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Δ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΔ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Β, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΓ. λέγω, ὅτι μεγίστη μέν ἐστιν ἡ ΒΓ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΑΓ.*





*ὅτι μὲν οὖν μείζων ἡ ΓΒ τῆς ΓΑ, φανερόν* [Eucl. I, 19]. *διήχθω δέ τις καὶ ἑτέρα ἡ ΓΕ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΕ. ἐπεὶ διάμετρός ἐστιν ἡ ΑΒ, μείζων ἐστὶν τῆς ΑΕ* [Eucl. III, 15]. *καὶ αὐταῖς πρὸς ὀρθὰς ἡ ΑΓ* [Eucl. XI def. 3]· *μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΒ τῆς ΓΕ. ὁμοίως καὶ πασῶν. καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ μείζων δειχθήσεται ἡ ΕΓ τῆς ΓΑ. ὥστε μεγίστη μὲν ἡ ΒΓ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΓΑ τῶν ἀπὸ τοῦ Γ σημείου πρὸς τὸν ΑΒ κύκλον προσπιπτουσῶν εὐθειῶν.*

*γ'. Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων πιπτέτω ἡ κάθετος ἐκτὸς τοῦ κύκλου καὶ ἔστω ἡ ΓΔ, καὶ ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Ε ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΔΕ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ, ΒΓ. λέγω δή, ὅτι μεγίστη μέν ἐστιν ἡ ΒΓ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΑΓ πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Γ πρὸς τὸν ΑΒ κύκλον προσπιπτουσῶν εὐθειῶν.*

*ὅτι μὲν οὖν μείζων ἐστὶν ἡ ΒΓ τῆς ΓΑ, φανερόν* [Eucl. I, 19]. *λέγω δή, ὅτι καὶ πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Γ*

30. *δή*] *δέ* Hultsch.

πρὸς τὴν τοῦ *ΑΒ* κύκλου περιφέρειαν προσπιπτουσῶν. προσπιπτέτω γάρ τις καὶ ἑτέρα ἡ *ΓΖ*, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ *ΔΖ*. ἐπεὶ οὖν διὰ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ *ΒΔ*, μείζων ἐστὶν ἡ *ΔΒ* τῆς *ΔΖ* [Eucl. III, 8]. καί ἐστιν αὐταῖς ὀρθὴ ἡ *ΔΓ*, ἐπεὶ καὶ τῷ ἐπιπέδῳ [Eucl. XI def. 3]· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ *ΒΓ* τῆς *ΓΖ*. ὁμοίως καὶ πασῶν. μεγίστη μὲν ἄρα ἐστὶν ἡ *ΓΒ*· ὅτι δὲ καὶ ἡ *ΑΓ* ἐλαχίστη. ἐπεὶ γὰρ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ *ΑΔ* τῆς *ΔΖ*, καί ἐστιν αὐταῖς ὀρθὴ ἡ *ΔΓ*, ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ *ΑΓ* τῆς *ΓΖ*. ὁμοίως καὶ πασῶν. ἐλαχίστη ἄρα ἐστὶν ἡ *ΑΓ*, μεγίστη δὲ ἡ *ΒΓ* πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ *Γ* πρὸς τὴν τοῦ *ΑΒ* κύκλου περιφέρειαν προσπιπτουσῶν εὐθειῶν.




## *Εἰς τοὺς κωνικοὺς ὅρους.*


Ἐὰν ἀπό τινος σημείου πρὸς κύκλου περιφέρειαν [I p. 6, 2] εἰκότως ὁ Ἀπολλώνιος προστίθησιν καὶ ἐφ' ἑκάτερα ἐκβληθῇ [p. 6, 4], ἐπειδήπερ τοῦ τυχόντος κώνου γένεσιν δηλοῖ. εἰ μὲν γὰρ ἰσοσκελὴς ὁ κῶνος, περισσὸν ἦν προσεκβάλλειν διὰ τὸ τὴν φερομένην εὐθεῖαν αἰεί ποτε ψαύειν τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, ἐπειδήπερ πάντοτε τὸ σημεῖον ἴσον ἀφέξειν ἔμελλεν τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας. ἐπεὶ δὲ δύναται

23. καί] om. Hultsch. προσεκβληθῇ Hultsch.

*καὶ σκαληνὸς εἶναι ὁ κῶνος, ἔστιν δέ, ὡς προγέγραπται, ἐν κώνῳ σκαληνῷ μεγίστη τις καὶ ἐλαχίστη πλευρά, ἀναγκαίως προστίθησιν τὸ προσεκβεβλήσθω, ἵνα αἰεὶ προσεκβληθεῖσα ἡ ἐλαχίστη ἀεὶ τῆς μεγίστης αὔξηται προσεκβαλλομένης, ἕως ἴση γένηται τῇ μεγίστῃ καὶ ψαύσῃ κατ' ἐκεῖνο τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας.*

*δ'. Ἔστω γραμμὴ ἡ ΑΒΓ, καὶ θέσει ἡ ΑΓ, πᾶσαι δὲ αἱ ἀπὸ τῆς γραμμῆς ἐπὶ τὴν ΑΓ κάθετοι ἀγόμεναι οὕτως ἀγέσθωσαν, ὥστε τὸ ἀπὸ ἑκάστης αὐτῶν τετράγωνον ἴσον εἶναι τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τῶν τῆς βάσεως τμημάτων τῶν ὑφ' ἑκάστης ἀποτμηθέντων. λέγω, ὅτι κύκλου περιφέρειά ἐστιν ἡ ΑΒΓ, διάμετρος δὲ αὐτῆς ἐστιν ἡ ΑΓ.*

*ἤχθωσαν γὰρ ἀπὸ σημείων τῶν Δ, Β, Ε κάθετοι αἱ ΔΖ, ΒΗ, ΕΘ. τὸ μὲν ἄρα ἀπὸ ΔΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΖΓ, τὸ δὲ ἀπὸ ΒΗ τῷ ὑπὸ ΑΗΓ, τὸ δὲ ἀπὸ ΕΘ τῷ ὑπὸ ΑΘΓ. τετμήσθω δὴ δίχα ἡ ΑΓ κατὰ τὸ Κ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΚ, ΚΒ, ΚΕ.*





*ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ ΑΖΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΖΚ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπο ΑΚ* [Eucl. II, 5], *ἀλλὰ τῷ ὑπὸ ΑΖΓ ἴσον ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΔΖ, τὸ ἄρα ἀπὸ ΔΖ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΖΚ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΔΚ* [Eucl. I, 47], *ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΑΚ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΚ τῇ ΚΔ. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ ἑκατέρα τῶν ΒΚ, ΕΚ ἴση ἐστὶν τῇ ΑΚ ἢ τῇ ΚΓ· κύκλου ἄρα περιφέρειά ἐστιν ἡ ΑΒΓ*

3. *προσεκβληθῇ* Hultsch cum Halleio. 4. *ἀεὶ τῆς μεγίστης* et 5. *προσεκβαλλομένης* del. Halley. 9. *ἀγέσθωσαν*] del. Hultsch. 11. *τῶν ὑφ'*] scripsi, *ὑφ'* codd., *ἀφ'* Hultsch cum Halleio. *ἀποτμηθέντων*] scripsi, *ἀπὸ τῶν τμηθέντων* codd., *αὐτῶν τμηθέντων* Hultsch cum Halleio.

τοῦ περὶ κέντρον τὸ Κ, τουτέστιν τοῦ περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ.

ε΄. Τρεῖς παράλληλοι αἱ ΑΒ, ΓΔ, ΕΖ, καὶ διήχϑωσαν εἰς αὐτὰς δύο εὐϑεῖαι αἱ ΑΗΖΓ, ΒΗΕΔ· ὅτι γίνεται, ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒ, ΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΗΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ τετράγωνον.

ἐπεὶ γάρ ἐστιν [Eucl. VI, 4], ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΖΕ, τουτέστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒ, ΖΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΕ,




οὕτως ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΖ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΑΗΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΖ, ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΒ, ΖΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΗΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΖ. ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ ΖΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ [Eucl. VI, 4]· δι᾿ ἴσου ἄρα ἐστίν, ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒ, ΖΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ τετράγωνον, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΗΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ τετράγωνον.

ϛ΄. Ἔστω, ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ, καὶ τετμήσϑω ἡ ΑΓ δίχα κατὰ τὸ Ε σημεῖον· ὅτι γίνεται τὸ μὲν ὑπὸ ΒΕΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΕΓ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΔΓ τῷ ὑπὸ ΒΔΕ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΒΓ τῷ ὑπὸ ΕΒΔ.




ἐπεὶ γάρ ἐστιν, ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ, συνϑέντι καὶ τὰ ἡμίση τῶν ἡγουμένων καὶ ἀναστρέψαντί ἐστιν, ὡς ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΓ, οὕτως ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΓΕ τετραγώνῳ. κοινὸν ἀφῃρήσϑω τὸ ἀπὸ ΕΔ τετράγωνον· λοιπὸν [Eucl. II, 5] ἄρα τὸ

ὑπὸ ΑΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΒΔΕ [Eucl. II, 3]. ἐπεὶ δὲ τὸ ὑπὸ ΒΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΓ, ἀμφότερα ἀφῃρήσθω ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΕ τετραγώνου· λοιπὸν [Eucl. II, 6] ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΕΒΔ [Eucl. II, 2]. γίνεται ἄρα τὰ τρία.

ζʹ. Τὸ Α πρὸς τὸ Β τὸν συνημμένον λόγον ἐχέτω ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει τὸ Γ πρὸς τὸ Δ καὶ ἐξ οὗ ὃν ἔχει τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ· ὅτι καὶ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ τὸν συνημμένον λόγον ἔχει ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει τὸ Α πρὸς τὸ Β καὶ τὸ Ζ πρὸς τὸ Ε.

τῷ γὰρ τοῦ Ε πρὸς τὸ Ζ λόγῳ ὁ αὐτὸς πεποιήσθω ὁ τοῦ Δ πρὸς τὸ Η. ἐπεὶ οὖν ὁ τοῦ Α πρὸς τὸ Β συνῆπται ἔκ τε τοῦ τοῦ Γ πρὸς Δ καὶ τοῦ τοῖ Ε πρὸς Ζ, τουτέστιν τοῦ Δ πρὸς τὸ Η, ἀλλὰ ὁ συνημμένος ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει τὸ Γ πρὸς τὸ Δ καὶ ἐξ οὗ ὃν ἔχει τὸ Δ πρὸς τὸ Η ἐστιν ὁ τοῦ Γ πρὸς τὸ Η, ὡς ἄρα τὸ Α πρὸς τὸ Β, οὕτως τὸ Γ πρὸς τὸ Η. ἐπεὶ δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ τὸν συνημμένον λόγον ἔχει ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει τὸ Γ πρὸς τὸ Η καὶ ἐξ οὗ ὃν ἔχει τὸ Η πρὸς τὸ Δ, ἀλλ᾽ ὁ μὲν τοῦ Γ πρὸς τὸ Η ὁ αὐτὸς ἐδείχθη τῷ τοῦ Α πρὸς τὸ Β, ὁ δὲ τοῦ Η πρὸς τὸ Δ ἐκ τοῦ ἀνάπαλιν ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τοῦ Ζ πρὸς τὸ Ε, καὶ τὸ Γ ἄρα πρὸς τὸ Δ τὸν συνημμένον λόγον ἔχει ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει τὸ Α πρὸς τὸ Β καὶ ἐξ οὗ ὃν ἔχει τὸ Ζ πρὸς τὸ Ε.


ηʹ. Ἔστω δύο παραλληλόγραμμα τὰ ΑΓ, ΔΖ ἰσογώνια ἴσην ἔχοντα τὴν Β γωνίαν τῇ Ε γωνίᾳ· ὅτι γίνεται, ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕΖ, οὕτως

---


2. ἀμφότερα] ἑκάτερον Hultsch. 13. Δ] το Δ Hultsch. 14. Ζ] τὸ Ζ Hultsch cum Halleio.

τὸ ΑΓ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΔΖ παραλληλόγραμμον.

εἰ μὲν οὖν ὀρθαί εἰσιν αἱ Β, Ε γωνίαι, φανερόν· εἰ δὲ μή, ἤχθωσαν κάθετοι αἱ ΑΗ, ΔΘ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ μὲν Β γωνία τῇ Ε, ἡ δὲ Η ὀρθὴ τῇ Θ, ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΘ τριγώνῳ· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΗ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΘ [Eucl. VI, 4]. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΒΑ προς τὴν ΑΗ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΗ, ΒΓ, ὡς δὲ ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΘ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΔΕΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΘ, ΕΖ· ἔστιν ἄρα ἐναλλάξ, ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕΖ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΗ, ΒΓ, τουτέστιν τὸ ΑΓ παραλληλόγραμμον, πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΘ, ΕΖ, τουτέστιν πρὸς τὸ ΔΖ παραλληλόγραμμον.




θ'. Ἔστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, ἔστω δὲ παράλληλος ἡ ΒΓ τῇ ΔΕ, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΓΑ ἴσον κείσθω τὸ ὑπὸ ΖΑΕ· ὅτι, ἐὰν ἐπιζευχθῶσιν αἱ ΔΓ, ΒΖ, γίνεται παράλληλος ἡ ΒΖ τῇ ΔΓ.




τοῦτο δέ ἐστιν φανερόν. ἐπεὶ γάρ ἐστιν, ὡς ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΕ, ὡς δὲ ἡ ΓΑ προς τὴν ΑΕ, οὕτως ἐστὶν ἐν παραλλήλῳ ἡ ΒΑ πρὸς ΑΔ [Eucl. VI, 4], καὶ ὡς ἄρα ἡ ΖΑ πρὸς ΑΓ,


---

19. τῇ ΒΓ ἡ ΔΕ coni. Hultsch.

οὕτως ἡ ΒΑ πρὸς ΑΔ· παράλληλοι ἄρα εἰσὶν αἱ ΔΓ, ΒΖ [Eucl. VI, 4].

ι'. Ἔστω τρίγωνον μὲν τὸ ΑΒΓ, τραπέζιον δὲ τὸ ΔΕΖΗ, ὥστε ἴσην εἶναι τὴν ὑπὸ ΑΒΓ γωνίαν τῇ ὑπὸ ΔΕΖ γωνίᾳ· ὅτι γίνεται, ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΗ, ΕΖ καὶ τῆς ΔΕ, οὕτως τὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ΔΕΖΗ.

ἤχθωσαν κάθετοι αἱ ΑΘ, ΔΚ. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ ΑΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΖ γωνίᾳ, ἡ δὲ Θ ὀρθὴ τῇ Κ ὀρθῇ ἴση, ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΘ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς ΔΚ [Eucl. VI, 4]. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΒΑ πρὸς ΑΘ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΘ, ΒΓ, ὡς δὲ ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΚ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΗ, ΕΖ καὶ τῆς ΔΕ πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΗ, ΕΖ καὶ τῆς ΔΚ. καί ἐστιν τοῦ μὲν ὑπὸ ΑΘ, ΒΓ ἥμισυ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, τοῦ δὲ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΗ, ΕΖ καὶ τῆς ΔΚ ἥμισυ τὸ ΔΕΖΗ τραπέζιον· ἔστιν ἄρα, ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΗ, ΕΖ καὶ τῆς ΔΕ, οὕτως τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖΗ τραπέζιον.





καὶ ἐὰν ᾖ δὲ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ καὶ παραλληλόγραμμον τὸ ΔΖ, γίνεται, ὡς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖΗ παραλληλόγραμμον, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ δὶς ὑπὸ ΔΕΖ, κατὰ τὰ αὐτά. καὶ φανερὸν ἐκ τούτων, ὅτι τὸ μὲν ὑπὸ ΑΒΓ, ἐὰν ᾖ παραλληλό-

8. ἐπεὶ οὖν ἴση coni. Hultsch. 24. — p. 151, 4] suspecta Hultschio. 24. δέ] del. Hultsch.

γραμμον τὸ ΔΖ ἴσον τῷ ΑΒΓ τριγώνῳ, ἴσον γίνεται τῷ δὶς ὑπὸ ΔΕΖ, ἐπὶ δὲ τοῦ τραπεζίου ἴσον γίνεται τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΗ, ΕΖ καὶ τῆς ΔΕ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ια'. Ἔστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἐκβληθείσης τῆς ΓΑ διήχθω τις τυχοῦσα ἡ ΔΕ, καὶ αὐτῇ μὲν παράλληλος ἤχθω ἡ ΑΗ, τῇ δὲ ΒΓ ἡ ΛΖ· ὅτι γίνεται, ὡς τὸ ἀπὸ ΑΗ τετράγωνον πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΛ τετράγωνον.

κείσθω τῷ μὲν ὑπὸ ΒΗΓ ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΗΚ, τῷ δὲ ὑπὸ ΔΖΘ ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΖΛ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΚ, ΘΛ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ Γ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΚΗ, ἡ δὲ ὑπὸ ΔΑΛ ἐν




κύκλῳ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΖΘΛ [Eucl. III, 35; III, 21], καὶ ἡ ὑπὸ ΗΚΒ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΖΘΛ γωνίᾳ. ἀλλὰ καὶ ἡ πρὸς τῷ Η γωνία ἴση ἐστὶν τῇ πρὸς τῷ Ζ· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΚ, οὕτως ἡ ΛΖ πρὸς τὴν ΖΘ [Eucl. VI, 4]. ἐπεὶ δέ ἐστιν, ὡς ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΒ, οὕτως ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΕΒ, ὡς δὲ ἡ ΘΕ πρὸς ΕΒ, οὕτως ἐστὶν ἐν παραλλήλῳ ἡ ΖΘ πρὸς ΖΑ [Eucl. VI, 4], ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΒ, οὕτως ἡ ΘΖ πρὸς ΖΑ. ἐπεὶ οὖν ἐστιν, ὡς μὲν ἡ ΑΗ πρὸς ΗΒ, οὕτως ἡ ΘΖ πρὸς ΖΑ, ὡς δὲ ἡ ΒΗ πρὸς ΗΚ, οὕτως ἄλλη τις ἡ ΛΖ πρὸς τὴν ἡγουμένην τὴν ΖΘ, δι' ἴσου ἄρα ἐν τεταραγμένῃ ἀναλογίᾳ, ὡς ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΚ, οὕτως ἡ ΛΖ πρὸς τὴν ΖΑ [Eucl. V, 23]. ἀλλ' ὡς


1. ἴσον (pr.)] om. codd., καὶ ἴσον Hultsch cum Halleio. τῷ ΑΒΓ τριγώνῳ] Hultsch cum Halleio, om. codd. 4. ἔδει δεῖξαι] : ∼ codd.

*μὲν ἡ ΑΗ πρὸς ΗΚ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΗΚ, τουτέστιν πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ, ὡς δὲ ἡ ΔΖ πρὸς ΖΑ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΔΖΑ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΔΖΘ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ· ἔστιν ἄρα, ὡς τὸ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΖΘ πρὸς τὸ ἀπὶ ΖΑ.*

*διὰ δὲ τοῦ συνημμένου. ἐπεὶ ὁ μὲν τῆς ΑΗ πρὸς ΗΒ λόγος ἐστὶν ὁ τῆς ΘΕ πρὸς ΕΒ, τουτέστιν ὁ τῆς ΘΖ πρὸς ΖΑ* [Eucl. VI, 4], *ὁ δὲ τῆς ΑΗ πρὸς τὴν ΗΓ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΔΕ πρὸς ΕΓ, τουτέστιν τῷ τῆς ΔΖ πρὸς ΖΑ* [Eucl. VI, 4], *ὁ ἄρα συνημμένος ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΑΗ πρὸς ΗΒ καὶ τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΑΗ πρὸς ΗΓ, ὅς ἐστιν ὁ τοῦ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ, ὁ αὐτός ἐστιν τῷ συνημμένῳ ἔκ τε τοῦ τῆς ΘΖ πρὸς ΖΑ καὶ τοῦ τῆς ΔΖ πρὸς ΖΑ, ὅς ἐστιν ὁ τοῦ ὑπὸ ΔΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ τετράγωνον.*

## *Τοῦ β′.*

*α′. Δύο δοθεισῶν τῶν ΑΒ, ΒΓ καὶ εὐθείας τῆς ΔΕ εἰς τὰς ΑΒ, ΒΓ ἐναρμόσαι εὐθεῖαν ἴσην τῇ ΔΕ καὶ παράλληλον αὐτῇ.*





*τοῦτο δὲ φανερόν. ἐὰν γὰρ διὰ τοῦ Ε τῇ ΑΒ παράλληλον ἀγάγωμεν τὴν ΕΓ, διὰ δὲ τοῦ Γ τῇ ΔΕ παράλληλος ἀχθῇ ἡ ΓΑ, ἔσται διὰ τὸ παραλληλόγραμμον εἶναι τὸ ΑΓΕΔ ἡ ΑΓ ἴση τῇ ΔΕ* [Eucl. I, 34] *καὶ παράλληλος· καὶ ἐνήρμοσται εἰς τὰς δοθείσας εὐθείας τὰς ΑΒ, ΒΓ.*

*β′. Ἔστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ, καὶ ἔστω, ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς ΕΖ, καὶ*


παράλληλος ἡ μὲν *ΑΒ* τῇ *ΔΕ*, ἡ δὲ *ΒΓ* τῇ *ΕΖ*· ὅτι καὶ ἡ *ΑΓ* τῇ *ΔΖ* ἐστιν παράλληλος.

ἐκβεβλήσθω ἡ *ΒΓ* καὶ συμπιπτέτω ταῖς *ΔΕ*, *ΔΖ* κατὰ τὰ *Η*, *Θ*. ἐπεὶ οὖν ἐστιν, ὡς ἡ *ΑΒ* πρὸς τὴν




*ΒΓ*, οὕτως ἡ *ΔΕ* πρὸς *ΕΖ*, καί εἰσιν ἴσαι αἱ *Β*, *Ε* γωνίαι διὰ τὸ εἶναι δύο παρὰ δύο, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ *Γ* τῇ *Ζ* [Eucl. VI, 6], τουτέστιν τῇ *Θ* [Eucl. I, 29] διὰ τὸ παραλλήλους εἶναι τὰς *ΕΖ*, *ΗΘ*· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ *ΑΓ* τῇ *ΔΘ* [Eucl. I, 28].

γ'. Εὐθεῖα ἡ *ΑΒ*, καὶ ἔστωσων ἴσαι αἱ *ΑΓ*, *ΔΒ*, καὶ μεταξὺ τῶν *Γ*, *Δ* εἰλήφθω τυχὸν σημεῖον τὸ *Ε*· ὅτι τὸ ὑπὸ *ΑΔΒ* μετὰ τοῦ ὑπὸ *ΓΕΔ* ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ *ΑΕΒ*.





τετμήσθω ἡ *ΓΔ* δίχα, ὅπως ἂν ἔχῃ ὡς πρὸς τὸ *Ε* σημεῖον, κατὰ τὸ *Ζ*. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ *ΑΔΒ* μετὰ τοῦ ἀπὸ *ΖΔ* ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ *ΖΒ* [Eucl. II, 5], ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ *ΖΔ* ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ *ΓΕΔ* μετὰ τοῦ ἀπὸ *ΖΕ* [Eucl. II, 5], τῷ δὲ ἀπὸ *ΖΒ* ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ *ΑΕΒ* μετὰ τοῦ ἀπὸ *ΖΕ* [Eucl. II, 5], τὸ ἄρα ὑπὸ *ΑΔΒ* μετὰ τοῦ ὑπὸ *ΓΕΔ* καὶ τοῦ ἀπὸ *ΖΕ* ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ *ΑΕΒ* καὶ τῷ ἀπὸ *ΖΕ*. κοινὸν ἀφῃρήσθω τὸ ἀπὸ *ΖΕ*· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ *ΑΔΒ* μετὰ τοῦ ὑπὸ *ΓΕΔ* ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ *ΑΕΒ*.

δ'. Εὐθεῖα ἡ *ΑΒ*, καὶ ἔστωσαν ἴσαι αἱ *ΑΓ*, *ΔΒ*, καὶ μεταξὺ τῶν *Γ*, *Δ* εἰλήφθω τυχὸν σημεῖον τὸ *Ε*·

---


16. ὅπως — 17. σημεῖον] del. Hultsch.

ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΒ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ τῶν ΓΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΔΑΓ.




τετμήσθω γὰρ ἡ ΓΔ δίχα, ὅπως ἂν ἔχῃ ὡς πρὸς τὸ Ε σημεῖον, κατὰ τὸ Ζ· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΖ τῇ ΖΒ ἴση ἐστίν. τὸ μὲν ἄρα ὑπὸ ΑΕΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΕΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΑΖ [Eucl. II, 5], τὸ δὲ ὑπὸ ΔΑΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΑΖ [Eucl. II, 6]· ὥστε τὸ ὑπὸ ΑΕΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΕΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΔΑΓ καὶ τῷ ἀπὸ ΓΖ. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ ΓΖ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΓΕΔ καὶ τῷ ἀπὸ ΕΖ [Eucl. II, 5]· καὶ κοινὸν ἀφῃρήσθω τὸ ἀπὸ ΕΖ τετράγωνον· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΕΒ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΓΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΔΑΓ.

ε'. Ἔστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ, καὶ ἔστω ἴση ἡ μὲν Γ τῇ Ζ, μείζων δὲ ἡ Β τῆς Ε· ὅτι ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ.





συνεστάτω τῇ Ε γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ ΓΒΗ· ἔστιν δὲ καὶ ἡ Γ τῇ Ζ ἴση· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΒΓ πρὸς ΓΗ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ [Eucl. VI, 4]. ἀλλὰ ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ΒΓ πρὸς ΓΗ [Eucl. V, 8]· καὶ ἡ ΒΓ ἄρα πρὸς ΓΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ.

ϛ'. Ἐχέτω δὴ πάλιν ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ μείζονα λόγον

3. ὅπως — 4. σημεῖον] del. Hultsch.


ἤπερ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ, ἴση δὲ ἔστω ἡ Γ γωνία τῇ Ζ· ὅτι πάλιν γίνεται ἐλάσσων ἡ Β γωνία τῆς Ε γωνίας.

ἐπεὶ γὰρ ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ, ἐὰν ἄρα ποιῶ, ὡς τὴν ΒΓ πρὸς τὴν ΓΑ, οὕτως τὴν ΕΖ πρός τινα, ἔσται πρὸς ἐλάσσονα τῆς ΖΔ [Eucl. V, 10]. ἔστω πρὸς τὴν ΖΗ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΗ. καὶ περὶ ἴσας γωνίας ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραί· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ Β γωνία τῇ ὑπὸ ΖΕΗ [Eucl. VI, 6] ἐλάσσονι οὔσῃ τῆς Ε.





ζ'. Ἔστω ὅμοια τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ, καὶ διήχθωσαν αἱ ΑΗ, ΔΘ οὕτως, ὥστε εἶναι, ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ· ὅτι γίνεται ὅμοιον καὶ τὸ ΑΗΓ τρίγωνον τῷ ΔΘΖ τριγώνῳ.

ἐπεὶ γάρ ἐστιν, ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ, ἀλλ' ὁ μὲν τοῦ ὑπὸ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΑ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ καὶ τοῦ τῆς ΗΓ πρὸς ΓΑ, ὁ δὲ τοῦ ὑπὸ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΕΖ πρὸς ΖΔ καὶ τοῦ τῆς ΘΖ πρὸς ΖΔ, ὧν ὁ τῆς ΒΓ πρὸς ΓΑ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΕΖ πρὸς ΖΔ [Eucl. VI, 4] διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων, λοιπὸν ἄρα ὁ τῆς ΗΓ πρὸς ΓΑ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΘΖ πρὸς ΖΔ. καὶ περὶ ἴσας γωνίας· ὅμοιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΓΗ τρίγωνον τῷ ΔΖΘ τριγώνῳ [Eucl. VI, 6].



η'. Διὰ μὲν οὖν τοῦ συνημμένου λόγου, ὡς προγέγραπται, ἔστω δὲ νῦν ἀποδεῖξαι μὴ προσχρησάμενον τῷ συνημμένῳ λόγῳ.

κείσθω τῷ μὲν ὑπὸ ΒΓΗ ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΓΚ· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΚ, οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΗ. τῷ δὲ ὑπὸ ΕΖΘ ἴσον κείσθω τὸ ὑπὸ ΔΖΛ· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΕΖ πρὸς ΖΛ, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς ΖΘ. ὑπόκειται δέ, ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΑΓΚ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, τουτέστιν ὡς ἡ ΚΓ πρὸς ΓΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖΘ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΔΖΛ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΖ, τουτέστιν ἡ ΛΖ πρὸς ΖΔ. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ [Eucl. VI, 4] διὰ τὴν ὁμοιότητα· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΓ πρὸς ΓΚ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΛ [Eucl. V, 22]. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΒΓ πρὸς ΓΚ, οὕτως ἐδείχθη ἡ ΑΓ πρὸς ΓΗ, ὡς δὲ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΛ, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς ΖΘ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΑΓ πρὸς ΓΗ, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς ΖΘ. καὶ περὶ ἴσας γωνίας· ὅμοιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΓΗ τρίγωνον τῷ ΔΖΘ τριγώνῳ [Eucl. VI, 6].





ὁμοίως καὶ τὸ ΑΗΒ τῷ ΔΘΕ, ὅτι καὶ τὸ ΑΒΓ τῷ ΔΕΖ.

θ'. Ἔστω ὅμοιον τὸ μὲν ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ, το δὲ ΑΗΒ τῷ ΔΕΘ· ὅτι γίνεται, ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπο ΓΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΖ.

---


23. ὁμοίως — 24. ΔΕΖ] interpolatori tribuit Hultsch. 28. ΔΖ] ΖΔ Hultsch cum Halleio.

ἐπεὶ γὰρ διὰ τὴν ὁμοιότητα ἴση ἐστὶν ὅλη μὲν ἡ *Α* ὅλῃ τῇ *Δ*, ἡ δὲ ὑπὸ *ΒΑΗ* τῇ ὑπὸ *ΕΔΘ*, λοιπὴ




ἄρα ἡ ὑπὸ *ΗΑΓ* λοιπῇ τῇ ὑπὸ *ΘΔΖ* ἐστιν ἴση. ἀλλὰ καὶ ἡ *Γ* τῇ *Ζ*· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ *ΗΓ* πρὸς τὴν *ΓΑ*, οὕτως ἡ *ΘΖ* πρὸς *ΖΔ*. ἀλλὰ καί, ὡς ἡ *ΒΓ* πρὸς τὴν *ΓΑ*, οὕτως ἦν ἡ *ΕΖ* πρὸς *ΖΔ*· καὶ ὁ συνημμένος ἄρα τῷ συνημμένῳ ἐστὶν ὁ αὐτός. ἔστιν ἄρα, ὡς τὸ ὑπὸ *ΒΓΗ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓΑ*, οὕτως τὸ ὑπὸ *ΕΖΘ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΖΔ*.

ι′. Ἄλλως μὴ διὰ τοῦ συνημμένου. κείσθω τῷ μὲν ὑπὸ *ΒΓΗ* ἴσον τὸ ὑπὸ *ΑΓΚ*, τῷ δὲ ὑπὸ *ΕΖΘ* ἴσον τὸ ὑπὸ *ΔΖΛ*· ἔσται πάλιν, ὡς μὲν ἡ *ΒΓ* πρὸς




*ΓΚ*, οὕτως ἡ *ΑΓ* πρὸς *ΓΗ*, ὡς δὲ ἡ *ΕΖ* πρὸς *ΖΛ*, οὕτως ἡ *ΔΖ* πρὸς *ΖΘ*. καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ τῷ ἐπάνω δείξομεν, ὅτι ἐστίν, ὡς ἡ *ΑΓ* πρὸς *ΓΗ*, οὕτως ἡ *ΔΖ* πρὸς *ΖΘ*· καὶ ὡς ἄρα ἡ *ΒΓ* πρὸς *ΓΚ*, οὕτως ἡ *ΕΖ* πρὸς *ΖΛ*. ἀλλὰ καί, ὡς ἡ *ΒΓ* πρὸς *ΓΑ*, οὕτως ἡ *ΕΖ* πρὸς *ΖΔ* [Eucl. VI, 4] διὰ τὴν ὁμοιότητα· δι᾽ ἴσου ἄρα ἐστίν, ὡς ἡ *ΚΓ* πρὸς *ΓΑ*, τουτέστιν ὡς τὸ ὑπὸ *ΚΓΑ*, ὅ ἐστιν τὸ ὑπὸ *ΒΓΗ*, πρὸς τὸ ἀπὸ *ΑΓ*, οὕτως ἡ *ΛΖ* πρὸς *ΖΔ*, τουτέστιν τὸ ὑπὸ *ΛΖΔ*, ὅ ἐστιν τὸ ὑπὸ *ΕΖΘ*, πρὸς τὸ ἀπὸ *ΖΔ*· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.


ὁμοίως δὴ δείξομεν, καὶ ἐὰν ᾖ, ὡς τὸ ὑπὸ *ΒΓΗ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΑΓ*, οὕτως τὸ ὑπὸ *ΕΖΘ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΖΔ*,

---

17. τοῖς ἐπάνω coni. Hultsch. 27. ἔδει δεῖξαι] :∾ codd.

καὶ ὅμοιον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ, ὅτι καὶ τὸ ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΘ τριγώνῳ ὅμοιον.


ια΄. Ἔστω δύο ὅμοια τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ, καὶ κάθετοι ἤχθωσαν αἱ ΑΗ, ΔΘ· ὅτι ἐστίν, ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ.




τοῦτο δὲ φανερόν, ὅτι ὅμοιον γίνεται τοῖς πρὸ αὐτοῦ.

ιβ΄. Ἔστω ἴση ἡ μὲν Β γωνία τῇ Ε, ἐλάσσων δὲ ἡ Α τῆς Δ· ὅτι ἡ ΓΒ πρὸς ΒΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ΖΕ πρὸς ΕΔ.

ἐπεὶ γὰρ ἐλάσσων ἡ Α γωνία τῆς Δ, συνεστάτω αὐτῇ ἴση ἡ ὑπὸ ΕΔΗ· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΒΑ, οὕτως ἡ ΕΗ πρὸς ΕΔ [Eucl. VI, 4]. ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΗ πρὸς ΕΔ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ΖΕ πρὸς ΕΔ [Eucl. V, 8]· καὶ ἡ ΓΒ ἄρα πρὸς τὴν ΒΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ΖΕ πρὸς τὴν ΕΔ. καὶ πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα τῇ αὐτῇ ἀγωγῇ δείξομεν.





ιγ΄. Ἔστω, ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπο ΔΘ, καὶ ἡ μὲν ΒΗ τῇ ΗΓ ἔστω ἴση, ἡ δὲ ΓΗ πρὸς ΗΑ ἐλάσσονα λόγον ἐχέτω ἤπερ ἡ ΖΘ πρὸς ΘΔ· ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΖΘ τῆς ΘΕ.

ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀπὸ ΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΑ ἐλάσσονα

17. ἀλλ' ἐπεὶ ἡ ΕΗ coni. Hultsch.


λόγον ἔχει ἤπερ τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ, ἀλλὰ τὸ ἀπὸ ΓΗ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΒΗΓ, τὸ ἄρα ὑπο ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ. ἀλλ' ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ




πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ, οὕτως ὑπέκειτο το ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ· καὶ τὸ ὑπὸ ΕΘΖ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ. μεῖζον ἄρα ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΖΘ τοῦ ὑπὸ ΕΘΖ [Eucl. V, 10]· ὥστε μείζων ἐστὶν ἡ ΖΘ τῆς ΘΕ.

## Τοῦ γ'.


α'. Καταγραφὴ ἡ ΑΒΓΔΕΖΗ, ἔστω δὲ ἴση ἡ ΒΗ τῇ ΗΓ· ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ ΕΖ τῇ ΒΓ.





ἤχθω διὰ τοῦ Α τῇ ΒΓ παράλληλος ἡ ΘΚ, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΒΖ, ΓΕ ἐπὶ τὰ Κ, Θ σημεῖα. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΒΗ τῇ ΗΓ, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΘΑ τῇ ΑΚ [Eucl. VI, 4]. ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΘΑ, τουτέστιν ὡς ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΑ [Eucl. VI, 4], οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΚΑ [Eucl. V, 7], τουτέστιν ἡ ΓΖ πρὸς ΖΑ [Eucl. VI, 4]· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΒΓ [Eucl. VI, 2].

β'. Ἔστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ ἴσας ἔχοντα τὰς Α, Δ γωνίας, ἴσον δὲ ἔστω τὸ ὑπὸ ΒΑΓ τῷ ὑπὸ ΕΔΖ· ὅτι καὶ τὸ τρίγωνον τῷ τριγώνῳ ἐστὶν ἴσον.

ἤχθωσαν κάθετοι αἱ ΒΗ, ΕΘ· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΗΒ πρὸς τὴν ΒΑ, οὕτως ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΕΔ [Eucl. VI, 4]· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΒΗ, ΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΑ, ΑΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΘ, ΔΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΔΖ. ἐναλλάξ, ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗ, ΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΘ, ΔΖ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΒΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΔΖ. ἴσον δέ ἐστιν τὸ ὑπὸ ΒΑΓ τῷ ὑπὸ ΕΔΖ· ἴσον ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ὑπὸ ΒΗ, ΑΓ τῷ ὑπὸ ΕΘ, ΔΖ. ἀλλὰ τοῦ μὲν ὑπὸ ΒΗ, ΑΓ ἥμισύ ἐστιν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, τοῦ δὲ ὑπὸ ΕΘ, ΔΖ ἥμισύ ἐστιν τὸ ΔΕΖ τρίγωνον· καὶ τὸ ΑΒΓ ἄρα τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ ἴσον ἐστίν.





φανερὸν δή, ὅτι καὶ τὰ διπλᾶ αὐτῶν παραλληλόγραμμα ἴσα ἐστίν.

γ'. Τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ παράλληλος ἡ ΔΕ τῇ ΒΓ· ὅτι ἐστίν, ὡς τὸ ἀπὸ ΒΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΔ, οὕτως τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΕ τρίγωνον.

ἐπεὶ γὰρ ὅμοιόν ἐστιν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΑΔΕ τριγώνῳ, τὸ ἄρα ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΕ τρίγωνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ΒΑ πρὸς ΑΔ [Eucl. VI, 19]. ἀλλὰ καὶ τὸ ἀπὸ ΒΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΔ διπλασίονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ· ἔστιν ἄρα, ὡς τὸ ἀπὸ




---

9. ἐναλλάξ — 11. ΕΔΖ] om. Hultsch cum Halleio.

*ΒΑ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΑΔ*, οὕτως τὸ *ΑΒΓ* τρίγωνον πρὸς τὸ *ΑΔΕ* τρίγωνον.

δ'. Ἴσαι αἱ *ΑΒ*, *ΓΔ* καὶ τυχὸν σημεῖον τὸ *Ε*· ὅτι τὸ ὑπὸ *ΓΕΒ* τοῦ ὑπὸ *ΓΑΒ* ὑπερέχει τῷ ὑπὸ *ΔΕΑ*.





τετμήσθω ἡ *ΒΓ* δίχα τῷ *Ζ*· τὸ *Ζ* ἄρα διχοτομία ἐστὶν καὶ τῆς *ΑΔ*. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ *ΓΕΒ* μετὰ τοῦ ἀπὸ *ΒΖ* ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ *ΕΖ* [Eucl. II, 6], ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ *ΔΕΑ* μετὰ τοῦ ἀπὸ *ΑΖ* ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ *ΕΖ*, καί ἐστιν τὸ ἀπὸ *ΑΖ* ἴσον τῷ ὑπὸ *ΓΑΒ* μετα τοῦ ἀπὸ *ΒΖ*, κοινὸν ἐκκεκρούσθω τὸ ἀπὸ *ΒΖ*· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ *ΓΕΒ* ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ *ΓΑΒ* καὶ τῷ ὑπὸ *ΔΕΑ*. ὥστε τὸ ὑπὸ *ΓΕΒ* τοῦ ὑπὸ *ΓΑΒ* ὑπερέχει τῷ ὑπὸ *ΔΕΑ*· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ε'. Ἐὰν δὲ τὸ σημεῖον ᾖ μεταξὺ τῶν *Α*, *Β* σημείων, τὸ ὑπὸ *ΓΕΒ* τοῦ ὑπὸ *ΓΑΒ* ἔλασσον ἔσται τῷ αὐτῷ χωρίῳ, οὗπέρ ἐστιν κατὰ τὰ αὐτὰ ἡ ἀπόδειξις.

ἐὰν δὲ τὸ σημεῖον ᾖ μεταξὺ τῶν *Β*, *Γ*, τὸ ὑπὸ *ΓΕΒ* τοῦ ὑπὸ *ΑΕΔ* ἔλασσον ἔσται τῷ ὑπὸ *ΑΒΔ* τῇ αὐτῇ ἀγωγῇ.

ϛ'. Ἴση ἡ *ΑΒ* τῇ *ΒΓ*, καὶ δύο σημεῖα τὰ *Δ*, *Ε*· ὅτι τὸ τετράκις ἀπὸ τῆς *ΑΒ* τετράγωνον ἴσον ἐστὶν τῷ δὶς ὑπὸ *ΑΔΓ* μετὰ τοῦ δὶς ὑπὸ *ΑΕΓ* καὶ δὶς τῶν ἀπὸ *ΒΔ*, *ΒΕ* τετραγώνων.




τοῦτο δὲ φανερόν· τὸ μὲν γὰρ δὶς ἀπὸ *ΑΒ* διὰ τῶν διχοτομιῶν ἴσον ἐστὶν τῷ τε δὶς ὑπὸ *ΑΔΓ* καὶ

---

9. καί ἐστιν] ἔστιν ἄρα καί coni. Hultsch. 14. ἔδει δεῖξαι] :∾ codd.


τῷ δὶς ἀπὸ ΔΒ, τὸ δὲ δὶς ἀπὸ ΑΒ ἴσον ἐστὶν τῷ τε δὶς ὑπὸ ΑΕΓ καὶ τῷ δὶς ἀπὸ ΕΒ τετραγώνῳ [Eucl. II, 5].

ζ'. Ἴση ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ, καὶ σημεῖον τὸ Ε· ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΔ τετράγωνα ἴσα τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΕ, ΕΓ τετραγώνοις καὶ τῷ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΓΔ.




τετμήσθω δίχα ἡ ΒΓ κατὰ τὸ Ζ. ἐπεὶ οὖν τὸ δὶς ἀπὸ τῆς ΔΖ ἴσον ἐστὶν τῷ τε δὶς ὑπὸ ΑΓΔ καὶ δὶς ἀπὸ ΓΖ [Eucl. II, 5], κοινοῦ προστεθέντος τοῦ δὶς ἀπὸ ΕΖ ἴσον ἐστὶν τό τε δὶς ὑπὸ ΑΓΔ καὶ τα δὶς ἀπὸ τῶν ΕΖΓ τοῖς δὶς ἀπὸ τῶν ΔΖ, ΖΕ τετραγώνοις. ἀλλὰ τοῖς μὲν δὶς ἀπὸ τῶν ΔΖ, ΖΕ ἴσα ἐστὶν τὰ ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΔ τετράγωνα, τοῖς δὲ δὶς ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΕ ἴσα ἐστὶν τὰ ἀπὸ τῶν ΒΕ, ΕΓ τετράγωνα [Eucl. II, 10]· τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΔ τετράγωνα ἴσα ἐστὶν τοῖς τε ἀπὸ τῶν ΒΕ, ΕΓ τετραγώνοις καὶ τῷ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΓΔ.

η'. Ἔστω τὸ ὑπὸ ΒΑΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΔΑ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ΔΒ.





κοινὸν γὰρ ἀφῃρήσθω τὸ ἀπὸ ΓΔ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΒΑΓ ἴσον ἐστὶ τοῖς ὑπὸ τῶν ΔΑΓ, ΑΓΔ [Eucl. II, 2; II, 3]. ἐπεὶ δὲ τὸ ὑπὸ ΒΑΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΔΑΓ καὶ τῷ ὑπὸ ΒΔ, ΑΓ [Eucl. II, 1], κοινὸν ἀφῃρήσθω τὸ ὑπὸ ΔΑΓ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΓ, ΔΒ

---

8. κοινοῦ] Halley, ἀλλὰ κοινοῦ codd., κοινοῦ ἄρα coni. Hultsch. 10. ΕΖΓ] ΓΖ, ΖΕ Hultsch cum Halleio. 19. λοιπόν — 23. ΔΑΓ] om. codd., suppleuit Hultsch praeeunte Halleio (ante τοῖς lin. 20 addunt: τῇ τῶν ἀπὸ ΑΔ, ΔΓ ὑπεροχῇ, τουτέστιν).

ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΔΓΑ. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΓ τῇ ΔΒ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

θ'. Ἔστω τὸ ὑπὸ ΑΓΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΔΒ τετραγώνῳ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΔΒ.




κείσθω τῇ ΓΔ ἴση ἡ ΔΕ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΓΒΕ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΕ, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΓΔ, ἴσον τῷ ἀπὶ ΔΒ [Eucl. II, 6], τουτέστιν τῷ ὑπὸ ΒΓΑ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΔ· ὥστε τὸ ὑπὸ ΓΒΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΒΓΑ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΕΒ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΓΔ τῇ ΔΕ· ὅλη ἄρα ἡ ΑΔ ὅλη τῇ ΔΒ ἴση ἐστίν.

ι'. Ἔστω πάλιν τὸ ὑπὸ ΒΑΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΒ ἴσον τῷ ἀπὸ ΑΔ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ΔΒ.





κείσθω τῇ ΔΒ ἴση ἡ ΑΕ. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ ΒΑΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΒ, τουτέστιν τοῦ ἄπο ΕΑ, ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΑΔ τετραγώνῳ, κοινὸν ἀφῃρήσθω τὸ ὑπὸ ΔΑΓ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΒΔ, ΑΓ [Eucl. II, 1], τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΕΑΓ, μετὰ τοῦ ἀπὸ ΕΑ, ὅ ἐστιν τὸ ὑπὸ ΓΕΑ [Eucl. II, 3], ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΔΓ [Eucl. II, 2]. ἴση ἄρα [Eucl. VI, 16; V, 18; V, 9] ἐστὶν ἡ ΕΑ, τουτέστιν ἡ ΒΔ, τῇ ΔΓ.

ια'. Εὐθεῖα ἡ ΑΒ, ἐφ' ἧς γ̄ σημεῖα τὰ Γ, Δ, Ε οὕτως, ὥστε ἴσην μὲν εἶναι τὴν ΒΕ τῇ ΕΓ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΕΔ τῷ ἀπὸ ΕΓ· ὅτι γίνεται, ὡς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΓ, οὕτως ἡ ΒΔ πρὸς ΔΓ.

---

2. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] ο codd. 7. ΒΓΑ] ΕΑΓ codd., ΑΓΒ Hultsch cum Halleio. 8. ΒΓΑ] ΑΓΒ Hultsch cum Halleio.

*ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΑΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΓ, ἀνάλογον* [Eucl. VI, 17] *καὶ ἀναστρέψαντι καὶ δὶς τὰ*




*ἡγούμενα καὶ διελόντι· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ,* οὕτως *ἡ ΒΔ πρὸς ΔΓ.*

*ιβ΄. Ἔστω πάλιν τὸ ὑπὸ ΒΓΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΓΕ, ἴση δὲ ἡ ΑΓ τῇ ΓΕ· ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΒΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΓΒΔ.*




*ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΒΓΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΓΕ, ἀνάλογόν ἐστιν* [Eucl. VI, 17], *ὡς ἡ ΒΓ πρὸς ΓΕ, τουτέστιν πρὸς τὴν ΓΑ, οὕτως ἡ ΓΕ, τουτέστιν ἡ ΑΓ, πρὸς τὴν ΓΔ· καὶ ὅλη πρὸς ὅλην* [Eucl. V, 12] *καὶ ἀναστρέψαντι καὶ χωρίον χωρίῳ* [Eucl. VI, 16]· *τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΒΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΓΒΔ.*


*φανερὸν δέ, ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ ΑΔΕ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΒΔΓ· ἐὰν γὰρ ἀφαιρεθῇ τὸ ἀπὸ ΓΔ κοινὸν ἀπὸ τῆς τοῦ ἀπὸ ΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΓΔ ἰσότητος, γίνεται* [Eucl. II, 3; II, 5].

*ιγ΄. Εἰς δύο παραλλήλους τὰς ΑΒ, ΓΔ διά τε τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ Ε τρεῖς διήχθωσαν αἱ ΑΕΔ, ΒΕΓ, ΖΕΗ· ὅτι ἐστίν, ὡς τὸ ὑπὸ ΑΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΖΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΕΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΗΔ.*

*διὰ τοῦ συνημμένου φανερόν· ὡς μὲν γὰρ ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΔ, οὕτως ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΗΔ, ὡς δὲ ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΓ, οὕτως ἡ ΖΒ πρὸς τὴν ΗΓ* [Eucl. VI, 4], *καὶ σύγκειται ἐκ τούτων τὰ χωρία· μένει ἄρα.*

---

25. *μένει*] scripsi, *μὲν ῑ* codd., *γίνεται* Hultsch.




ἔστιν δὲ καὶ οὕτως μὴ προσχρησάμενον τῷ συνημμένῳ. ἐπεὶ γάρ ἐστιν, ὡς ἡ *ΑΕ* πρὸς τὴν *ΕΒ*, οὕτως ἡ *ΕΔ* πρὸς τὴν *ΕΓ* [Eucl. VI, 4], καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ *ΑΕΒ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΕΒ*, οὕτως τὸ ὑπὸ *ΔΕΓ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΕΓ*. ἀλλὰ καί, ὡς τὸ ἀπὸ *ΒΕ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΒΖ*, οὕτως τὸ ἀπὸ *ΕΓ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓΗ* [Eucl. VI, 4]· δι' ἴσου ἄρα ἐστίν, ὡς τὸ υπὸ *ΑΕΒ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΖΒ*, οὕτως τὸ υπὸ *ΓΕΔ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓΗ*. ἀλλὰ καί, ὡς τὸ ἀπὸ *ΖΒ* πρὸς τὸ ὑπὸ *ΒΖΑ*, οὕτως τὸ ἀπὸ *ΓΗ* πρὸς τὸ ὑπὸ *ΓΗΔ*· δι' ἴσου ἄρα ἐστίν, ὡς τὸ ὑπὸ *ΑΕΒ* πρὸς τὸ ὑπὸ *ΑΖΒ*, οὕτως τὸ ὑπὸ *ΓΕΔ* πρὸς τὸ ὑπο *ΓΗΔ*.

# II.

## SERENUS.

Serenus de sectione cylindri prop. 16 p. 16 ed. Halley:

*Τούτων οὕτως ἐχόντων φανερόν ἐστιν, ὅτι ἡ ΑΒΓ τοῦ κυλίνδρου τομὴ ἔλλειψίς ἐστιν· ὅσα γὰρ ἐνταῦθα τῇ τομῇ ἐδείχθη ὑπάρχοντα, πάντα ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ κώνου τῇ ἐλλείψει ὑπῆρχεν, ὡς ἐν τοῖς Κωνικοῖς δείκνυται θεωρήματι ιε′ τοῖς δυναμένοις λέγειν τὴν ἀκρίβειαν τοῦ θεωρήματος, καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς εἰς αὐτὰ ὑπομνήμασι γεωμετρικῶς ἀπεδείξαμεν.*

---

8. *ὑπῆρχεν*] cod. Cnopolitanus c, *ὑπῆρχον* Halley. 11. *ὑπομνήμασι*] c, *ὑπομνήμασιν* Halley.

## III.

# HYPATIA.

Suidas s. u. Ὑπατία p. 1059 a ed. Bekker:

Ἔγραψεν ... εἰς τὰ κωνικὰ Ἀπολλωνίου ὑπόμνημα.

## IV.

# EUTOCII
# COMMENTARIA IN CONICA.

### *Εἰς τὸ πρῶτον.*

Ἀπολλώνιος ὁ γεωμέτρης, ὦ φίλε ἑταῖρε Ἀνθέμιε, γέγονε μὲν ἐκ Πέργης τῆς ἐν Παμφυλίᾳ ἐν χρόνοις τοῦ Εὐεργέτου Πτολεμαίου, ὡς ἱστορεῖ Ἡράκλειος*) ὁ τὸν βίον Ἀρχιμήδους γράφων, ὃς καί φησι τὰ κωνικὰ θεωρήματα ἐπινοῆσαι μὲν πρῶτον τὸν Ἀρχιμήδη, τὸν δὲ Ἀπολλώνιον αὐτὰ εὑρόντα ὑπὸ Ἀρχιμήδους μὴ ἐκδοθέντα ἰδιοποιήσασθαι, οὐκ ἀληθεύων κατά γε τὴν ἐμήν. ὅ τε γὰρ Ἀρχιμήδης ἐν πολλοῖς φαίνεται ὡς παλαιοτέρας τῆς στοιχειώσεως τῶν κωνικῶν μεμνημένος, καὶ ὁ Ἀπολλώνιος οὐχ ὡς ἰδίας ἐπινοίας γράφει· οὐ γὰρ ἂν ἔφη ἐπὶ πλέον καὶ καθόλου μᾶλλον ἐξειργάσθαι ταῦτα παρὰ τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων γεγραμμένα. ἀλλ' ὅπερ φησὶν ὁ Γεμῖνος ἀληθές ἐστιν, ὅτι οἱ παλαιοὶ κῶνον ὁριζόμενοι τὴν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου περιφορὰν μενούσης μιᾶς τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν εἰκότως καὶ τοὺς κώνους πάντας ὀρθοὺς ὑπελάμβανον γίνεσθαι καὶ μίαν τομὴν ἐν ἑκάστῳ, ἐν

---

4. Εὐτοκίου Ἀσκαλωνίτου εἰς τὸ α' τῶν Ἀπολλωνίου κωνικῶν τῆς κατ' αὐτὸν ἐκδόσεως ὑπόμνημα Wp. 6. γέγονε] p,

*) See Heath's Archim., p. XX.

## In librum I.

Apollonius geometra, amicissime mihi Anthemie, ex Perga urbe Pamphyliae oriundus vixit temporibus Ptolemaei Euergetae, ut narrat Heraclius, qui vitam scripsit Archimedis; idem dicit, propositiones conicas primum inuenisse Archimedem, Apollonium autem, cum eas ab Archimede non editas reperisset, sibi adrogasse; sed mea quidem sententia fallitur. nam et adparet, Archimedem saepe elementa conica ut antiquiora commemorare, et Apollonius sua ipsius inuenta se exponere minime profitetur; alioquin non dixisset [I p. 4, 3—5], se ea latius uniuersaliusque exposuisse, quam quae ceteri de iis scripsissent. immo Geminus uerum uidit, ueteres, qui conum definirent ortum circumactione trianguli rectanguli manente altero latere eorum, quae angulum rectum comprehenderent, iure omnes conos rectos fieri putasse et in singulis unam oriri sectionem, in rectangulo eam, quam nunc

---

*γέγονεν* W. *τῆς ἐν Παμφυλίᾳ*] p, in ras. m. 1 W. 7. *Ἡράκλειος*] p, —*ειος* W¹. 8. *Ἀρχημήδους*, *ς* in ras. m. 1, W, sed corr. *γράφων, ὃς καί*] p, —*ν ὃς καί* W¹. 9. *Ἀρχιμήδην* p. 10. *εὑρώντα* W, sed corr. 12. *ἐμὴν γνῶσιν* p. 15. *οὐ*] comp. e corr. p. 17. *Γεμῖνος*] w, *Γεμινος* W, *Γεμίνος* p. 18. *παλαιοί*] p, —*οί* W¹. *κῶνον*] corr. ex *λωνιον* m. 1 W. —*θογωνίου* in ras. m. 1 W. 19. *μενούσης μιᾶς*] p; —*σης μιᾶς* W¹ seq. lineola transuersa. 21. *γείνεσθαι* W.

μὲν τῷ ὀρθογωνίῳ τὴν νῦν καλουμένην παραβολήν, ἐν δὲ τῷ ἀμβλυγωνίῳ τὴν ὑπερβολήν, ἐν δὲ τῷ ὀξυγωνίῳ τὴν ἔλλειψιν· καὶ ἔστι παρ' αὐτοῖς εὑρεῖν οὕτως ὀνομαζομένας τὰς τομάς. ὥσπερ οὖν τῶν ἀρχαίων ἐπὶ ἑνὸς ἑκάστου εἴδους τριγώνου θεωρησάντων τὰς δύο ὀρθὰς πρότερον ἐν τῷ ἰσοπλεύρῳ καὶ πάλιν ἐν τῷ ἰσοσκελεῖ καὶ ὕστερον ἐν τῷ σκαληνῷ οἱ μεταγενέστεροι καθολικὸν θεώρημα ἀπέδειξαν τοιοῦτο· παντὸς τριγώνου αἱ ἐντὸς τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν τοῦ κώνου τομῶν· τὴν μὲν γὰρ λεγομένην ὀρθογωνίου κώνου τομὴν ἐν ὀρθογωνίῳ μόνον κώνῳ ἐθεώρουν τεμνομένῳ ἐπιπέδῳ ὀρθῷ πρὸς μίαν πλευρὰν τοῦ κώνου, τὴν δὲ τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομὴν ἐν ἀμβλυγωνίῳ γινομένην κώνῳ ἀπεδείκνυσαν, τὴν δὲ τοῦ ὀξυγωνίου ἐν ὀξυγωνίῳ, ὁμοίως ἐπὶ πάντων τῶν κώνων ἄγοντες τὰ ἐπίπεδα ὀρθὰ πρὸς μίαν πλευρὰν τοῦ κώνου· δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὰ τὰ ἀρχαῖα ὀνόματα τῶν γραμμῶν. ὕστερον δὲ Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος καθόλου τι ἐθεώρησεν, ὅτι ἐν παντὶ κώνῳ καὶ ὀρθῷ καὶ σκαληνῷ πᾶσαι αἱ τομαί εἰσι κατὰ διάφορον τοῦ ἐπιπέδου πρὸς τὸν κῶνον προσβολήν· ὃν καὶ θαυμάσαντες οἱ κατ' αὐτὸν γενόμενοι διὰ τὸ θαυμάσιον τῶν ὑπ' αὐτοῦ δεδειγμένων κωνικῶν θεωρημάτων μέγαν γεωμέτρην ἐκάλουν. ταῦτα μὲν οὖν ὁ Γεμῖνος ἐν τῷ ἕκτῳ φησὶ τῆς τῶν μαθημάτων θεωρίας. ὃ δὲ λέγει, σαφὲς ποιήσομεν ἐπὶ τῶν ὑποκειμένων καταγραφῶν.

ἔστω τὸ διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ κώνου τρίγωνον τὸ

---

2. ἐν δέ — ὑπερβολήν] p, mg. W[1]. 3. ἔστιν W. 7. σκαληνῷ] α corr. ex λ m. 1 W. 8. ἀπέδειξαν] p, W[1]. παντός] π corr. ex ν m. 1 W. 10. οὕτω p. 13. δέ] supra


parabolam uocant, in obtusiangulo hyperbolam, in acutiangulo ellipsim; et sectiones illas apud eos ita denominatas inuenias. sicut igitur, cum ueteres propositionem de angulis duobus rectis aequalibus in singulis generibus trianguli inuestigassent, primum in aequilatero, postea in aequicrurio, deinde uero in scaleno, recentiores propositionem uniuersalem demonstrauerunt talem: cuiusuis trianguli tres anguli interiores duobus rectis aequales sunt [Eucl. I, 32], ita etiam in coni sectionibus factum est; sectionem enim rectanguli coni quae uocatur in solo cono rectangulo perscrutabantur secto plano ad latus coni perpendiculari, sectionem autem coni obtusianguli in cono obtusiangulo, sectionem autem acutianguli in acutiangulo oriri demonstrabant in omnibus conis similiter planis ad latus coni perpendicularibus ductis; id quod ipsa nomina linearum illarum antiqua docent. postea uero Apollonius Pergaeus uniuersaliter inuestigauit, in quouis cono et recto et scaleno omnes sectiones illas oriri secundum uariam plani ad conum positionem; quem admirati aequales ob admiranda theoremata conica ab eo demonstrata magnum geometram adpellabant. haec igitur Geminus in libro sexto de scientia mathematica; et quae dicit, nos in figuris infra descriptis illustrabimus.

sit $AB\Gamma$ triangulus per axem coni positus, et a

---

scr. in ras. W[1]. 14. *ἐν*] w, om. Wp. 15. *ἀποδείκνυσαν* W, corr. W[1] 18. *τά*] p, om. W. 19. *καθόλου* — 20. *ἐν π*—] p, W[1]. 21. *εἴσιν* W. 23. *δεδειγ*— in ras. m. 1 W 24. *κωνικῶν*] Wp, mg. *ἐν ἄλλῳ καθολικῶν* m. 1 p, W[1]. 25. *Γεμῖνος*] vw, *Γεμινος* W, *Γεμίνος* p.

*ΑΒΓ*, καὶ ἤχθω τῇ *ΑΒ* ἀπὸ τυχόντος σημείου τοῦ *Ε* πρὸς ὀρθὰς ἡ *ΔΕ*, καὶ τὸ διὰ τῆς *ΔΕ* ἐπίπεδον ἐκβληθὲν ὀρθὸν πρὸς τὴν *ΑΒ* τεμνέτω τὸν κῶνον· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ *ΑΕΔ*, *ΑΕΖ* γωνιῶν. ὀρθογωνίου μὲν ὄντος τοῦ κώνου καὶ ὀρθῆς δηλονότι τῆς ὑπὸ *ΒΑΓ* γωνίας ὡς ἐπὶ τῆς πρώτης καταγραφῆς δύο ὀρθαῖς ἴσαι ἔσονται αἱ ὑπὸ *ΒΑΓ*, *ΑΕΖ* γωνίαι· ὥστε παράλληλος ἔσται ἡ *ΔΕΖ* τῇ *ΑΓ*. καὶ γίνεται ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου τομὴ ἡ καλουμένη παραβολὴ οὕτω κληθεῖσα ἀπὸ τοῦ παράλληλον εἶναι τὴν *ΔΕΖ*, ἥτις ἐστὶ κοινὴ τομὴ τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου καὶ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου, τῇ *ΑΓ* πλευρᾷ τοῦ τριγώνου.





ἐὰν δὲ ἀμβλυγώνιος ᾖ ὁ κῶνος ὡς ἐπὶ τῆς δευτέρας καταγραφῆς ἀμβλείας δηλονότι οὔσης τῆς ὑπὸ *ΒΑΓ*, ὀρθῆς δὲ τῆς ὑπὸ *ΑΕΖ*, δύο ὀρθῶν μείζους ἔσονται αἱ ὑπὸ *ΒΑΓ*, *ΑΕΖ* γωνίαι· ὥστε οὐ συμπεσεῖται ἡ *ΔΕΖ* τῇ *ΑΓ* πλευρᾷ ἐπὶ τὰ πρὸς τοῖς *Ζ*, *Γ* μέρη, ἀλλὰ ἐπὶ τὰ πρὸς τοῖς *Α*, *Ε* προσεκβαλλομένης δηλονότι τῆς *ΓΑ* ἐπὶ τὸ *Δ*. ποιήσει οὖν τὸ τέμνον ἐπίπεδον ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου τομὴν τὴν καλουμένην ὑπερβολὴν οὕτω κληθεῖσαν ἀπὸ τοῦ ὑπερβάλλειν τὰς εἰρημένας γωνίας, τουτέστι τὰς ὑπὸ *ΑΕΖ*,

---

2. ἐμβληθέν W. 6. ὀρθωγωνίου W, corr. m. 1. μὲν ὄντος] scripsi, μένοντος Wp. 12. *ΒΑΓ*] *ΑΒΓ* Wp, corr. mg. U. *ΑΕΖ*] *ΔΕΖ* Wp, corr. mg. U. 15. ἐστίν W. 17. ἄξωνος W, corr. m. 1. 18. ὡς] p, in spatio 7 litt. m.

puncto aliquo $E$ ad $AB$ perpendicularis ducatur $\Delta E$, planum autem per $\Delta E$ ad $AB$ perpendiculare ductum conum secet; itaque anguli $AE\Delta$, $AEZ$ recti sunt. iam si conus rectangulus est et ideo $\angle BA\Gamma$ rectus ut in prima figura, erunt $\angle BA\Gamma + AEZ$ duobus rectis aequales; quare $\Delta EZ$ et $A\Gamma$ parallelae sunt [Eucl. I, 28]. et in superficie coni sectio efficitur parabola quae uocatur, cui hoc nomen inditum est, quia $\Delta EZ$, quae communis sectio est plani secantis trianguli que per axem positi, lateri trianguli $A\Gamma$ parallela est.

sin conus obtusiangulus est ut in secunda figura obtuso scilicet posito $\angle BA\Gamma$, recto autem $AEZ$, $\angle BA\Gamma + AEZ$ duobus rectis maiores erunt; quare $\Delta EZ$ et $A\Gamma$ latus ad partes $Z, \Gamma$ uersus non concurrent, sed ad partes $A$, $E$ uersus, producta scilicet $\Gamma A$ ad $\Delta$ [Eucl. I αἰτ. 5].




itaque planum secans in superficie coni sectionem efficiet hyperbolam quae uocatur, cui hoc nomen inditum est, quia anguli illi, h. e. $AEZ$, $BA\Gamma$, duos rectos

rec. W, om. vw. 19. τῆς] corr. ex τοῦ m. 1 p. 20. $AEZ$] $\Delta EZ$ p et W, sed corr. 21. $AEZ$] om. W in extr. lin., p; corr. U. 22. $\Delta EZ$] $AEZ$ Wp, corr. U. $\Gamma$] corr. ex $E$ m. 1 W. 27. τουτέστιν W.

*ΒΑΓ*, δύο ὀρθὰς ἢ διὰ τὸ ὑπερβάλλειν τὴν *ΔΕΖ* τὴν κορυφὴν τοῦ κώνου καὶ συμπίπτειν τῇ *ΓΑ* ἐκτός.

ἐὰν δὲ ὀξυγώνιος ᾖ ὁ κῶνος ὀξείας δηλονότι οὔσης τῆς ὑπὸ *ΒΑΓ*, αἱ *ΒΑΓ*, *ΑΕΖ* ἔσονται δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες· ὥστε αἱ *ΕΖ*, *ΑΓ* ἐκβαλλόμεναι συμπεσοῦνται ὁπουδήποτε· προσαυξῆσαι γὰρ δύναμαι τὸν κῶνον. ἔσται οὖν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τομή, ἥτις καλεῖται ἔλλειψις, οὕτω κληθεῖσα ἤτοι διὰ τὸ ἐλλείπειν δύο ὀρθαῖς τὰς προειρημένας γωνίας ἢ διὰ τὸ τὴν ἔλλειψιν κύκλον εἶναι ἐλλιπῆ.

οὕτως μὲν οὖν οἱ παλαιοὶ ὑποθέμενοι τὸ τέμνον ἐπίπεδον τὸ διὰ τῆς *ΔΕΖ* πρὸς ὀρθὰς τῇ *ΑΒ* πλευρᾷ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ κώνου τριγώνου καὶ ἔτι διαφόρους τοὺς κώνους ἐθεώρησαν καὶ ἐπὶ ἑκάστου ἰδίαν τομήν· ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ὑποθέμενος τὸν κῶνον καὶ ὀρθὸν καὶ σκαληνὸν τῇ διαφόρῳ τοῦ ἐπιπέδου κλίσει διαφόρους ἐποίησε τὰς τομάς.


ἔστω γὰρ πάλιν ὡς ἐπὶ τῶν αὐτῶν καταγραφῶν τὸ τέμνον ἐπίπεδον τὸ *ΚΕΛ*, κοινὴ δὲ αὐτοῦ τομὴ καὶ τῆς βάσεως τοῦ κώνου ἡ *ΚΖΛ*, κοινὴ δὲ πάλιν αὐτοῦ τοῦ *ΚΕΛ* ἐπιπέδου καὶ τοῦ *ΑΒΓ* τριγώνου ἡ *ΕΖ*, ἥτις καὶ διάμετρος καλεῖται τῆς τομῆς. ἐπὶ πασῶν οὖν τῶν τομῶν ὑποτίθεται τὴν *ΚΛ* πρὸς ὀρθὰς τῇ *ΒΓ* βάσει τοῦ *ΑΒΓ* τριγώνου, λοιπὸν δέ, εἰ μὲν

---

4. αἱ *ΒΑΓ*] om. Wp, corr. U. 5. ἐλάσσονες] —ες obscuro comp. p, ἐλάσσονος W. ὥστε] scripsi; τε Wp. 8. ὀρθαῖς] fort. ὀρθῶν. 10. ἐλλειπῆ W. 11. οὔτω p. 14. ἐπί] ἐπεί Wp, corr. Command. („in"). 15. τόν] scripsi; in W in extr. pag. uacat spatium 8 litt., initio sequentis 10; in p spatium uacat, cuius partem obtinet figura; signum lacunae add. U. 16. κλήσει W. 17. ἐποίησεν W. 22. *ΕΖΗ* τις W. 23. πασῶν] scripsi, πλέον Wp, πάντων (!) mg. U.

superant, uel quia *ΔEZ* uerticem coni egreditur et cum *ΓA* extra concurrit.

sin conus acutiangulus est acuto scilicet posito $\angle$ *BAΓ*, $\angle$ *BAΓ* + *AEZ* duobus rectis minores erunt; quare *EZ*, *AΓ* productae alicubi concurrent [ib.]; nam




conum augere possumus. itaque in superficie sectio efficietur ellipsis quae uocatur, cui hoc nomen inditum est, aut quia anguli illi duobus rectis minores sunt, aut quia ellipsis circulus est imperfectus.

ita igitur ueteres, cum planum secans per *ΔEZ* positum ad *AB* latus trianguli per axem coni positi perpendiculare et praeterea conos uarie formatos supponerent, etiam in singulis singulas sectiones inuestigauerunt; Apollonius uero, qui conum et rectum et scalenum supposuit, uaria plani inclinatione uarias effecit sectiones.

sit enim rursus ut in iisdem figuris planum secans *KEΛ*, communis autem eius basisque coni sectio *KZΛ*, rursus autem ipsius plani *KEΛ* trianguli que *ABΓ* sectio communis *EZ*, quae eadem diametrus sectionis uocatur. iam in omnibus sectionibus *KΛ* ad BΓ

ἡ ΕΖ παράλληλος εἴη τῇ ΑΓ, παραβολὴν γίνεσθαι τὴν ΚΕΛ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου τομήν, εἰ δὲ συμπίπτει τῇ ΑΓ πλευρᾷ ἡ ΕΖ ἐκτὸς τῆς κορυφῆς τοῦ κώνου ὡς κατὰ τὸ Δ, γίνεσθαι τὴν ΚΕΛ τομὴν ὑπερβολήν, εἰ δὲ ἐντὸς συμπίπτει τῇ ΑΓ ἡ ΕΖ, γίνεσθαι τὴν τομὴν ἔλλειψιν, ἣν καὶ θυρεὸν καλοῦσιν. καθόλου οὖν τῆς μὲν παραβολῆς ἡ διάμετρος παράλληλός ἐστι τῇ μιᾷ πλευρᾷ τοῦ τριγώνου, τῆς δὲ ὑπερβολῆς ἡ διάμετρος συμπίπτει τῇ πλευρᾷ τοῦ τριγώνου ὡς ἐπὶ τὰ πρὸς τῇ κορυφῇ τοῦ κώνου μέρη, τῆς δὲ ἐλλείψεως ἡ διάμετρος συμπίπτει τῇ πλευρᾷ τοῦ τριγώνου ὡς ἐπὶ τὰ πρὸς τῇ βάσει μέρη. κἀκεῖνο δὲ χρὴ εἰδέναι, ὅτι ἡ μὲν παραβολὴ καὶ ἡ ὑπερβολὴ τῶν εἰς ἄπειρόν εἰσιν αὐξανομένων, ἡ δὲ ἔλλειψις οὐκέτι· πᾶσα γὰρ εἰς αὐτὴν συννεύει ὁμοίως τῷ κύκλῳ.

πλειόνων δὲ οὐσῶν ἐκδόσεων, ὡς καὶ αὐτός φησιν ἐν τῇ ἐπιστολῇ, ἄμεινον ἡγησάμην συναγαγεῖν αὐτὰς ἐκ τῶν ἐμπιπτόντων τὰ σαφέστερα παρατιθέμενος ἐν τῷ ῥητῷ διὰ τὴν τῶν εἰσαγομένων εὐμάρειαν, ἔξωθεν δὲ ἐν τοῖς συντεταγμένοις σχολίοις ἐπισημαίνεσθαι τοὺς διαφόρους ὡς εἰκὸς τρόπους τῶν ἀποδείξεων.

φησὶ τοίνυν ἐν τῇ ἐπιστολῇ τὰ πρῶτα τέσσαρα βιβλία περιέχειν ἀγωγὴν στοιχειώδη· ὧν τὸ μὲν πρῶτον περιέχειν τὰς γενέσεις τῶν τριῶν τοῦ κώνου τομῶν καὶ τῶν καλουμένων ἀντικειμένων καὶ τὰ ἐν αὐταῖς ἀρχικὰ συμπτώματα. ταῦτα δέ ἐστιν, ὅσα συμβαίνει παρὰ τὴν πρώτην αὐτῶν γένεσιν· ἔχουσι γὰρ καὶ ἕτερά τινα παρακολουθήματα. τὸ δὲ δεύτερον

3. συμπίπτη W. 5. συμπίπτη W. 6. θυραῖον Wp, corr. U. καλοῦσι p. 8. ἐστιν W. 13. χρή] p, χρεί W.

basim trianguli perpendicularem supponit, deinde autem, si $EZ$ rectae $A\Gamma$ parallela sit, sectionem $KE\Lambda$ in superficie coni parabolam fieri, sin $EZ$ cum latere $A\Gamma$ extra uerticem coni concurrat ut in $\Delta$, sectionem $KE\Lambda$ hyperbolam fieri, sin autem $EZ$ cum $A\Gamma$ intra concurrat, sectionem fieri ellipsim, quam eandem scutum uocant. uniuersaliter igitur diametrus parabolae uni lateri trianguli parallela est, hyperbolae autem diametrus cum latere trianguli concurrit ad partes uerticis coni uersus, ellipsis autem diametrus cum latere trianguli concurrit ad partes basis uersus. et hoc quoque scire oportet, parabolam hyperbolamque earum linearum esse, quae in infinitum crescant, ellipsim uero non esse; ea enim tota in se recurrit sicut circulus.

Sed cum complures exstent editiones, ut ipse in epistula dicit [I p. 2, 18 sq.], eas in unum cogere malui clariora ex iis, quae mihi sese obtulerant, in uerba scriptoris recipiens, ut institutio facilior esset, uarios autem demonstrandi modos, ut par erat, extra in scholiis a me compositis indicare.

dicit igitur in epistula, priores quattuor libros institutionem elementarem continere; quorum primum origines trium sectionum coni oppositarumque, quae uocantur, et proprietates earum principales continere [I p. 4, 1 sq.]. eae uero sunt, quaecunque per primam illarum originem eueniunt; nam etiam alias quasdam consequentias habent. alter autem, quae

---

18. ἄμινον W. 19. ἐνπιπτόντων W. 23. φησίν W. 24. βιβλία] στοιχεῖα p. περιέχει W. στοιχειώδη] Halley, στοιχείων δι' Wp. 25. περιέχει Halley.

τὰ παρὰ τὰς διαμέτρους καὶ τοὺς ἄξονας τῶν τομῶν συμβαίνοντα καὶ τὰς ἀσυμπτώτους καὶ ἄλλα γενικὴν καὶ ἀναγκαίαν χρείαν παρεχόμενα πρὸς τοὺς διορισμούς. ὁ δὲ διορισμὸς ὅτι διπλοῦς ἐστι, παντί που δῆλον, ὁ μὲν μετὰ τὴν ἔκθεσιν ἐφιστάνων, τί ἐστι τὸ ζητούμενον, ὁ δὲ τὴν πρότασιν οὐ συγχωρῶν καθολικὴν εἶναι, λέγων δέ, πότε καὶ πῶς καὶ ποσαχῶς δυνατὸν συστῆναι τὸ προτιθέμενον, οἷός ἐστιν ὁ ἐν τῷ εἰκοστῷ δευτέρῳ θεωρήματι τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Εὐκλείδου στοιχειώσεως· ἐκ τριῶν εὐθειῶν, αἵ εἰσιν ἴσαι τρισὶ ταῖς δοθείσαις, τρίγωνον συστήσασθαι· δεῖ δὴ τὰς δύο τῆς λοιπῆς μείζονας εἶναι πάντη μεταλαμβανομένας, ἐπειδὴ δέδεικται, ὅτι παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσι πάντη μεταλαμβανόμεναι. τὸ δὲ τρίτον τῶν κωνικῶν περιέχειν φησὶ πολλὰ καὶ παράδοξα θεωρήματα χρήσιμα πρὸς τὰς συνθέσεις τῶν στερεῶν τόπων. ἐπιπέδους τόπους ἔθος τοῖς παλαιοῖς γεωμέτραις λέγειν, ὅταν ἐπὶ τῶν προβλημάτων οὐκ ἀφ' ἑνὸς σημείου μόνον, ἀλλ' ἀπὸ πλειόνων γίνεται τὸ πρόβλημα, οἷον εἰ ἐπιτάξει τις εὐθείας δοθείσης πεπερασμένης εὑρεῖν τι σημεῖον, ἀφ' οὗ ἡ ἀχθεῖσα κάθετος ἐπὶ τὴν δοθεῖσαν μέση ἀνάλογον γίνεται τῶν τμημάτων, τόπον καλοῦσι τὸ τοιοῦτον· οὐ μόνον γὰρ ἓν σημεῖόν ἐστι τὸ ποιοῦν τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ τόπος ὅλος, ὃν ἔχει ἡ περιφέρεια τοῦ περὶ διάμετρον τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν κύκλου. ἐὰν γὰρ ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας ἡμικύκλιον γραφῇ, ὅπερ ἂν ἐπὶ τῆς περιφερείας λάβῃς σημεῖον καὶ ἀπ' αὐτοῦ κάθετον

6. ἔστιν W. 9. εἰκοστο W. 11. τρισίν W. 15. εἰσιν W. 16. φησίν W. 22. πε— in mg. transit m. 1 W.

diametri axesque sectionum et asymptotae propria habent aliaque, quae usum generalem necessariumque ad determinationes praebent [I p. 4, 5—8]. determinationem uero duplicem esse, omnibus notum est, alteram, quae post expositionem declarat, quid quaeratur, alteram, quae propositionem negat generalem esse definitque, quando quomodo quot modis propositum construi possit, qualis est in propositione XXII primi libri Elementorum Euclidis: ex tribus rectis, quae tribus datis aequales sunt, triangulum construere; oportet uero duas reliqua maiores esse quoquo modo coniunctas, quoniam demonstratum est, in quouis triangulo duo latera reliquo maiora esse quoquo modo coniuncta. tertium autem Conicorum dicit continere [I p. 4, 10—12] plurima et mira theoremata ad compositionem locorum solidorum utilia. loca plana mos est antiquis geometris uocare, ubi in problematis non uno solo puncto sed compluribus efficitur propositum; uelut si quis postulat, ut data recta terminata punctum aliquod inueniatur, unde quae ad datam perpendicularis ducatur media proportionalis fiat inter eius partes, hoc locum uocant; nam non unum solum punctum problema efficit, sed locus totus, quem obtinet ambitus circuli circum diametrum datam rectam descripti. nam in data recta semicirculo descripto, quodcunque punctum in ambitu sumitur et inde recta ad diametrum perpendicularis ducitur, propositum efficit. eodem modo si quis postulat, ut extra

24. καλοῦσιν W. 25. ἐστιν W. 26. ἀλλά — p. 180, 5. πρόβλημα] mg. inf. m. 1 alio atramento p; mg. ὅρα κάτω. 29. λάβεις W.

*ἀγάγης ἐπὶ τὴν διάμετρον, ποιήσει τὸ προβληθέν. ὁμοίως δὲ δοθείσης εὐθείας ἐάν τις ἐπιτάξῃ εὑρεῖν ἐκτὸς αὐτῆς σημεῖον, ἀφ' οὗ αἱ ἐπιζευγνύμεναι ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς εὐθείας ἴσαι ἔσονται ἀλλήλαις, καὶ ἐπὶ τούτου οὐ μόνον ἓν σημεῖόν ἐστι τὸ ποιοῦν τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ τόπος, ὃν ἐπέχει ἡ ἀπὸ τῆς διχοτομίας πρὸς ὀρθὰς ἀγομένη· ἐὰν γὰρ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν δίχα τεμὼν καὶ ἀπὸ τῆς διχοτομίας πρὸς ὀρθὰς ἀγάγης, ὃ ἂν ἐπ' αὐτῆς λάβῃς σημεῖον, ποιήσει τὸ ἐπιταχθέν.*

*ὅμοιον γράφει καὶ αὐτὸς Ἀπολλώνιος ἐν τῷ Ἀναλυομένῳ τόπῳ ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου.*

*δύο δοθέντων [εὐθειῶν] ἐν ἐπιπέδῳ [καὶ] σημείων καὶ λόγου δοθέντος ἀνίσων εὐθειῶν δυνατόν ἐστιν ἐν τῷ ἐπιπέδῳ γράψαι κύκλον ὥστε τὰς ἀπὸ τῶν δοθέντων σημείων ἐπὶ τὴν περιφέρειαν τοῦ κύκλου κλωμένας εὐθείας λόγον ἔχειν τὸν αὐτὸν τῷ δοθέντι.*

*ἔστω τὰ μὲν δοθέντα σημεῖα τὰ Α, Β, λόγος δὲ ὁ τῆς Γ πρὸς τὴν Δ μείζονος οὔσης τῆς Γ· δεῖ δὴ ποιῆσαι τὸ ἐπιταχθέν. ἐπεζεύχθω ἡ ΑΒ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ πρὸς τῷ Β μέρη, καὶ γεγονέτω, ὡς ἡ Δ πρὸς τὴν Γ, ἡ Γ πρὸς ἄλλην τινὰ μείζονα δηλονότι τῆς Δ, καὶ ἔστω, εἰ τύχοι, πρὸς τὴν ΕΔ, καὶ πάλιν γεγονέτω, ὡς ἡ Ε πρὸς τὴν ΑΒ, ἡ Δ πρὸς τὴν ΒΖ καὶ ἡ Γ πρὸς τὴν Η. φανερὸν δή, ὅτι ἥ τε Γ μέση ἀνάλογόν ἐστι τῆς ΕΔ καὶ τῆς Δ καὶ ἡ*

---


1. *ἀγάγεις* W. 2. *ἐπιτάξει* W. *εὑρεῖν*] —*εῖν* e corr. p. 4. *τῆς*] bis p. 5. *ἐστιν* W. 6. *τόπος, ὅν*] *τὸ ποσον* W, *τὸ ποσόν* p; corr. U. 8. *καί*] fort. delendum. *ἀγάγεις* W. 9. *ποιήσης* p. 13. *δοθέντων*] Halley, *δοθεισῶν* Wp. *εὐθειῶν*] deleo, *σημείων* Halley. *καί*] del. Halley. *σημείων*] U Comm., *σημείον* Wp, del. Halley.

datam rectam punctum inueniatur, a quo rectae ad terminos datae rectae ductae inter se aequales sint, hic quoque non unum solum punctum propositum efficit, sed locus, quem obtinet recta a puncto medio perpendicularis ducta; nam si data recta in duas partes aequales secta a puncto medio perpendicularem duxeris, quodcunque in ea sumpseris punctum, propositum efficiet.

simile quiddam in Loco resoluto et ipse Apollonius scribit, ut infra dedimus:

datis duobus in plano punctis et proportione duarum rectarum inaequalium fieri potest, ut in plano circulus describatur, ita ut rectae a datis punctis ad ambitum circuli fractae rationem habeant datae aequalem.

sint $A$, $B$ puncta data, data autem proportio $\Gamma : \Delta$, ita ut $\Gamma$ maior sit. oportet igitur propositum efficere.




ducatur $AB$ et ad partes $B$ uersus producatur, fiatque, ut $\Delta : \Gamma$, ita $\Gamma$ ad aliam aliquam, quae scilicet maior est quam $\Delta$, sitque ea $E + \Delta$; et rursus fiat

$$E : AB = \Delta : BZ = \Gamma : H.$$

*Η τῶν ΑΖ, ΖΒ. καὶ κέντρῳ μὲν τῷ Ζ διαστήματι δὲ τῇ Η κύκλος γεγράφθω ὁ ΚΘ. φανερὸν δή, ὅτι τέμνει ἡ ΚΘ περιφέρεια τὴν ΑΒ εὐθεῖαν· ἡ γὰρ Η εὐθεῖα μέση ἀνάλογόν ἐστι τῶν ΑΖ, ΖΒ. εἰλήφθω δὴ ἐπὶ τῆς περιφερείας τυχὸν σημεῖον τὸ Θ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΘΑ, ΘΒ, ΘΖ. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΖ τῇ Η, καὶ διὰ τοῦτό ἐστιν, ὡς ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΖΘ, ἡ ΖΘ πρὸς ΖΒ. καὶ περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν τὴν ὑπὸ ΘΖΒ ἀνάλογόν εἰσιν· ὅμοιον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΖΘ τῷ ΘΒΖ τριγώνῳ, καὶ ἴση ἡ ὑπὸ ΖΘΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΑΒ. ἤχθω δὴ διὰ τοῦ Β τῇ ΑΘ παράλληλος ἡ ΒΔ. ἐπεὶ οὖν ἐστιν, ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΘ, ἡ ΘΖ πρὸς ΖΒ, καὶ ὡς ἄρα πρώτη ἡ ΑΖ πρὸς τρίτην τὴν ΖΒ, τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΘ. ἀλλ' ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ, ἡ ΑΘ πρὸς ΒΔ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΘ, ἡ ΑΘ πρὸς ΒΔ. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΘΖ τῇ ὑπὸ ΘΑΒ, ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΘΒ τῇ ὑπὸ ΘΒΔ ἴση· ἐναλλὰξ γάρ· καὶ ἡ λοιπὴ ἄρα τῇ λοιπῇ ἴση ἐστίν, καὶ ὅμοιόν ἐστι τὸ ΑΘΒ τῷ ΒΘΔ, καὶ ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, ὡς ἡ ΑΘ πρὸς ΘΒ, ἡ ΘΒ πρὸς ΒΔ, καὶ ὡς τὸ ἀπὸ ΑΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΒ, ἡ ΑΘ πρὸς ΒΔ. ἦν δὲ καί, ὡς ἡ ΑΘ πρὸς ΒΔ, τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΘ· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΘ, τὸ ἀπὸ ΑΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΒ, καὶ διὰ τοῦτο, ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΘ, ἡ ΑΘ πρὸς ΘΒ. ἀλλ' ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΘ, ἡ ΕΔ πρὸς Γ καὶ ἡ Γ πρὸς Δ· καὶ ὡς ἄρα ἡ Γ πρὸς Δ, ἡ ΑΘ πρὸς ΘΒ. ὁμοίως δὴ δειχθήσονται πᾶσαι αἱ ἀπὸ τῶν Α, Β σημείων ἐπὶ τὴν*

5. ἐπιζεύχθωσαν W, corr. m. 1. 9. ἐστίν W. 14. *ΑΖ* (alt.)] *Ζ* e corr. m. 1 W. 17. *ΘΑΒ*] *Θ* corr. ex *Β* m. 1 p. ἔστιν W.

manifestum igitur, esse $\Gamma$ mediam proportionalem inter $E + \varDelta$ et $\varDelta$, $H$ autem inter $AZ$ et $ZB$.[1]) et centro $Z$ radio autem $H$ describatur circulus $K\Theta$. manifestum igitur, arcum $K\Theta$ rectam $AB$ secare; nam recta $H$ media proportionalis est inter $AZ$, $ZB$. iam in ambitu punctum aliquod sumatur $\Theta$, ducanturque $\Theta A$, $\Theta B$, $\Theta Z$. itaque $\Theta Z = H$; quare $AZ : Z\Theta = Z\Theta : ZB$. et circum eundem angulum $\Theta ZB$ latera proportionalia sunt; itaque trianguli $AZ\Theta$, $\Theta BZ$ similes sunt et $\angle Z\Theta B = \Theta AB$ [Eucl. VI, 6]. iam per $B$ rectae $A\Theta$ parallela ducatur $B\varDelta$. quoniam igitur est

$$AZ : Z\Theta = Z\Theta : ZB,$$

erit etiam [Eucl. V def. 9] $AZ : ZB = AZ^2 : Z\Theta^2$. uerum $AZ : ZB = A\Theta : B\varDelta$ [Eucl. VI, 4]; quare etiam $AZ^2 : Z\Theta^2 = A\Theta : B\varDelta$. rursus quoniam $\angle B\Theta Z = \Theta AB$ et etiam $\angle A\Theta B = \Theta B\varDelta$ [Eucl. I, 29] (alterni enim sunt), etiam reliquus reliquo aequalis est, et triangulus $A\Theta B$ triangulo $B\Theta\varDelta$ similis est et latera aequales angulos comprehendentia proportionalia [Eucl. VI, 4] $A\Theta : \Theta B = \Theta B : B\varDelta$; et $A\Theta^2 : \Theta B^2 = A\Theta : B\varDelta$ [Eucl. V def. 9]. erat autem etiam $A\Theta : B\varDelta = AZ^2 : Z\Theta^2$. quare

$$AZ^2 : Z\Theta^2 = A\Theta^2 : \Theta B^2 \text{ et } AZ : Z\Theta = A\Theta : \Theta B.$$

sed $AZ : Z\Theta = E + \varDelta : \Gamma = \Gamma : \varDelta$ [u. not.]. quare etiam $\Gamma : \varDelta = A\Theta : \Theta B$. iam eodem modo demonstrabimus, omnes rectas a punctis $A$, $B$ ad

1) Erat $E : AB = \varDelta : BZ = \Gamma : H = E + \varDelta : AZ$. itaque $E + \varDelta : \Gamma = AZ : H = \Gamma : \varDelta = H : BZ$.

19. ἐστίν] ἐστί p. ἐστι] ἐστιν W. 20. $B\Theta\varDelta$] $B$ e corr. p. 25. καί] seq. lacuna 1 litt. p, καὶ ἡ W.

περιφέρειαν τοῦ κύκλου κλώμεναι τὸν αὐτὸν ἔχουσαι λόγον ταῖς Γ, Δ.

λέγω δή, ὅτι πρὸς ἄλλῳ σημείῳ μὴ ὄντι ἐπὶ τῆς περιφερείας οὐ γίνεται λόγος τῶν ἀπὸ τῶν Α, Β σημείων ἐπ' αὐτὸ ἐπιζευγνυμένων εὐθειῶν ὁ αὐτὸς τῷ τῆς Γ πρὸς Δ.

εἰ γὰρ δυνατόν, γεγονέτω πρὸς τῷ Μ ἐκτὸς τῆς περιφερείας· καὶ γὰρ εἰ ἐντὸς ληφθείη, τὸ αὐτὸ ἄτοπον συμβήσεται καθ' ἑτέραν τῶν ὑποθέσεων· καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΜΑ, ΜΒ, ΜΖ, καὶ ὑποκείσθω, ὡς ἡ Γ πρὸς Δ, οὕτως ἡ ΑΜ πρὸς ΜΒ. ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΕΔ πρὸς Δ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΕΔ πρὸς τὸ ἀπὸ Γ καὶ τὸ ἀπὸ ΑΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΒ. ἀλλ' ὡς ἡ ΕΔ πρὸς Δ, οὕτως ὑπόκειται ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ, τὸ ἀπὸ ΑΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΒ. καὶ διὰ τὰ προδειχθέντα, ἐὰν ἀπὸ τοῦ Β τῇ ΑΜ παράλληλον ἀγάγωμεν, δειχθήσεται, ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ, τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΜ. ἐδείχθη δὲ καί, ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ, τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΘ. ἴση ἄρα ἡ ΖΘ τῇ ΖΜ· ὅπερ ἀδύνατον.

τόποι οὖν ἐπίπεδοι λέγονται τὰ τοιαῦτα· οἱ δὲ λεγόμενοι στερεοὶ τόποι τὴν προσωνυμίαν ἐσχήκασιν ἀπὸ τοῦ τὰς γραμμάς, δι' ὧν γράφονται τὰ κατ' αὐτοὺς προβλήματα, ἐκ τῆς τομῆς τῶν στερεῶν τὴν γένεσιν ἔχειν, οἷαί εἰσιν αἱ τοῦ κώνου τομαὶ καὶ ἕτεραι πλείους. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι τόποι πρὸς ἐπιφάνειαν λεγόμενοι, οἳ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχουσιν ἀπὸ τῆς περὶ αὐτοὺς ἰδιότητος.

---

2. Γ] Δ Wp, corr. U. 3. ἄλλῳ] corr. ex ἄλλο m. 1 W. 4. τῶν Α] scripsi, Δ Wp. 9. ἑτέραν] scr. ἑκατέραν.

ambitum circuli fractas eandem rationem habere quam $\Gamma : \Delta$.

iam dico, ad nullum aliud punctum, quod in ambitu non sit, rationem rectarum a punctis $A$, $B$ ad id ductarum eandem fieri quam $\Gamma : \Delta$.

nam si fieri potest, fiat ad $M$ extra ambitum positum; nam etiam si intra eum sumitur, idem absurdum euenit per utramque suppositionem; ducanturque $MA$, $MB$, $MZ$, et supponatur $\Gamma : \Delta = AM : MB$. itaque

$$E + \Delta : \Delta = (E + \Delta)^2 : \Gamma^2 = AM^2 : MB^2$$

[p. 183 not. 1]. supposuimus autem

$$E + \Delta : \Delta = AZ : ZB;$$

quare etiam $AZ : ZB = AM^2 : MB^2$. et eodem modo, quo supra demonstratum est [p. 182, 11 sq.], si a $B$ rectae $AM$ parallelam duxerimus, demonstrabimus, esse $AZ : ZB = AZ^2 : ZM^2$. demonstrauimus autem, esse etiam $AZ : ZB = AZ^2 : Z\Theta^2$ [p. 182, 13 sq.]. ergo $Z\Theta = ZM$; quod fieri non potest.

plana igitur loca talia uocantur, solida uero quae uocantur loca nomen inde acceperunt, quod lineae, per quas problemata ad ea pertinentia soluuntur, e sectione solidorum originem ducunt, quales sunt coni sectiones aliaeque complures. sunt autem et alia loca ad superficiem quae uocantur a proprietate sua ita denominata.

---

10. $MB$] $M$ e corr. p. 12. οὕτω p. 14. —ως ὑπόκ. — 17. ἡ $AZ$] in ras. m. 1 p. 21. δέ] addidi; om. Wp. 22. προσονυμίαν W. 25. ἔχειν] ἔχει Wp, corr. U. 26. εἰσίν W. 27. ἐπωνυμίαν] ω corr. ex ο m. 1 p, ἐπονυμίαν W. 28. εἰδιότητος W.

μέμφεται δὲ ἑξῆς τῷ Εὐκλείδῃ οὐχ, ὡς οἴεται Πάππος καὶ ἕτεροί τινες, διὰ τὸ μὴ εὑρηκέναι δύο μέσας ἀνάλογον· ὅ τε γὰρ Εὐκλείδης ὑγιῶς εὗρε τὴν μίαν μέσην ἀνάλογον, ἀλλ' οὐχ ὡς αὐτός φησιν οὐκ εὐτυχῶς, καὶ περὶ τῶν δύο μέσων οὐδὲ ὅλως ἐπεχείρησε ζητῆσαι ἐν τῇ στοιχειώσει, αὐτὸς ὅ τε Ἀπολλώνιος οὐδὲν περὶ τῶν δύο μέσων ἀνάλογον φαίνεται ζητῆσαι ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ· ἀλλ', ὡς ἔοικεν, ἑτέρῳ βιβλίῳ περὶ τόπων γεγραμμένῳ τῷ Εὐκλείδῃ ἐπισκήπτει, ὅπερ εἰς ἡμᾶς οὐ φέρεται.

τὰ δὲ ἐφεξῆς περὶ τοῦ τετάρτου βιβλίου λεγόμενα σαφῆ ἐστιν. τὸ δὲ πέμπτον φησὶ περιέχειν τὰ περὶ τῶν ἐλαχίστων καὶ μεγίστων. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ κύκλου ἐμάθομεν ἐν τῇ στοιχειώσει, ὅτι ἔστι τι σημεῖον ἐκτός, ἀφ' οὗ τῶν μὲν πρὸς τὴν κοίλην περιφέρειαν προσπιπτουσῶν μεγίστη ἐστὶν ἡ διὰ τοῦ κέντρου, τῶν δὲ πρὸς τὴν κυρτὴν ἐλαχίστη ἐστὶν ἡ μεταξὺ τοῦ σημείου καὶ τῆς διαμέτρου, οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν τοῦ κώνου τομῶν ζητεῖ ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ. τοῦ δὲ ἕκτου καὶ ἑβδόμου καὶ ὀγδόου σαφῶς ἡ πρόθεσις ὑπ' αὐτοῦ εἴρηται. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς ἐπιστολῆς.

Ἀρχόμενος δὲ τῶν ὅρων γένεσιν ὑπογράφει κωνικῆς ἐπιφανείας, ἀλλ' οὐ τὸν τί ἔστι διορισμὸν παραδέδωκεν· ἔξεστι δὲ τοῖς βουλομένοις ἐκ τῆς γενέσεως αὐτῆς τὸν ὅρον λαμβάνειν. τὸ δὲ λεγόμενον ὑπ' αὐτοῦ διὰ καταγραφῆς σαφὲς ποιήσομεν·

ἐὰν ἀπό τινος σημείου πρὸς κύκλου περιφέρειαν καὶ τὰ ἑξῆς. ἔστω κύκλος ὁ $AB$, οὗ κέν-

---

1. ἑξῆς] ἑ- in ras. m. 1 p. 3. ὑγειῶς W. εὗρεν W. 5. ἐπιχείρησεν mut. in ἐπεχείρησεν m. 1 W. 7. μέσων] σημείων Wp, corr. Comm. 9. τόποι W. 12. ἐστι p. 12.

deinde uero Euclidem uituperat [I p. 4, 13], non, ut Pappus et alii quidam putant, quod duas medias proportionales non inuenerit; nam et Euclides recte unam mediam proportionalem inuenit, nec ut ille dicit [I p. 4, 15] „non optime", duasque medias in Elementis omnino non adgressus est, et Apollonius ipse in tertio libro de duabus mediis proportionalibus nihil quaerere uidetur; sed, ni fallor, alium quendam librum ab Euclide de locis scriptum uituperat, qui nunc non exstat.

quae deinde de libro quarto dicit, manifesta sunt. quintum autem de minimis et maximis tractare dicit [I p. 4, 23]. sicut enim in Elementis [III, 8] in circulo didicimus, esse punctum aliquod extra circulum, unde quae ad cauam partem ambitus adcidant, earum maximam esse, quae per centrum ducta sit, rectarum autem ad conuexam partem ambitus adcidentium minimam esse, quae inter punctum et diametrum posita sit, ita similia in sectionibus coni quaerit in quinto libro. de sexto autem et septimo et octauo propositum ipse satis clare exposuit. haec de epistula.

Definitiones autem ordiens originem superficiei conicae describit, sed quae sit, non definit; licet autem iis, qui uoluerint, ex origine definitionem deriuare. sed quod dicit, figura manifestum reddemus.

si a puncto aliquo ad ambitum circuli et quae sequuntur [I p. 6, 2]. sit circulus *AB*, cuius

---

φησίν W. 14. στοιχειόσει W, sed corr. m. 1. τῶν] in ras. m. 1 W. 15. περιφέρει- in ras. m. 1 W. 18. οὕτω p. 23. τόν] scripsi; τό Wp. ἔστιν W. διορισμόν] scripsi; διορισμοῦ Wp. 24. ἔξεστιν W. 27—28. ξ mg. W.

τρον τὸ *Γ*, καὶ σημεῖόν τι μετέωρον τὸ *Δ*, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ *ΔΒ* ἐκβεβλήσθω εἰς ἄπειρον ἐφ' ἑκάτερα μέρη ὡς ἐπὶ τὰ *Ε*, *Ζ*. ἐὰν δὴ μένοντος τοῦ *Δ* ἡ *ΔΒ* φέρηται, ἕως ἂν τὸ *Β* ἐνεχθὲν κατὰ τῆς τοῦ *ΑΒ* κύκλου περιφερείας ἐπὶ τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ, ὅθεν ἤρξατο φέρεσθαι, γεννήσει ἐπιφάνειάν τινα, ἥτις σύγκειται ἐκ δύο ἐπιφανειῶν ἁπτομένων ἀλλήλων κατὰ τὸ *Δ*, ἣν καὶ καλεῖ κωνικὴν ἐπιφάνειαν. φησὶ δέ, ὅτι καὶ εἰς ἄπειρον αὔξεται διὰ τὸ καὶ τὴν γράφουσαν αὐτὴν εὐθεῖαν οἷον τὴν *ΔΒ* εἰς ἄπειρον ἐκβάλλεσθαι. κορυφὴν δὲ τῆς ἐπιφανείας λέγει τὸ *Δ*, ἄξονα δὲ τὴν *ΔΓ*.


κῶνον δὲ λέγει τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπό τε τοῦ *ΑΒ* κύκλου καὶ τῆς ἐπιφανείας, ἣν μόνη γράφει ἡ *ΔΒ* εὐθεῖα, κορυφὴν δὲ τοῦ κώνου τὸ *Δ*, ἄξονα δὲ τὴν *ΔΓ*, βάσιν δὲ τὸν *ΑΒ* κύκλον.

καὶ ἐὰν μὲν ἡ *ΔΓ* πρὸς ὀρθὰς ᾖ τῷ *ΑΒ* κύκλῳ, ὀρθὸν καλεῖ τὸν κῶνον, ἐὰν δὲ μὴ πρὸς ὀρθάς, σκαληνόν· γενήσεται δὲ κῶνος σκαληνός, ὅταν λαβόντες κύκλον ἀπὸ τοῦ κέντρου αὐτοῦ ἀναστήσωμεν εὐθεῖαν μὴ πρὸς ὀρθὰς τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ κύκλου, ἀπὸ δὲ τοῦ μετεώρου σημείου τῆς ἀναταθείσης εὐθείας ἐπὶ τὸν κύκλον ἐπιζεύξωμεν εὐθεῖαν καὶ περιαγάγωμεν τὴν ἐπιζευχθεῖσαν εὐθεῖαν περὶ τὸν κύκλον τοῦ πρὸς τῷ μετεώρῳ σημείῳ τῆς ἀναταθείσης μένοντος· τὸ γὰρ προσληφθὲν σχῆμα κῶνος ἔσται σκαληνός.

---

2. εἰς] ἐπ' p. 3. δή] δέ Wp, corr. Comm. *ΔΒ*] *Δ* e corr. m. 1 W. 5. ἀποκατασταθεῖ W. 9. φησίν W. 10. *ΔΒ*] p, *ΑΒ* W. 15. εὐθεῖα] om. p. τὸ *Δ* ἄξο- in ras. m. 1 W. 22. ἀνασταθείσης Halley ut lin. 25. 26. προληφθέν Wp, corr. vw; fort. περιληφθέν. In fig. *Λ* pro *Α* W, corr. m. 2.

centrum sit $\Gamma$, et punctum aliquod sublime $\Delta$, ductaque $\Delta B$ in infinitum producatur in utramque partem ut ad $E$, $Z$. si igitur manente $\Delta$ mouebitur $\Delta B$, donec $B$ per ambitum circuli $AB$ circumactum rursus ad eundem locum perueniat, unde moueri coeptum est, superficiem quandam efficiet, quae ex duabus superficiebus inter se in $\Delta$ tangentibus composita est, quam superficiem conicam uocat. dicit autem [I p. 6, 9 sq.], eam in infinitum crescere, quod recta eam describens ut $\Delta B$ in infinitum producatur. uerticem autem superficiei punctum $\Delta$ uocat et axem $\Delta\Gamma$ [I p. 6, 11 sq.].




conum autem uocat [I p. 6, 14 sq.] figuram comprehensam circulo $AB$ et superficie, quam describit recta $\Delta B$ sola, uerticem autem coni $\Delta$, axem autem $\Delta\Gamma$, basim autem circulum $AB$.

et si $\Delta\Gamma$ ad circulum $AB$ perpendicularis est, conum rectum uocat [I p. 6, 20 sq.], sin perpendicularis non est, obliquum; obliquus autem conus orietur, si sumpto circulo a centro rectam erexerimus ad planum circuli non perpendicularem, et a puncto sublimi rectae erectae ad circulum rectam duxerimus ductamque rectam per circulum circumegerimus manente eo puncto, quod ad punctum sublime rectae erectae positum est; nam figura ita comprehensa conus erit obliquus.


δῆλον δέ, ὅτι ἡ περιαγομένη εὐθεῖα ἐν τῇ περιαγωγῇ μείζων καὶ ἐλάττων γίνεται, κατὰ δέ τινας θέσεις καὶ ἴση πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον τοῦ κύκλου. ἀποδείκνυται δὲ τοῦτο οὕτως· ἐὰν κώνου σκαληνοῦ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν ἀχθῶσιν εὐθεῖαι, πασῶν τῶν ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν ἀχθεισῶν εὐθειῶν μία μέν ἐστιν ἐλαχίστη μία δὲ μεγίστη, δύο δὲ μόναι ἴσαι παρ' ἑκάτερα τῆς ἐλαχίστης καὶ τῆς μεγίστης, ἀεὶ δὲ ἡ ἔγγιον τῆς ἐλαχίστης τῆς ἀπώτερόν ἐστιν ἐλάσσων. ἔστω κῶνος σκαληνός, οὗ βάσις μὲν ὁ $ΑΒΓ$ κύκλος, κορυφὴ δὲ τὸ $Δ$ σημεῖον. καὶ ἐπεὶ ἡ ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ σκαληνοῦ κώνου ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον κάθετος ἀγομένη ἤτοι ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ $ΑΒΓΖΗ$ κύκλου πεσεῖται ἢ ἐκτὸς ἢ ἐντός, ἐμπιπτέτω πρότερον ἐπὶ τῆς περιφερείας ὡς ἐπὶ τῆς πρώτης καταγραφῆς ἡ $ΔΕ$, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου καὶ ἔστω τὸ $Κ$, καὶ ἀπὸ τοῦ $Ε$ ἐπὶ τὸ $Κ$ ἐπεζεύχθω ἡ $ΕΚ$ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ $Β$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $ΒΔ$, καὶ εἰλήφθωσαν δύο ἴσαι περιφέρειαι παρ' ἑκάτερα τοῦ $Ε$ αἱ $ΕΖ$, $ΕΗ$, καὶ παρ' ἑκάτερα τοῦ $Β$ αἱ $ΑΒ$, $ΒΓ$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $ΕΖ$, $ΕΗ$, $ΔΖ$, $ΔΗ$, $ΕΑ$, $ΕΓ$, $ΑΒ$, $ΒΓ$, $ΔΑ$, $ΔΓ$. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ $ΕΖ$ εὐθεῖα τῇ $ΕΗ$ εὐθείᾳ· ἴσας γὰρ περιφερείας ὑποτείνουσιν· κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ $ΔΕ$, βάσις ἄρα ἡ $ΔΖ$ τῇ $ΔΗ$ ἐστιν ἴση. πάλιν ἐπεὶ ἡ $ΑΒ$ περιφέρεια τῇ $ΒΓ$ ἐστιν ἴση, καὶ διάμετρος

---

5. ἀπό — ἀ-] in ras. m. 1 W. ⊱ mg. W. 9. ἔγγειον W. 15. τῆς] τῆς πρώτης κατά W (e lin. 16). 18. ἐπιζεύχθω W. 20. $Ε$] e corr. m. 1 p. $ΕΗ$] $Ε$ corr. ex $Γ$ p. 22. $ΒΓ$] $ΑΓ$ Wp, corr. U. $ΔΑ$] $ΔΑ$, $ΔΒ$ Wp; corr. Comm. 26. $ΒΓ$] $ΔΓ$ Wp, corr. U.

adparet autem, rectam circumactam in circumagendo maiorem et minorem fieri, in quibusdam autem positionibus etiam aequalem ad diuersa puncta circuli ductam. quod sic demonstratur:

si a uertice coni obliqui ad basim rectae ducuntur, omnium rectarum a uertice ad basim ductarum una minima est, una maxima, duaeque solae aequales ad utramque partem minimae et maximae, semper autem propior minimae minor est remotiore. sit conus obliquus, cuius basis sit circulus $AB\Gamma$, uertex autem $\Delta$ punctum. et quoniam recta a uertice coni obliqui ad planum subiacens perpendicularis ducta aut in ambitum circuli $AB\Gamma ZH$ ueniet aut extra aut intra, primum ad ambitum adcidat




ut in prima figura $\Delta E$, sumaturque centrum circuli et sit $K$, ab $E$ autem ad $K$ ducatur $EK$ producaturque ad $B$, et ducatur $B\Delta$, sumantur autem ad utramque partem puncti $E$ duo arcus aequales $EZ, EH$ et ad utramque partem puncti $B$ aequales $AB, B\Gamma$, ducanturque $EZ$, $EH, \Delta Z, \Delta H, EA, E\Gamma, AB, B\Gamma, \Delta A, \Delta\Gamma$. quoniam igitur $EZ = EH$ [Eucl. III, 29] (nam sub aequalibus arcubus subtendunt), communis autem et perpendicularis $\Delta E$, erit $\Delta Z = \Delta H$ [Eucl. I, 4]. rursus quoniam arcus $AB$ arcui $B\Gamma$ aequalis est et $BE$ diametrus, reliquus arcus $EZ\Gamma$ reliquo $EHA$ aequalis est; quare etiam $AE = E\Gamma$ [Eucl. III, 29]. $E\Delta$ autem communis

ἡ $BE$, λοιπὴ ἄρα ἡ $EZΓ$ τῇ $EHA$ ἐστιν ἴση· ὥστε καὶ ἡ $AE$ τῇ $EΓ$. κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ $EΔ$· βάσις ἄρα ἡ $ΔA$ τῇ $ΔΓ$ ἐστιν ἴση. ὁμοίως δὴ καὶ πᾶσαι δειχθήσονται αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τῆς $ΔE$ ἢ τῆς $ΔB$ ἴσαι. πάλιν ἐπεὶ τριγώνου τοῦ $ΔEZ$ ὀρθή ἐστι γωνία ἡ ὑπὸ $ΔEZ$, μείζων ἐστὶν ἡ $ΔZ$ τῆς $ΔE$. καὶ πάλιν ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ $EA$ εὐθεῖα τῆς $EZ$, ἐπεὶ καὶ περιφέρεια ἡ $EZA$ τῆς $EZ$ περιφερείας, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ $ΔE$, ἡ $ΔZ$ ἄρα τῆς $ΔA$ ἐλάσσων ἐστίν. διὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ $ΔA$ τῆς $ΔB$ ἐλάσσων ἐστίν. ἐπεὶ οὖν ἡ $ΔE$ τῆς $ΔZ$ ἐλάσσων ἐδείχθη, ἡ δὲ $ΔZ$ τῆς $ΔA$, ἡ δὲ $ΔA$ τῆς $ΔB$, ἐλαχίστη μέν ἐστιν ἡ $ΔE$, μεγίστη δὲ ἡ $ΔB$, ἀεὶ δὲ ἡ ἔγγιον τῆς $ΔE$ τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων ἐστίν.


ἀλλὰ δὴ ἡ κάθετος πιπτέτω ἐκτὸς τοῦ $ABΓHZ$ κύκλου ὡς ἐπὶ τῆς δευτέρας καταγραφῆς ἡ $ΔE$, καὶ εἰλήφθω πάλιν τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ $K$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $EK$ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ $B$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $ΔB$, $ΔΘ$, καὶ εἰλήφθωσαν δύο ἴσαι περιφέρειαι παρ' ἑκάτερα τοῦ $Θ$ αἱ $ΘZ$, $ΘH$ καὶ παρ' ἑκάτερα τοῦ $B$ αἱ $AB$, $BΓ$, καί ἐπεζεύχθωσαν αἱ $EZ$, $EH$, $ZK$, $HK$, $ΔZ$, $ΔH$, $AB$, $BΓ$, $KA$, $KΓ$, $ΔK$, $ΔA$, $ΔΓ$. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ $ΘZ$ περιφέρεια τῇ $ΘH$, καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ $ΘKZ$ τῇ ὑπὸ $ΘKH$ ἐστιν ἴση. ἐπεὶ οὖν ἡ $ZK$ εὐθεῖα τῇ $KH$ ἐστιν ἴση· ἐκ κέντρου γάρ· κοινὴ δὲ ἡ $KE$, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $ZKE$

---

1. $BE$] corr. ex $ΔE$ m. 1 W, $ΔE$ p. 4. αἱ] scripsi, om. Wp. 5. ἐστιν W. 10. ταὐτά p. 13. $ΔE$] $E$ e corr. p. 15. δή] p, δέ W. $ABΓHZ$] $ABΓZH$ p. 16. $ΔE$] $E$ e corr. m. 1 p. 19. $ΔB$] $Δ$ corr. ex $B$ in scribendo W. ἴσαι] supra scr. m. 1 W. 22. $ΔK$] om. Comm. 23. $ΔA$] $ΔA$, $ΔB$ Wp; corr. Comm. 26. $KE$] $KΘ$ Wp; corr. Comm.

est et perpendicularis; itaque $\Delta A = \Delta \Gamma$. similiter demonstrabimus, omnes rectas, quae a $\Delta E$ uel $\Delta B$ aequaliter distent, aequales esse. rursus quoniam trianguli $\Delta EZ$ angulus $\Delta EZ$ rectus est, erit $\Delta Z > \Delta E$ [Eucl. I, 19]. et rursus quoniam $EA > EZ$, quia etiam arcus $EZA > EZ$ [Eucl. III, 29], et $\Delta E$ communis est et perpendicularis, erit $\Delta Z < \Delta A$ [Eucl. I, 47]. eadem de causa etiam $\Delta A < \Delta B$. quoniam igitur demonstrauimus, esse $\Delta E < \Delta Z$, $\Delta Z < \Delta A$, $\Delta A < \Delta B$, minima erit $\Delta E$, maxima $\Delta B$, semper autem, quae rectae $\Delta E$ propior est, minor remotiore.[1])

iam uero perpendicularis extra circulum $AB\Gamma HZ$ cadat ut in secunda figura $\Delta E$, rursusque sumatur centrum circuli $K$, et ducatur $EK$ producaturque ad $B$, et ducantur $\Delta B$, $\Delta \Theta$, sumantur autem ad utramque partem puncti $\Theta$ duo arcus aequales $\Theta Z$, $\Theta H$ et ad utramque partem puncti $B$ aequales $AB$, $B\Gamma$, ducanturque $EZ$, $EH$, $ZK$, $HK$, $\Delta Z$, $\Delta H$, $AB$, $B\Gamma$, $KA$, $K\Gamma$, $\Delta K$, $\Delta A$, $\Delta \Gamma$. quoniam igitur arcus $\Theta Z = \Theta H$, erit etiam $\angle\ \Theta KZ = \Theta KH$ [Eucl. II, I27]. quoniam igitur $ZK = KH$ (radii enim sunt), et $KE$ communis est, et $\angle\ ZKE = HKE$, erit $ZE = HE$




1) Nam $\Delta A = \Delta \Gamma$. itaque $\Delta E < \Delta Z < \Delta \Gamma < \Delta B$.

τῇ ὑπὸ *ΗΚΕ* ἴσῃ, καὶ βάσις ἡ *ΖΕ* τῇ *ΗΕ* ἴσῃ. ἐπεὶ οὖν ἡ *ΖΕ* εὐθεῖα τῇ *ΗΕ* ἐστιν ἴση, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ *ΕΔ*, βάσις ἄρα ἡ *ΔΖ* τῇ *ΔΗ* ἐστιν ἴση. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ *ΒΑ* περιφέρεια τῇ *ΒΓ*, καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ *ΑΚΒ* τῇ ὑπὸ *ΓΚΒ* ἐστιν ἴση· ὥστε καὶ λοιπὴ εἰς τὰς δύο ὀρθὰς ἡ ὑπὸ *ΑΚΕ* λοιπῇ εἰς τὰς δύο ὀρθὰς τῇ ὑπὸ *ΓΚΕ* ἐστιν ἴση. ἐπεὶ οὖν ἡ *ΑΚ* εὐθεῖα τῇ *ΓΚ* ἐστιν ἴση· ἐκ κέντρου γάρ· κοινὴ δὲ ἡ *ΚΕ*, δύο δυσὶν ἴσαι, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ *ΑΚΕ* τῇ ὑπὸ *ΓΚΕ*· καὶ βάσις ἄρα ἡ *ΑΕ* τῇ *ΓΕ* ἐστιν ἴση. ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ *ΑΕ* εὐθεῖα τῇ *ΓΕ*, κοινὴ δὲ ἡ *ΕΔ* καὶ πρὸς ὀρθάς, βάσις ἄρα ἡ *ΔΑ* τῇ *ΔΓ* ἴση. ὁμοίως δὲ καὶ πᾶσαι δειχθήσονται αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τῆς *ΔΒ* ἢ τῆς *ΔΘ* ἴσαι. καὶ ἐπεὶ ἡ *ΕΘ* τῆς *ΕΖ* ἐστιν ἐλάσσων, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ *ΕΔ*, βάσις ἄρα ἡ *ΔΘ* βάσεως τῆς *ΔΖ* ἐστιν ἐλάσσων. πάλιν ἐπεὶ ἡ ἀπὸ τοῦ *Ε* ἐφαπτομένη τοῦ κύκλου πασῶν τῶν πρὸς τὴν κυρτὴν περιφέρειαν προσπιπτουσῶν μείζων ἐστίν, ἐδείχθη δὲ ἐν τῷ γ' τῆς στοιχειώσεως τὸ ὑπὸ *ΑΕ*, *ΕΛ* ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς *ΕΖ*, ὅταν ἡ *ΕΖ* ἐφάπτηται, ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ *ΑΕ* πρὸς *ΕΖ*, ἡ *ΕΖ* πρὸς *ΕΛ*. μείζων δέ ἐστιν ἡ *ΕΖ* τῆς *ΕΛ*· ἀεὶ γὰρ ἡ ἔγγιον τῆς ἐλαχίστης τῆς ἀπώτερόν ἐστιν ἐλάσσων· μείζων ἄρα καὶ ἡ *ΑΕ* τῆς *ΕΖ*. ἐπεὶ οὖν ἡ *ΕΖ* τῆς *ΕΑ* ἐστιν ἐλάσσων, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ *ΕΔ*, βάσις ἄρα ἡ *ΔΖ* τῆς *ΔΑ* ἐστιν ἐλάσσων. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ *ΑΚ* τῇ *ΚΒ*, κοινὴ δὲ ἡ *ΚΕ*, δύο ἄρα αἱ *ΑΚ*, *ΚΕ* ταῖς *ΕΚ*, *ΚΒ*, τουτέστιν ὅλῃ τῇ *ΕΚΒ*, εἰσιν ἴσαι. ἀλλ' αἱ *ΑΚ*, *ΚΕ* τῆς *ΑΕ* μείζονές εἰσιν· καὶ ἡ *ΒΕ*

1. *ΖΕ*] *ΖΘ* p. *ΗΕ*] *ΗΘ*, *Η* e corr. m. 1, p. 2. *ΖΕ*] *ΖΘ*? p. *ΗΕ*] *ΗΘ* p. 4. *ΒΑ*] βάσις Wp, corr. Comm.

[Eucl. I, 4]. quoniam igitur $ZE = HE$, et $E\varDelta$ communis perpendicularisque, erit $\varDelta Z = \varDelta H$ [Eucl. I, 4]. rursus quoniam arcus $BA = B\Gamma$, erit etiam

$$\angle AKB = \Gamma KB$$

[Eucl. III, 27]. quare etiam qui reliquus est ad duos rectos explendos, $\angle AKE = \Gamma KE$, qui reliquus est ad duos rectos explendos. quoniam igitur $AK = \Gamma K$ (radii enim sunt), et communis est $KE$, duo latera duobus aequalia sunt, et $\angle AKE = \Gamma KE$; quare etiam $AE = \Gamma E$. quoniam igitur $AE = \Gamma E$, et $E\varDelta$ communis est perpendicularisque, erit $\varDelta A = \varDelta \Gamma$ [Eucl. I, 4]. et similiter demonstrabimus, etiam omnes rectas, quae a $\varDelta B$ uel $\varDelta \Theta$ aequaliter distent, aequales esse. et quoniam $E\Theta < EZ$, $E\varDelta$ autem communis et perpendicularis, erit $\varDelta\Theta < \varDelta Z$ [Eucl. I, 47]. rursus quoniam recta ab $E$ circulum contingens omnibus rectis ad conuexum ambitum adcidentibus maior est, et in tertio libro Elementorum [III, 36] demonstratum est, esse $AE \times E\varLambda = EZ^2$, si $EZ$ contingit, erit [Eucl. VI, 17] $AE : EZ = EZ : E\varLambda$. uerum $EZ > E\varLambda$ [Eucl. III, 8]; nam semper proxima quaeque minimae minor est remotiore; itaque etiam $AE > EZ$ [Eucl. V, 14]. quoniam igitur $EZ < E\varLambda$, $E\varDelta$ autem communis et perpendicularis, erit $\varDelta Z < \varDelta\varLambda$ [Eucl. I, 47]. rursus quoniam $AK = KB$, communis autem $KE$, duae rectae $AK$, $KE$ duabus $EK$, $KB$ siue toti $EKB$ aequales

6. λοιπή — $AKE$] om. p. 9. $AKE$] $K$ e corr. p. 10. $AE$] $E$ e corr. m. 1 W. 12. $\varDelta\Gamma$] $A\Gamma$ Wp, corr. Comm. 15. ἐλλάσσων W. 20. τῷ] pvw, τό W. ὅταν] ὅταν ᾖ in extr. lin. W. 24. $EZ$] $E$ e corr. p. $E\varLambda$] $E\varLambda$ Wp, corr. Halley. 26. ἐστίν] pvw, ins. m. 2 W. 27. $KB$] $KB$ ἐστιν W (fort. recte); ἐστιν del. m. 2.

ἄρα τῆς ΑΕ μείζων ἐστίν. πάλιν ἐπεὶ ἡ ΑΕ τῆς ΕΒ ἐστιν ἐλάσσων, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΕΔ, βάσις ἄρα ἡ ΔΑ τῆς ΒΔ ἐστιν ἐλάσσων. ἐπεὶ οὖν ἡ ΔΘ τῆς ΔΖ ἐστιν ἐλάσσων, ἡ δὲ ΔΖ τῆς ΔΑ, ἡ δὲ ΔΑ τῆς ΔΒ, ἐλαχίστη μέν ἐστιν ἡ ΔΘ, μεγίστη δὲ ἡ ΔΒ, ἀεὶ δὲ ἡ ἔγγιον καὶ τὰ ἑξῆς.


ἀλλὰ δὴ ἡ κάθετος πιπτέτω ἐντὸς τοῦ ΑΒΓΗΖ κύκλου ὡς ἐπὶ τῆς τρίτης καταγραφῆς ἡ ΔΕ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Κ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΚ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ τὰ Β, Θ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΘ, ΔΒ, καὶ εἰλήφθωσαν δύο ἴσαι περιφέρειαι παρ' ἑκάτερα τοῦ Θ αἱ ΘΖ, ΘΗ καὶ παρ' ἑκάτερα τοῦ Β αἱ ΑΒ, ΒΓ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΖ, ΕΗ, ΖΚ, ΗΚ, ΔΖ, ΔΗ, ΚΑ, ΚΓ, ΕΑ, ΕΓ, ΔΑ, ΔΓ, ΑΒ, ΒΓ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ ΘΖ περιφέρεια τῇ ΘΗ, καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΘΚΖ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΘΚΗ ἐστιν ἴση. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΚΖ τῇ ΗΚ, κοινὴ δὲ ἡ ΚΕ, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΖΚΕ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΗΚΕ ἐστιν ἴση, βάσις ἄρα ἡ ΖΕ τῇ ΗΕ ἐστιν ἴση. ἐπεὶ οὖν ἡ ΖΕ τῇ ΗΕ ἐστιν ἴση, κοινὴ δὲ ἡ ΔΕ, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΖΕΔ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΗΕΔ ἐστιν ἴση, βάσις ἄρα ἡ ΔΖ τῇ ΔΗ ἐστιν ἴση. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΒ περιφέρεια τῇ ΒΓ, καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΚΒ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΓΚΒ ἐστιν ἴση· ὥστε καὶ λοιπὴ εἰς τὰς δύο ὀρθὰς ἡ ὑπὸ ΑΚΕ λοιπῇ εἰς τὰς δύο ὀρθὰς τῇ ὑπὸ ΓΚΕ ἐστιν ἴση. ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΚ τῇ ΚΓ ἐστιν ἴση, κοινὴ δὲ ἡ ΕΚ, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΚΕ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΓΚΕ

---

3. ΔΑ] e corr. p. 12. αἱ] p, ἡ W (?). 15. ΔΓ] ΔΒ, ΔΓ W et e corr. p; corr. Comm. 17. τῇ] τῆς W.

sunt. uerum $AK + KE > AE$ [Eucl. I, 20]; quare etiam $BE > AE$. rursus quoniam $AE < EB$, $E\Delta$ autem communis et perpendicularis, erit $\Delta A < B\Delta$ [Eucl. I, 47]. quoniam igitur $\Delta\Theta < \Delta Z$, $\Delta Z < \Delta A$, $\Delta A < \Delta B$, minima est $\Delta\Theta$, maxima autem $\Delta B$, et proxima quaeque cet.

iam uero perpendicularis intra circulum $AB\Gamma HZ$ cadat ut in tertia figura $\Delta E$, et sumatur centrum circuli $K$, ducaturque $EK$ et ad utramque partem producatur ad $B, \Theta$, ducanturque $\Delta\Theta$, $\Delta B$, sumantur autem ad utramque partem puncti $\Theta$ arcus aequales $\Theta Z$, $\Theta H$ et ad utramque partem puncti $B$ aequales $AB$, $B\Gamma$, ducanturque $EZ$, $EH$, $ZK$, $HK$, $\Delta Z$, $\Delta H$, $KA$, $K\Gamma$, $EA$, $E\Gamma$, $\Delta A$, $\Delta\Gamma$, $AB$, $B\Gamma$. quoniam igitur arcus $\Theta Z = \Theta H$, erit etiam




$$\angle\, \Theta KZ = \Theta KH$$

[Eucl. III, 27]. et quoniam est $KZ = HK$, $KE$ autem communis, et $\angle\, ZKE = HKE$, erit $ZE = EH$ [Eucl. I, 4]. quoniam igitur $ZE = HE$, communis autem $\Delta E$, et $\angle\, ZE\Delta = HE\Delta$, erit $\Delta Z = \Delta H$ [Eucl. I, 4]. rursus quoniam arcus $AB = B\Gamma$, erit

---

20. $HE$ (pr.)] in ras. m. 1 W. 26. $AKE$] $E$ in ras. m. 1 W. λοιπῇ — $\Gamma KE$] om. Wp, corr. U. ἐστ- in ras. m. 1 W.

*ἐστιν ἴση, βάσις ἄρα ἡ ΑΕ τῇ ΓΕ ἐστιν ἴση. ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΕ τῇ ΓΕ ἐστιν ἴση, κοινὴ δὲ ἡ ΕΔ, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΕΔ τῇ ὑπὸ ΓΕΔ ἴση, βάσις ἄρα ἡ ΔΑ τῇ ΔΓ ἐστιν ἴση. ὁμοίως δὴ καὶ πᾶσαι δειχθήσονται αἱ ἴσον ἀπέχουσαι ἢ τῆς ΔΒ ἢ τῆς ΔΘ ἴσαι. καὶ ἐπεὶ ἐν κύκλῳ τῷ ΑΒΓ ἐπὶ τῆς διαμέτρου εἴληπται σημεῖον τὸ Ε μὴ ὂν κέντρον τοῦ κύκλου, μεγίστη μὲν ἡ ΕΒ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΕΘ, ἀεὶ δὲ ἡ ἔγγιον τῆς ΕΘ τῆς ἀπώτερόν ἐστιν ἐλάσσων· ὥστε ἡ ΕΘ τῆς ΕΖ ἐστιν ἐλάσσων. καὶ ἐπεὶ ἡ ΘΕ τῆς ΖΕ ἐλάσσων ἐστίν, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐταῖς ἡ ΕΔ, βάσις ἄρα ἡ ΔΘ βάσεως τῆς ΔΖ ἐλάσσων ἐστίν. πάλιν ἐπεὶ ἡ μὲν ΕΖ ἔγγιόν ἐστι τῆς ΕΘ, ἡ δὲ ΑΕ πορρωτέρω, ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΕΖ τῆς ΑΕ. ἐπεὶ οὖν ἐλάσσων ἡ ΕΖ τῆς ΕΑ, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθάς ἐστιν αὐταῖς ἡ ΕΔ, βάσις ἄρα ἡ ΔΖ βάσεως τῆς ΔΑ ἐστιν ἐλάσσων. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἡ ΑΚ τῇ ΚΒ, κοινὴ δὲ ἡ ΚΕ, δύο αἱ ΑΚ, ΚΕ δύο ταῖς ΒΚ, ΚΕ, τουτέστιν ὅλῃ τῇ ΒΚΕ, εἰσιν ἴσαι. ἀλλ' αἱ ΑΚ, ΚΕ τῆς ΑΕ μείζονές εἰσιν· καὶ ἡ ΕΒ ἄρα τῆς ΕΑ μείζων ἐστίν. πάλιν ἐπεὶ ἡ ΕΑ τῆς ΕΒ ἐλάσσων ἐστίν, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐταῖς ἡ ΕΔ, βάσις ἄρα ἡ ΔΑ βάσεως τῆς ΔΒ ἐστιν ἐλάσσων. ἐπεὶ οὖν ἡ ΔΘ τῆς ΔΖ ἐλάσσων, ἡ δὲ ΔΖ τῆς ΔΑ, ἡ δὲ ΔΑ τῆς ΔΒ, ἐλαχίστη μέν ἐστιν ἡ ΔΘ καὶ τὰ ἑξῆς.*

*Πάσης καμπύλης γραμμῆς, ἥτις ἐστὶν ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ, διάμετρον καλῶ καὶ τὰ ἑξῆς. τὸ ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ εἶπε διὰ τὴν ἕλικα τοῦ κυλίνδρου καὶ*

---


4. ΔΓ] ΑΓ Wp, corr. Comm. 8. ἡ] p, αἱ W. ΕΒ] e corr. p. 13. ΑΕ] p, Ε W. 16. ΔΑ] Α e corr. p. 20. εἰσι p. 26. ⊱ mg. W. 28. εἶπεν W.

etiam $\angle AKB = \Gamma KB$ [Eucl. III, 27]. quare etiam qui ad duos rectos reliquus est, $\angle AKE = \Gamma KE$, qui ad duos rectos reliquus est. quoniam igitur $AK = K\Gamma$, communis autem $EK$, et $\angle AKE = \Gamma KE$, erit $AE = \Gamma E$ [Eucl. I, 4]. quoniam igitur $AE = \Gamma E$, communis autem $E\Delta$, et $\angle AE\Delta = \Gamma E\Delta$, erit $\Delta A = \Delta \Gamma$ [Eucl. I, 4]. iam similiter demonstrabimus, omnes rectas, quae aut a $\Delta B$ aut a $\Delta\Theta$ aequaliter distent, aequales esse. et quoniam in circulo $AB\Gamma$ in diametro sumptum est punctum $E$, quod centrum circuli non est, maxima est $EB$, minima autem $E\Theta$ et proxima quaeque rectae $E\Theta$ remotiore minor est [Eucl. III, 7]; erit igitur $E\Theta < EZ$. et quoniam est $\Theta E < ZE$, $E\Delta$ autem communis et perpendicularis, erit $\Delta\Theta < \Delta Z$ [Eucl. I, 47]. rursus quoniam $EZ$ rectae $E\Theta$ propior est, $AE$ autem remotior, erit $EZ < AE$. quoniam igitur $EZ < EA$, $E\Delta$ autem communis et ad eas perpendicularis, erit $\Delta Z < \Delta A$ [Eucl. I, 47]. rursus quoniam $AK = KB$, communis autem $KE$, erunt $AK + KE = BK + KE = BKE$. uerum $AK + KE > AE$ [Eucl. I, 20]. quare etiam $EB > EA$. rursus quoniam $EA < EB$, $E\Delta$ autem communis et ad eas perpendicularis, erit $\Delta A < \Delta B$ [Eucl. I, 47]. quoniam igitur $\Delta\Theta < \Delta Z$, $\Delta Z < \Delta A$, $\Delta A < \Delta B$, minima est $\Delta\Theta$ et quae sequuntur.

Omnis lineae curuae, quae in uno plano posita est, diametrum adpello, et quae sequuntur [I p. 6, 23]. „in uno plano" dixit propter spiralem cylindri et sphaerae; eae enim in uno plano positae non sunt. quod dicit, hoc est: sit linea curua $AB\Gamma$ et in ea rectae aliquot parallelae $A\Gamma$, $\Delta E$, $ZH$, $\Theta K$ et a puncto


τῆς σφαίρας· αὗται γὰρ οὐκ εἰσὶν ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ. ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν· ἔστω καμπύλη γραμμὴ ἡ ΑΒΓ καὶ ἐν αὐτῇ εὐθεῖαί τινες παράλληλοι αἱ ΑΓ, ΔΕ, ΖΗ, ΘΚ, καὶ διήχθω ἀπὸ τοῦ Β εὐθεῖα ἡ ΒΔ δίχα αὐτὰς τέμνουσα. φησὶν οὖν, ὅτι τῆς ΑΒΓ γραμμῆς διάμετρον μὲν καλῶ τὴν ΒΔ, κορυφὴν δὲ τὸ Β, τεταγμένως δὲ ἐπὶ τὴν ΒΔ κατῆχθαι ἑκάστην τῶν ΑΓ, ΔΕ, ΖΗ, ΘΚ. εἰ δὲ ἡ ΒΔ δίχα καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνει τὰς παραλλήλους, ἄξων καλεῖται.

Ὁμοίως δὲ καὶ δύο καμπύλων γραμμῶν καὶ τὰ ἑξῆς. ἐὰν γὰρ νοήσωμεν τὰς Α, Β γραμμὰς καὶ ἐν αὐταῖς τὰς ΓΔ, ΕΖ, ΗΘ, ΚΛ, ΜΝ, ΞΟ παραλλήλους καὶ τὴν ΑΒ διηγμένην ἐφ᾽ ἑκάτερα καὶ τέμνουσαν τὰς παραλλήλους δίχα, τὴν μὲν ΑΒ καλῶ, φησίν, πλαγίαν διάμετρον, κορυφὰς δὲ τῶν γραμμῶν τὰ Α, Β σημεῖα, τεταγμένως δὲ ἐπὶ τὴν ΑΒ τὰς ΓΔ, ΕΖ, ΗΘ, ΚΛ, ΜΝ, ΞΟ. εἰ δὲ δίχα καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτὰς τέμνει, ἄξων καλεῖται. ἐὰν δὲ διαχθεῖσά τις εὐθεῖα ὡς ἡ ΠΡ τὰς ΓΞ, ΕΜ, ΗΚ παραλλήλους τῇ ΑΒ δίχα τέμνει, ὀρθία μὲν διάμετρος καλεῖται ἡ ΠΡ, τεταγμένως δὲ κατῆχθαι ἐπὶ τὴν ΠΡ διάμετρον ἑκάστη τῶν ΓΞ, ΕΜ, ΗΚ. εἰ δὲ δίχα καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτὴν τέμνει, ἄξων ὀρθός, ἐὰν δὲ αἱ ΑΒ, ΠΡ





5. τέμνουσαι p. 8. εἰ] ἡ Wp, corr. Comm. ἡ] scripsi, om. Wp. καί] om. Wp, corr. Comm. 12. τάς] ταῖς Wp, corr. Comm. 14. Post καλῶ 1 litt. erasa (σ uel ι) W. 25.

*B* recta *BΔ*, quae eas in binas partes aequales secet. dicit igitur: lineae *ΑΒΓ* diametrum adpello *BΔ*, uerticem autem *B*, et ad *BΔ* ordinate ductas esse *ΑΓ*, *ΔΕ*, *ΖΗ*, *ΘΚ*. sin *BΔ* et in binas partes aequales et ad angulos rectos rectas parallelas secat, axis uocatur.




Similiter uero etiam duarum linearum curuarum, et quae sequuntur [I p. 8, 1]. Si enim fingimus lineas *A*, *B* et in iis parallelas *ΓΔ*, *EZ*, *HΘ*, *KΛ*, *MN*, *ΞO* et *AB* ad utramque partem productam parallelasque in binas partes secantem, *AB*, inquit, diametrum transuersum adpello, uertices autem linearum *A*, *B* puncta, ordinate autem ad *AB* ductas *ΓΔ*, *EZ*, *HΘ*, *KΛ*, *MN*, *ΞO*. sin et in binas partes et ad angulos rectos eas secat, axis uocatur. sin recta ducta ut *ΠP* rectas *ΓΞ*, *EM*, *HK* rectae *AB* parallelas in binas partes secat, *ΠP* diametrus recta uocatur, et *ΓΞ*, *EM*, *HK* singulae ad diametrum *ΠP* ordinate ductae esse dicuntur. sin eam et in duas partes ae-




*AB*] *A* corr. ex *Δ* m. 1 W. ὀρθία μέν] ὁ (eras.) ρθ ια μ W, ἡ ρθ αμ p; corr. Comm.

δίχα τέμνουσι τὰς ἀλλήλων παραλλήλους, λέγονται συζυγεῖς διάμετροι, ἐὰν δὲ δίχα καὶ πρὸς ὀρθάς, συζυγεῖς ἄξονες ὀνομάζονται.

## Εἰς τὸ α'.

Περὶ τῶν διαφόρων καταγραφῶν ἤτοι πτώσεων τῶν θεωρημάτων τοσοῦτον ἰστέον, ὅτι πτῶσις μέν ἐστιν, ὅταν τὰ ἐν τῇ προτάσει δεδομένα τῇ θέσει ᾖ δοθέντα· ἡ γὰρ διάφορος αὐτῶν μετάληψις τοῦ αὐτοῦ συμπεράσματος ὄντος ποιεῖ τὴν πτῶσιν. ὁμοίως δὲ καὶ ἀπὸ τῆς κατασκευῆς μετατιθεμένης γίνεται πτῶσις. πολλὰς δὲ ἐχόντων τῶν θεωρημάτων πάσαις ἡ αὐτὴ ἀπόδειξις ἁρμόζει καὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν στοιχείων πλὴν βραχέων, ὡς ἑξῆς εἰσόμεθα· εὐθὺς γὰρ τὸ πρῶτον θεώρημα τρεῖς πτώσεις ἔχει διὰ τὸ τὸ λαμβανόμενον σημεῖον ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας, τουτέστι τὸ Β, ποτὲ μὲν εἰς τὴν κατωτέρω ἐπιφάνειαν εἶναι καὶ τοῦτο διχῶς ἢ ἀνωτέρω τοῦ κύκλου ἢ κατωτέρω, ποτὲ δὲ ἐπὶ τῆς κατὰ κορυφὴν αὐτῇ ἐπικειμένης. τοῦτο δὲ τὸ θεώρημα προέθετο ζητῆσαι, ὅτι οὐκ ἐπὶ πάντα δύο σημεῖα ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας λαμβανόμενα ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας ἐστίν, ἀλλ' ἡ νεύουσα μόνον ἐπὶ τὴν κορυφήν, διὰ τὸ καὶ ὑπὸ εὐθείας τὸ πέρας ἐχούσης μένον γεγενῆσθαι τὴν κωνικὴν ἐπιφάνειαν. ὅτι δὲ τοῦτο ἀληθές, τὸ δεύτερον θεώρημα δηλοῖ.

## Εἰς τὸ β'.

Τὸ δεύτερον θεώρημα τρεῖς ἔχει πτώσεις διὰ τὸ τὰ λαμβανόμενα σημεῖα τὰ Δ, Ε ἢ ἐπὶ τῆς κατὰ κο-

---

1. τέμνουσιν W. 2. διάμετροι] -οι corr. ex ου W. Post ὀρθάς add. οὐ Wp, corr. Comm. 11. πολλάς] πολλά Wp, corr. Comm. 13. εἰσόμεθα] θ in ras. m. 1 W. 14. τὸ τό] scripsi, τό Wp. λαμβαννόμενον W. 15. τουτέστιν W.

quales secat et ad angulos rectos, axis rectus uocatur, et si *ΑΒ*, *ΠΡ* altera alteri parallelas rectas in binas partes aequales secant, coniugatae diametri, sin et in binas partes aequales et ad angulos rectos secant, axes coniugati nominantur.

## In prop. I.

De figuris siue casibus uariis propositionum hoc sciendum est, casum esse, ubi ea, quae in propositione data sint, positione sint data; nam uaria eorum coniunctio eadem conclusione casum efficit. et similiter etiam uariata constructione casus efficitur. quamquam autem multos habent propositiones, omnibus eadem demonstratio iisdemque litteris congruit praeter minora quaedam, ut mox adparebit; nam statim prima propositio tres casus habet, quia punctum in superficie sumptum, hoc est *Β*, tum in superficie inferiore est, et hoc ipsum duobus modis aut supra circulum aut infra, tum in superficie ei ad uerticem posita. haec uero propositio quaerendum proposuit, non ad quaelibet duo puncta in superficie posita ductam rectam in superficie esse, sed eam tantum, quae per uerticem cadat, quia superficies conica per rectam terminum habentem manentem orta est. hoc autem uerum esse, propositio secunda ostendit.

## Ad prop. II.

Propositio secunda tres habet casus, quia puncta sumpta *Δ*, *Ε* aut in superficie ad uerticem posita aut

18. *αὐτῇ*] scripsi, *αὐτῆς* Wp. 21. *ἡ νεύουσα*] scripsi, *ηυ ευθυσαν* W, *ἐν εὐθεῖα* p. 23. *μένον*] *μέσον* Wp, corr. Comm. 27. *-τὰ κο-* in ras. m. 1 W.

ρυφὴν εἶναι ἐπιφανείας ἢ ἐπὶ τῆς κάτω διχῶς ἢ ἐσωτέρω τοῦ κύκλου ἢ ἐξωτέρω. δεῖ δὲ ἐφιστάνειν, ὅτι τοῦτο τὸ θεώρημα εὑρίσκεται ἔν τισιν ἀντιγράφοις ὅλον διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δεδειγμένον.

Εἰς τὸ γ'.

Τὸ γ' θεώρημα πτῶσιν οὐκ ἔχει. δεῖ δὲ ἐν αὐτῷ ἐπιστῆσαι, ὅτι ἡ *ΑΒ* εὐθεῖά ἐστι διὰ τὸ κοινὴ τομὴ εἶναι τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου καὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου, ἥτις ὑπὸ εὐθείας ἐγράφη τὸ πέρας ἐχούσης μένον πρὸς τῇ κορυφῇ τῆς ἐπιφανείας. οὐ γὰρ πᾶσα ἐπιφάνεια ὑπὸ ἐπιπέδου τεμνομένη τὴν τομὴν ποιεῖ εὐθεῖαν, οὐδὲ αὐτὸς ὁ κῶνος, εἰ μὴ διὰ τῆς κορυφῆς ἔλθῃ τὸ τέμνον ἐπίπεδον.

Εἰς τὸ δ'.

Αἱ πτώσεις τούτου τοῦ θεωρήματος τρεῖς εἰσιν ὥσπερ καὶ τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου.

Εἰς τὸ ε'.

Τὸ πέμπτον θεώρημα πτῶσιν οὐκ ἔχει. ἀρχόμενος δὲ τῆς ἐκθέσεώς φησιν· τετμήσθω ὁ κῶνος ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ πρὸς τὴν βάσιν. ἐπειδὴ δὲ ἐν τῷ σκαληνῷ κώνῳ κατὰ μίαν μόνον θέσιν τὸ διὰ τοῦ ἄξονος τρίγωνον ὀρθόν ἐστι πρὸς τὴν βάσιν, τοῦτο ποιήσομεν οὕτως· λαβόντες τὸ κέντρον τῆς βάσεως ἀναστήσομεν ἀπ' αὐτοῦ τῷ ἐπιπέδῳ τῆς βάσεως πρὸς ὀρθὰς καὶ δι' αὐτῆς καὶ τοῦ ἄξονος ἐκβάλλοντες ἐπίπεδον ἕξομεν τὸ ζητούμενον· δέδεικται

---

7. δεῖ] e corr. p. Post δέ del. ἡ *ΑΒ* εὐθεῖά ἐστι p. 8. ἐστιν W. 17. καί (pr.)] αἵ p. 18. Εἰς τό] mg.

in inferiore sunt et quidem duobus modis, aut intra circulum aut extra. animaduertendum autem, hanc propositionem in nonnullis exemplaribus totam per reductionem in absurdum demonstratam inueniri.

## Ad prop. III.

Propositio tertia casum non habet. in ea autem animaduertendum est, *AB* rectam esse, quia communis est sectio plani secantis et superficiei coni, quae a recta descripta est terminum ad uerticem superficiei manentem habente. neque enim omnis superficies plano secta sectionem efficit rectam, nec ipse conus, nisi planum secans per uerticem uenit.

## Ad prop. IV.

Casus huius propositionis tres sunt ut etiam primae et secundae.

## Ad prop. V.

Propositio quinta casum non habet. expositionem autem exordiens dicit [I p. 18, 4]: per axem secetur plano ad basim perpendiculari. quoniam autem in cono obliquo triangulus per axem positus in una sola positione ad basim perpendicularis est, hoc ita efficiemus: sumpto centro basis ab eo rectam ad planum basis perpendicularem erigemus et per eam axemque ducto plano habebimus, quod quaeritur; nam in XI. libro Elementorum Euclidis [XI, 18] demonstratum

---

m. 1 W. 21. ἄξονος] corr. ex ἄξωνος m. 1 W. 23. ἔστιν W. 24. οὕτως] οὕτω in extr. lin. W, οὕτω p.

γὰρ ἐν τῷ ια΄ τῆς Εὐκλείδου στοιχειώσεως, ὅτι, ἐὰν εὐθεῖα ἐπιπέδῳ τινὶ πρὸς ὀρθὰς ᾖ, καὶ πάντα τὰ δι' αὐτῆς ἐπίπεδα τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἔσται. τὸν δὲ κῶνον σκαληνὸν ὑπέθετο, ἐπειδὴ ἐν τῷ ἰσοσκελεῖ τὸ παράλληλον τῇ βάσει ἐπίπεδον τῷ ὑπεναντίως ἠγμένῳ τὸ αὐτό ἐστιν.


ἔτι φησίν· τετμήσθω δὲ καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς μὲν τῷ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνῳ, ἀφαιροῦντι δὲ πρὸς τῇ κορυφῇ τρίγωνον ὅμοιον μὲν τῷ *ΑΒΓ* τριγώνῳ, ὑπεναντίως δὲ κείμενον. τοῦτο δὲ γίνεται οὕτως· ἔστω τὸ διὰ τοῦ ἄξονος τρίγωνον τὸ *ΑΒΓ*, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς *ΑΒ* τυχὸν σημεῖον τὸ *Η*, καὶ συνεστάτω πρὸς τῇ *ΑΗ* εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ *Η* τῇ ὑπὸ *ΑΓΒ* γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ *ΑΗΚ*· τὸ *ΑΗΚ* ἄρα τρίγωνον τῷ *ΑΒΓ* ὅμοιον μέν ἐστιν, ὑπεναντίως δὲ κείμενον. εἰλήφθω δὴ ἐπὶ τῆς *ΗΚ* τυχὸν σημεῖον τὸ *Ζ*, καὶ ἀπο τοῦ *Ζ* τῷ τοῦ *ΑΒΓ* τριγώνου ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἀνεστάτω ἡ *ΖΘ*, καὶ ἐκβεβλήσθω τὸ διὰ τῶν *ΗΚ*, *ΘΖ* ἐπίπεδον. τοῦτο δὴ ὀρθόν ἐστι πρὸς τὸ *ΑΒΓ* τρίγωνον διὰ τὴν *ΖΘ* καὶ ποιοῦν τὸ προκείμενον.

ἐν τῷ συμπεράσματί φησιν, ὅτι διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν *ΔΖΗ*, *ΕΖΚ* τριγώνων ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ *ΔΖΕ* τῷ ὑπὸ *ΗΖΚ*. δυνατὸν δέ ἐστι τοῦτο δεῖξαι καὶ δίχα τῆς τῶν τριγώνων ὁμοιότητος λέγοντα, ὅτι, ἐπειδὴ

4. *ἰσοσκελῆι* W. 8. *ὀρθάς*] inter ρ et θ ras. W. 17. *τοῦ* (alt.)] om. Wp, corr. Halley. 20. *δή*] *δέ* Wp, corr. Halley cum Comm. *ἐστιν* W. *τό*] corr. ex *τῷ* m. 1 W. *ΑΒΓ*] in mg. transit m. 1 W. 23. *ἐστίν* W. 24. *ἐστιν* W. 25. *ὁμοιώτητος*, —*τητος* in ras. m. 1, W. *ὅτι*] p, comp. supra scr. m. 1 W.

est, si recta ad planum aliquod perpendicularis sit, etiam omnia plana, quae per eam ducantur, ad idem planum perpendicularia esse. obliquum uero conum supposuit, quia in recto planum basi parallelum idem est atque id, quod e contrario ducitur.

praeterea dicit [I p. 18, 6]: secetur autem etiam alio plano ad triangulum per axem positum perpendiculari, quod ad uerticem abscindat triangulum similem triangulo $AB\Gamma$, sed e contrario positum. hoc uero ita fit: sit $AB\Gamma$ triangulus per axem positus, et in $AB$ sumatur punctum aliquod $H$, ad $AH$ autem rectam et $H$ punctum in ea positum angulo $A\Gamma B$ aequalis construatur $\angle AHK$ [Eucl. I, 23]; itaque triangulus $AHK$ triangulo $AB\Gamma$ similis est, sed e contrario positus. iam in $HK$ punctum aliquod sumatur $Z$, et a $Z$ ad planum trianguli $AB\Gamma$ perpendicularis erigatur $Z\Theta$, ducaturque planum per $HK$, $Z\Theta$. hoc igitur propter $Z\Theta$ ad triangulum $AB\Gamma$ perpendiculare est et propositum efficit.




in conclusione dicit [I p. 18, 27 sq.], propter similitudinem triangulorum $\Delta ZH$, $EZK$ esse

$$\Delta Z \times ZE = HZ \times ZK.$$

fieri autem potest, ut hoc etiam similitudine triangulorum non usi demonstremus ita ratiocinantes: quoniam uterque angulus $AKH$, $A\Delta E$ angulo ad $B$ posito

In fig. Z m. rec. W.

ἑκατέρα τῶν ὑπὸ *ΑΚΗ*, *ΑΔΕ* γωνιῶν ἴση ἐστὶ τῇ πρὸς τῷ *Β*, ἐν τῷ αὐτῷ τμήματί εἰσι τοῦ περιλαμβάνοντος κύκλου τὰ *Δ*, *Η*, *Ε*, *Κ* σημεῖα. καὶ ἐπειδὴ ἐν κύκλῳ δύο εὐθεῖαι αἱ *ΔΕ*, *ΗΚ* τέμνουσιν ἀλλήλας κατὰ τὸ *Ζ*, τὸ ὑπὸ *ΔΖΕ* ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ *ΗΖΚ*.

ὁμοίως δὴ δειχθήσεται, ὅτι καὶ πᾶσαι αἱ ἀπὸ τῆς *ΗΘ* γραμμῆς ἐπὶ τὴν *ΗΚ* κάθετοι ἀγόμεναι ἴσον δύνανται τῷ ὑπὸ τῶν τμημάτων. κύκλος ἄρα ἐστὶν ἡ τομή, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἡ *ΗΚ*. καὶ δυνατὸν μέν ἐστιν ἐπιλογίσασθαι τοῦτο διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. εἰ γὰρ ὁ περὶ τὴν *ΚΗ* γραφόμενος κύκλος οὐχ ἥξει διὰ τοῦ *Θ* σημείου, ἔσται τὸ ὑπὸ τῶν *ΚΖ*, *ΖΗ* ἴσον ἤτοι τῷ ἀπὸ μείζονος τῆς *ΖΘ* ἢ τῷ ἀπὸ ἐλάσσονος· ὅπερ οὐχ ὑπόκειται. δείξομεν δὲ αὐτὸ καὶ ἐπ' εὐθείας.

ἔστω τις γραμμὴ ἡ *ΗΘ*, καὶ ὑποτεινέτω αὐτὴν ἡ *ΗΚ*, εἰλήφθω δὲ καὶ ἐπὶ τῆς γραμμῆς τυχόντα σημεῖα τὰ *Θ*, *Ο*, καὶ ἀπ' αὐτῶν ἐπὶ τὴν *ΗΚ* κάθετοι ἤχθωσαν αἱ *ΘΖ*, *ΟΠ*, καὶ ἔστω τὸ μὲν ἀπὸ *ΖΘ* ἴσον τῷ ὑπὸ *ΗΖΚ*, τὸ δὲ ἀπὸ *ΟΠ* τῷ ὑπὸ *ΗΠΚ* ἴσον. λέγω, ὅτι κύκλος ἐστὶν ἡ *ΗΘΟΚ* γραμμή. τετμήσθω γὰρ ἡ *ΗΚ* δίχα κατὰ τὸ *Ν*, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ *ΝΘ*, *ΝΟ*. ἐπεὶ οὖν εὐθεῖα ἡ *ΗΚ* τέτμηται εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ *Ν*, εἰς δὲ ἄνισα κατὰ τὸ *Ζ*, τὸ ὑπὸ *ΗΖΚ* μετὰ τοῦ ἀπὸ *ΝΖ* ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ *ΝΚ*. τὸ δὲ


---

1. *ΑΔΕ*] *Ε* e corr. W. ἐστίν W. 2. *Β*] *Π* W p, corr. Comm. εἰσιν W. 5. ἐστίν W. 6. *ΗΖΚ*] *ΖΗΚ* p et corr. ex *ΖΕΚ* m. 1 W; corr. Comm. 7. αἱ] addidi, om. Wp. 8. *ΗΘ*] *Θ* e corr. p, *ΗΘΚ* Halley cum Comm. 10. αὐτῷ? p. 11. ἐπιλοήσασθαι p (nisi forte γι ita scriptae, ut litterae *Η* similes sint). 13. οὐ W. 14. τῷ] τό W. *ΖΘ*] *ΘΗ* p.

aequalis est, in eodem segmento circuli puncta $\Delta$, $H$, $E$, $K$ comprehendentis positi sunt. et quoniam in circulo duae rectae $\Delta E$, $HK$ inter se secant in $Z$, erit $\Delta Z \times ZE = HZ \times ZK$ [Eucl. III, 35].

iam similiter demonstrabimus, etiam omnes rectas a linea $H\Theta$ ad $HK$ perpendiculares ductas quadratas aequales esse rectangulo partium. ergo sectio circulus est, cuius diametrus est $HK$ [I p. 20, 3 sq.]. et fieri potest, ut hoc per reductionem ad absurdum intellegatur. si enim circulus circum $KH$ descriptus per punctum $\Theta$ non ueniet, $KZ \times ZH$ aequale erit quadrato aut rectae maioris quam $Z\Theta$ aut minoris; quod contra hypothesim est. uerum idem directa uia demonstrabimus.

sit linea $H\Theta$, et sub ea subtendat $HK$, sumantur autem etiam in linea puncta aliqua $\Theta$, $O$, et ab iis ad $HK$ perpendiculares ducantur $\Theta Z$, $O\Pi$, sitque $Z\Theta^2 = HZ \times ZK$, $O\Pi^2 = H\Pi \times \Pi K$. dico, lineam $H\Theta OK$ circulum esse.




nam $HK$ in $N$ in duas partes aequales secetur, ducanturque $N\Theta$, $NO$. quoniam igitur recta $HK$ in $N$ in partes aequales secta est, in $Z$ autem in inaequales, erit

$$HZ \times ZK + NZ^2 = NK^2$$

[Eucl. II, 5]. supposuimus autem, esse $HZ \times ZK = \Theta Z^2$;

ἀπό] corr. ex ἀπω in scribendo W. 17. $H\Theta$] $H\Theta K$ Halley cum Comm. 18. τυχὸν τά W. 19. $HK$] $EK$ Wp, corr. Halley cum Comm. 21. $H\Pi K$] $\Pi$ corr. ex $\Theta$ p. 22. ἤ] insert. m. 1 p. $H\Theta OK$] e corr. m. 1 p; $O$ supra scr. m. 1 W, post $K$ ras. parua. 23. $N\Theta$] uel $H\Theta$ W, $H\Theta$ p. 26. ἐστίν W.


ὑπὸ *HZK* ἴσον ὑπόκειται τῷ ἀπὸ *ΘZ*· τὸ ἄρα ἀπὸ *ΘZ* μετὰ τοῦ ἀπὸ *NZ* ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ *NK*. ἴσα δέ ἐστι τὰ ἀπὸ *ΘZ*, *ZN* τῷ ἀπὸ *NΘ*· ὀρθὴ γάρ ἐστιν ἡ πρὸς τῷ *Z*· τὸ ἄρα ἀπὸ *NΘ* ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ *NK*. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ τὸ ἀπὸ *NO* ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ *NK*. κύκλος ἄρα ἐστὶν ἡ *HΘK* γραμμή, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἡ *HK*.

δυνατὸν δέ ἐστι τὰς *ΔE*, *HK* διαμέτρους ποτὲ μὲν ἴσας, ποτὲ δὲ ἀνίσους εἶναι, οὐδέποτε μέντοι δίχα τέμνουσιν ἀλλήλας. ἤχθω γὰρ διὰ τοῦ *K* τῇ *BΓ* παράλληλος ἡ *NK*. ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἡ *BA* τῆς *AΓ*, μείζων ἄρα καὶ ἡ *NA* τῆς *AK*. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ *KA* τῆς *AH* διὰ τὴν ὑπεναντίαν τομήν. ὥστε ἡ τῇ *AK* ἀπὸ τῆς *AN* ἴση λαμβανομένη μεταξὺ πίπτει τῶν *H*, *N* σημείων. πιπτέτω ὡς ἡ *AΞ*· ἡ ἄρα διὰ τοῦ *Ξ* τῇ *BΓ* παράλληλος ἀγομένη τέμνει τὴν *HK*. τεμνέτω ὡς ἡ *ΞOΠ*. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ *ΞA* τῇ *AK*, ὡς δὲ ἡ *ΞA* πρὸς *AΠ*, ἡ *KA* πρὸς *AH* διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν *HKA*, *ΞAΠ* τριγώνων, ἡ *AH* τῇ *AΠ* ἐστιν ἴση καὶ λοιπὴ ἡ *HΞ* τῇ *ΠK*. καὶ ἐπεὶ αἱ πρὸς τοῖς *Ξ*, *K* γωνίαι ἴσαι εἰσίν· ἑκατέρα γὰρ αὐτῶν ἴση ἐστὶ τῇ *B*· εἰσὶ δὲ καὶ αἱ πρὸς τῷ *O* ἴσαι· κατὰ κορυφὴν γάρ· ὅμοιον ἄρα ἐστὶ τὸ *ΞHO* τρίγωνον τῷ *ΠOK* τριγώνῳ. καὶ ἴση ἐστὶν ἡ *HΞ* τῇ *ΠK*· ὥστε καὶ ἡ *ΞO* τῇ *OK* καὶ ἡ *HO* τῇ *OΠ* καὶ

1. *HZK*] *H* supra scr. m. 1 W. 2. ἐστίν W. 3. ἐστιν W. *NΘ*] *Θ* corr. in scribendo W. 4. ἐστίν W. 5. *NO*] *NΘ* p. ἐστίν W. 6. *HΘK*] *NΘK* p. 8. ἐστιν W. 10. — mg. m. 1 W. 11. *HK* p. 12. *NA*] *MA* Wp, corr. Comm. 16. *Ξ*] corr. ex *Z* in scrib. W. 20. τῇ *AΠ*] om. Wp, corr. Comm. ἡ *HΞ*] p, ἡ *Ξ* W. 22. ἐστίν W. εἰσίν W. τῷ] p, τό W. 23. ἐστίν W. 25. *HO*] *NO* p.

itaque $\Theta Z^2 + NZ^2 = NK^2$. uerum $\Theta Z^2 + ZN^2 = N\Theta^2$ [Eucl. I, 47]; angulus enim ad $Z$ positus rectus est; itaque $N\Theta^2 = NK^2$. iam eodem modo demonstrabimus, esse etiam $NO^2 = NK^2$. ergo linea $H\Theta K$ circulus est et $HK$ eius diametrus.

fieri autem potest, ut diametri $\Delta E$, $HK$ tum aequales tum inaequales sint, sed numquam inter se in binas partes aequales secant. ducatur enim per $K$ rectae $B\Gamma$ parallela $NK$. quoniam igitur $BA > A\Gamma$, erit etiam $NA > AK$ [Eucl. VI, 2; V, 14]. et eadem ratione propter sectionem contrariam $KA > AH$. quare quae ab $AN$ rectae $AK$ aequalis aufertur, inter puncta $H$, $N$ cadit. cadat ut $A\Xi$.




itaque quae per $\Xi$ rectae $B\Gamma$ parallela ducitur, rectam $HK$ secat. secet ut $\Xi O \Pi$. et quoniam est $\Xi A = AK$, et propter similitudinem triangulorum $HKA$, $\Xi A \Pi$ est $\Xi A : A\Pi = KA : AH$ [Eucl. VI, 4], erit

$$AH = A\Pi \text{ [Eucl. V, 9]},$$

et quae relinquitur $H\Xi = \Pi K$. et quoniam anguli ad $\Xi, K$ positi aequales sunt (nam uterque angulo $B$ aequalis est), et etiam anguli ad $O$ positi aequales [Eucl. I, 15] (nam ad uerticem sunt inter se), similes erunt trianguli $\Xi HO$, $\Pi OK$. et $H\Xi = \Pi K$; quare etiam $\Xi O = OK$, $HO = O\Pi$, $HK = \Xi\Pi$. et manifestum est, si inter $N$, $\Xi$ punctum sumatur uelut $P$, et per $P$

In fig. $O$ deest in W.

ὅλη ἡ $HK$ τῇ $\Xi\Pi$. καὶ φανερόν, ὅτι, ἐὰν μεταξὺ τῶν $N$, $\Xi$ ληφθῇ τι σημεῖον ὡς τὸ $P$, καὶ διὰ τοῦ $P$ τῇ $NK$ παράλληλος ἀχθῇ ἡ $P\Sigma$, μείζων ἔσται τῆς $\Xi\Pi$ καὶ δια τοῦτο καὶ τῆς $HK$, ἐὰν δὲ μεταξὺ τῶν $H$, $\Xi$ ληφθῇ τι σημεῖον οἷον τὸ $T$, καὶ δι᾽ αὐτοῦ παράλληλος ἀχθῇ ἡ $T\Upsilon$, ἐλάττων ἔσται τῆς $\Xi\Pi$ καὶ τῆς $KH$. καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ $\Xi\Pi K$ γωνία μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ $\Lambda\Xi\Pi$, ἴση δὲ ἡ ὑπὸ $O\Pi K$ τῇ ὑπὸ $OH\Xi$, μείζων ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ $OH\Xi$ τῆς ὑπὸ $H\Xi O$. ἡ $\Xi O$ ἄρα τῆς $OH$ μείζων καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ $KO$ τῆς $O\Pi$. ἐὰν δέ ποτε ἡ ἑτέρα αὐτῶν δίχα διαιρεθῇ, ἡ λοιπὴ εἰς ἄνισα τμηθήσεται.

Εἰς τὸ ϛ'.

Προσέχειν χρή, ὅτι οὐ μάτην πρόσκειται ἐν τῇ προτάσει τὸ δεῖν τὴν ἀγομένην εὐθεῖαν ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ σημείου παράλληλον μιᾷ τινι τῶν ἐν τῇ βάσει εὐθειῶν πρὸς ὀρθὰς οὔσῃ πάντως τῇ βάσει τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου ἄγεσθαι παράλληλον· τούτου γὰρ μὴ ὄντος οὐ δυνατόν ἐστιν αὐτὴν δίχα τέμνεσθαι ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου· ὅπερ ἐστὶ φανερον ἐκ τῆς ἐν τῷ ῥητῷ καταγραφῆς. εἰ γὰρ ἡ $MN$, ἥτινι παράλληλός ἐστιν ἡ $\Delta ZH$, μὴ πρὸς ὀρθὰς εἴη τῇ $B\Gamma$, δῆλον, ὅτι οὐδὲ δίχα τέμνεται οὐδὲ ἡ $K\Lambda$. καὶ διὰ τῶν αὐτῶν λόγων συνάγεται, οτι ἐστίν, ὡς ἡ $K\Theta$ πρὸς $\Theta\Lambda$, οὕτως ἡ $\Delta Z$ πρὸς $ZH$· καὶ ἡ $\Delta H$ ἄρα εἰς ἄνισα τμηθήσεται κατὰ τὸ $Z$.

δυνατὸν δὲ κατωτέρω τοῦ κύκλου καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ κορυφὴν ἐπιφανείας τὰ αὐτὰ δείκνυσθαι.

---

7. $\Xi\Pi K$] $\Pi$ e corr. m. 1 W. ἐστίν W. 8. $O\Pi K$] $O$ insert. m. 1 W. $OH\Xi$] $H\Xi$ p et $\Xi$ in ras. m. 1 W;

rectae $NK$ parallela ducatur $P\Sigma$, esse $P\Sigma > \Xi\Pi$ et ideo $P\Sigma > HK$, sin inter $H$, $\Xi$ punctum sumatur uelut $T$, et per id parallela ducatur $T\Upsilon$, esse $T\Upsilon < \Xi\Pi$ et $T\Upsilon < KH$. et quoniam est

$$\angle \Xi\Pi K > A\Xi\Pi,$$

et $\angle O\Pi K = OH\Xi$, erit etiam $\angle OH\Xi > H\Xi O$. itaque $\Xi O > OH$ [Eucl. I, 19] et ideo etiam $KO > O\Pi$. et si quando altera diametrorum in duas partes aequales diuisa erit, reliqua in partes inaequales secabitur.

## Ad prop. VI.

Animaduertere oportet, non sine causa in propositione adiici [I p. 20, 12 sq.], rectam a puncto in superficie posito parallelam ductam rectae alicui in basi positae omnino rectae ad basim trianguli per axem positi perpendiculari parallelam duci oportere; nam si hoc non ita est, fieri non potest, ut a triangulo per axem posito in duas partes aequales secetur; quod in figura in uerbis Apollonii posita adparet. nam si $MN$, cui parallela est $\Delta ZH$, ad rectam $B\Gamma$ perpendicularis non est, adparet, ne $K\Lambda$ quidem in duas partes aequales secari. et eadem ratione concludimus, esse $K\Theta : \Theta\Lambda = \Delta Z : ZH$ [I p. 22, 20 sq.]. ergo etiam $\Delta H$ in $Z$ in partes inaequales secabitur.

fieri autem potest, ut et infra circulum et in superficie ad uerticem posita idem demonstretur.

---

corr. Comm. 9. $H\Xi O$] $N\Xi O$ p. 10. $KO$] $\Xi O$ Halley cum Comm. 15. ἐν] ε̄ Wp. 20. ἐστίν W. 28. δεῖ- e corr. p.

## Εἰς τὸ ζʹ.

Τὸ ζʹ θεώρημα πτώσεις ἔχει τέσσαρας· ἢ γὰρ οὐ συμβάλλει ἡ ZH τῇ AΓ ἢ συμβάλλει τριχῶς ἢ ἐκτὸς τοῦ κύκλου ἢ ἐντὸς ἢ ἐπὶ τοῦ Γ σημείου.

## Μετὰ τὸ ιʹ.

Χρὴ ἐπιστῆσαι, ὅτι τὰ ῑ ταῦτα θεωρήματα ἀλλήλων ἔχονται. ἀλλὰ τὸ πρῶτον ἔχει, ὅτι αἱ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ εὐθεῖαι νεύουσαι ἐπὶ τὴν κορυφὴν ἐν ταύτῃ μένουσιν, τὸ δὲ δεύτερον τὸ ἀνάπαλιν, τὸ δὲ τρίτον ἔχει τὴν διὰ τῆς κορυφῆς τοῦ κώνου τομήν, τὸ δὲ τέταρτον τὴν παράλληλον τῇ βάσει, τὸ πέμπτον τὴν ὑπεναντίαν, τὸ ἕκτον ὡσανεὶ προλαμβάνεται τοῦ ἑβδόμου δεικνύον, ὅτι καὶ πρὸς ὀρθὰς ὀφείλει πάντως εἶναι τῇ διαμέτρῳ τοῦ κύκλου ἡ κοινὴ τομὴ αὐτοῦ καὶ τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου, καὶ ὅτι τούτου οὕτως ἔχοντος αἱ παράλληλοι αὐτῇ διχοτομοῦνται ὑπὸ τοῦ τριγώνου, τὸ δὲ ἕβδομον τὰς ἄλλας τρεῖς τομὰς ἔδειξε καὶ τὴν διάμετρον καὶ τὰς ἐπ' αὐτὴν καταγομένας παραλλήλους τῇ ἐν τῇ βάσει εὐθείᾳ. ἐν δὲ τῷ ὀγδόῳ δείκνυσιν, ὅπερ ἐν τοῖς προλεγομένοις εἴπομεν, ὅτι ἡ παραβολὴ καὶ ἡ ὑπερβολὴ τῶν εἰς ἄπειρόν εἰσιν αὐξομένων, ἐν δὲ τῷ ἐνάτῳ, ὅτι ἡ ἔλλειψις συννεύουσα εἰς ἑαυτὴν ὁμοίως τῷ κύκλῳ διὰ τὸ τὸ τέμνον ἐπίπεδον συμπίπτειν ἀμφοτέραις ταῖς πλευραῖς τοῦ τριγώνου οὐκ ἔστι κύκλος· κύκλους γὰρ ἐποίουν ἥ τε ὑπεναντία τομὴ καὶ ἡ παράλληλος· καὶ δεῖ ἐπιστῆσαι, ὅτι ἡ διάμετρος τῆς τομῆς ἐπὶ μὲν τῆς παραβολῆς

2. τέσσαρας] corr. ex τέσσαρες m. 2 W. 4. Γ] τρίτου Wp, corr. Comm. 7. πρῶτον] αʹ p et similiter saepius.

## Ad prop. VII.

Propositio VII quattuor casus habet; nam $ZH$ cum $A\Gamma$ aut non concurrit aut concurrit et hoc quidem tribus modis, aut extra circulum aut intra aut in puncto $\Gamma$.

## Post prop. X.

Animaduertendum, has X propositiones inter se coniunctas esse. prima autem continet, rectas in superficie positas, quae ad uerticem cadant, in ea manere, secunda contrarium; tertia uero sectionem per uerticem coni continet, quarta sectionem basi parallelam, quinta sectionem contrariam; sexta quasi lemma est septimae demonstrans, communem sectionem circuli planique secantis omnino ad diametrum perpendicularem esse oportere, et si hoc ita sit, rectas ei parallelas a triangulo in binas partes aequales secari; septima reliquas tres sectiones monstrauit et diametrum rectasque ad eam ductas rectae in basi positae parallelas. in octaua autem demonstrat, quod nos in prooemio [p. 176, 12 sq.] diximus, parabolam hyperbolamque earum linearum esse, quae in infinitum crescant; in nona autem ellipsim, quamquam in se recurrat sicut circulus, quia planum secans cum utroque latere trianguli concurrat, circulum non esse; circulos enim et sectio contraria et parallela efficiebant; et animad-

9. τό (alt.)] supra scr. m. 1 W. 12. προσλαμβάνεται W, et p, sed corr. m. 1. ἑβδόμου] ἑβδόμου οὗ W, ζ' οὗ p; corr. Comm. 13. ὀφίλει W. 14. τομή] corr. ex τωμή in scrib. W. 17. ἔδειξεν W. 23. τὸ τό] scripsi, τό Wp. 25. ἔστιν W. 27. Ⓔ mg. m. 1 W.

τὴν μίαν πλευρὰν τοῦ τριγώνου τέμνει καὶ τὴν βάσιν, ἐπὶ δὲ τῆς ὑπερβολῆς τήν τε πλευρὰν καὶ τὴν ἐπ' εὐθείας τῇ λοιπῇ πλευρᾷ ἐκβαλλομένην πρὸς τῇ κορυφῇ, ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως καὶ ἑκατέραν τῶν πλευρῶν καὶ τὴν βάσιν. τὸ δὲ δέκατον ἁπλούστερον μέν τις ἐπιβάλλων ἴσως ἂν οἰηθείη ταὐτὸν εἶναι τῷ δευτέρῳ, τοῦτο μέντοι οὐχ ὡς ἔχει· ἐκεῖ μὲν γὰρ ἐπὶ πάσης τῆς ἐπιφανείας ἔλεγε λαμβάνεσθαι τὰ δύο σημεῖα, ἐνταῦθα δὲ ἐπὶ τῆς γενομένης γραμμῆς. ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς τρισὶν ἀκριβέστερον ἑκάστην τῶν τομῶν τούτων διακρίνει μετὰ τοῦ λέγειν καὶ τὰ ἰδιώματα αὐτῶν τὰ ἀρχικά.

Εἰς τὸ ια'.

Πεποιήσθω, ὡς τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΑΓ, οὕτως ἡ ΘΖ πρὸς ΖΑ· σαφὲς μέν ἐστι τὸ λεγόμενον, πλὴν εἴ τις καὶ ὑπομνησθῆναι βούλεται. ἔστω τῷ ὑπὸ ΒΑΓ ἴσον τὸ ὑπὸ ΟΠΡ, τῷ δὲ ἀπὸ ΒΓ ἴσον παρὰ τὴν ΠΡ παραβληθὲν πλάτος ποιείτω τὴν ΠΣ, καὶ γεγονέτω, ὡς ἡ ΟΠ πρὸς ΠΣ, ἡ ΑΖ πρὸς ΖΘ· γέγονεν ἄρα τὸ ζητούμενον. ἐπεὶ γάρ ἐστιν, ὡς ἡ ΟΠ πρὸς ΠΣ, ἡ ΑΖ πρὸς ΖΘ, ἀνάπαλιν ὡς ἡ ΣΠ πρὸς ΠΟ, ἡ ΘΖ πρὸς ΖΑ. ὡς δὲ ἡ ΣΠ πρὸς ΠΟ, τὸ ΣΡ πρὸς ΡΟ, τουτέστι τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΑΓ. τοῦτο χρησιμεύει καὶ τοῖς ἑξῆς δύο θεωρήμασιν.


---

4. δέ] supra scr. p. 7. ἐπί] π e corr. m. 1 p. 8. ἔλεγε λαμ-] pW[1] (ἔλεγεν W[1]). 10. τοῖς ἑξῆς τρι-] pW[1]. 14. πεποιήσθω] p, η in ras. m. 2 W. 15. ἐστιν W. 17. τῷ (pr.)] corr. ex τό W[1]. 18. ΠΡ] Π e corr. m. 1 W. 19. ΠΣ (pr.)] Σ in ras. m. rec. W. ΟΠ] Ο corr. ex Θ W. 21. ΟΠ] Ο corr. ex Θ W. 22. ΣΠ] Σ e corr. W. ΠΟ]

uertendum est, diametrum sectionis in parabola alterum latus trianguli basimque secare, in hyperbola autem et latus et rectam in altero latere ad uerticem uersus producto positam, in ellipsi autem et utrumque latus et basim. decimam uero, qui obiter intuitus erit, fortasse eandem ac secundam esse putauerit; sed minime ita est; illic enim duo puncta in tota superficie sumi posse dicebat, hic uero in linea orta. in tribus autem deinde sequentibus propositionibus unamquamque harum sectionum diligentius distinguit proprietates simul principales earum indicans.

## Ad prop. XI.

Fiat $B\Gamma^2 : BA \times A\Gamma = \Theta Z : ZA$ [I p. 38, 24—25]: manifestum quidem, quod dicitur, nisi si quis admoneri




uelit. sit

$$O\Pi \times \Pi P = BA \times A\Gamma,$$

et spatium quadrato $B\Gamma^2$ aequale ad $\Pi P$ adplicatum latitudinem efficiat $\Pi\Sigma$, fiatque $O\Pi : \Pi\Sigma = AZ : Z\Theta$; itaque effectum est, quod quaeritur. nam quoniam est $O\Pi : \Pi\Sigma = AZ : Z\Theta$, e contrario erit [Eucl. V, 7 coroll.]

$$\Sigma\Pi : \Pi O = \Theta Z : ZA.$$

est autem

$\Sigma\Pi : \Pi O = \Sigma P : PO$ [Eucl. VI, 1] $= B\Gamma^2 : BA \times A\Gamma$.

hoc etiam in duabus, quae sequuntur, propositionibus [I p. 44, 11; 50, 6] utile est.

---

$O$ e corr. W. $\Sigma\Pi$] $\Sigma$ e corr. W. 23. $PO$] $O$ e corr. W. τουτέστιν W. $B\Gamma$] $B$ e corr. p.

*Τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΑΓ λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ καὶ ἡ ΒΓ πρὸς ΒΑ· δέδεικται μὲν ἐν τῷ ἕκτῳ βιβλίῳ τῆς στοιχειώσεως ἐν τῷ εἰκοστῷ τρίτῳ θεωρήματι, ὅτι τὰ ἰσογώνια παραλληλόγραμμα πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλευρῶν· ἐπεὶ δὲ ἐπακτικώτερον μᾶλλον καὶ οὐ κατὰ τὸν ἀναγκαῖον τρόπον ὑπὸ τῶν ὑπομνηματιστῶν ἐλέγετο, ἐζητήσαμεν αὐτὸ καὶ γέγραπται ἐν τοῖς ἐκδεδομένοις ἡμῖν εἰς τὸ τέταρτον θεώρημα τοῦ δευτέρου βιβλίου τῶν Ἀρχιμήδους περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου καὶ ἐν τοῖς σχολίοις τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Πτολεμαίου συντάξεως· οὐ χεῖρον δὲ καὶ ἐνταῦθα τοῦτο γραφῆναι διὰ τὸ μὴ πάντως τοὺς ἀναγινώσκοντας κἀκείνοις ἐντυγχάνειν, καὶ ὅτι σχεδὸν τὸ ὅλον σύνταγμα τῶν κωνικῶν κέχρηται αὐτῷ.*

*λόγος ἐκ λόγων συγκεῖσθαι λέγεται, ὅταν αἱ τῶν λόγων πηλικότητες ἐφ' ἑαυτὰς πολλαπλασιασθεῖσαι ποιῶσί τινα, πηλικότητος δηλονότι λεγομένης τοῦ ἀριθμοῦ, οὗ παρώνυμός ἐστιν ὁ λόγος. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν πολλαπλασίων δυνατόν ἐστιν ἀριθμὸν ὁλόκληρον εἶναι τὴν πηλικότητα, ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν σχέσεων ἀνάγκη τὴν πηλικότητα ἀριθμὸν εἶναι καὶ μόριον ἢ μόρια, εἰ μὴ ἄρα τις ἐθέλοι καὶ ἀρρήτους εἶναι σχέσεις, οἷαί εἰσιν αἱ κατὰ τὰ ἄλογα μεγέθη. ἐπὶ πασῶν δὲ τῶν σχέσεων δῆλον, ὅτι αὐτὴ ἡ πηλικότης πολλαπλασιαζομένη ἐπὶ τὸν ἑπόμενον ὅρον τοῦ λόγου ποιεῖ τὸν ἡγούμενον.*

*ἔστω τοίνυν λόγος ὁ τοῦ Α πρὸς τὸν Β, καὶ εἰ-*

---

2. *ΒΓ*] *Γ* e corr. m. 1 W. 3. *ΓΑ — πρός*] addidi; om. Wp (pro *ΒΑ* Halley scr. *ΓΑ*). 4. *τῆς*] *τῇ* W. *ἐν*] e corr. p. 5. *ὅτι*] pw, *ὅτ* seq. ras. 1 litt. W. 10. *Ἀρχιμήδους*] vw, *Ἀρχι* seq. ras. 5—6 litt. W et seq. lac. p. 13.

Et est

$$B\Gamma^2 : BA \times A\Gamma = (B\Gamma : \Gamma A) \times (B\Gamma : BA)$$

[I p. 40, 8—10]: in propositione XXIII sexti libri Elementorum demonstratum est, parallelogramma aequiangula inter se rationem ex rationibus laterum compositam habere; quoniam autem hoc per inductionem magis neque satis stricte a commentatoribus exponebatur, nos de ea re quaesiuimus et scriptum est in commentariis, quae edidimus ad quartam propositionem libri alterius Archimedis de sphaera et cylindro [Archimedis op. III p. 140 sq.] et in scholiis primi libri compositionis Ptolemaei; uerum satius esse duximus hic quoque idem exponere, quia non omnino iis, qui haec legent, illi quoque libri ad manum sunt, et quia totum paene opus conicorum eo utitur.

ratio ex rationibus composita esse dicitur, ubi rationum quantitates inter se multiplicatae rationem quandam efficiunt, quantitas autem is dicitur numerus, a quo ratio denominatur. in multiplis igitur fieri potest, ut quantitas sit totus aliquis numerus, in reliquis uero rationibus necesse est, quantitatem numerum esse cum parte uel partibus, nisi quis etiam irrationales rationes esse statuerit, quales sunt magnitudinum irrationalium. uerum in omnibus rationibus manifestum est, ipsam quantitatem in terminum sequentem proportionis multiplicatam praecedentem efficere.

sit igitur proportio $A : B$, et sumatur medius

---

γραφεῖναι W. 16—17. ≀ mg. W. 17. πολλαπλασθεῖσαι W. ποιῶσι] p, ωσιν post ras. 3 litt. W. 21. τήν] p, om. W.


λήφθω τις αὐτῶν μέσος, ὡς ἔτυχεν, ὁ Γ, καὶ ἔστω τοῦ Α, Γ λόγου πηλικότης ὁ Δ, τοῦ δὲ Γ, Β ὁ Ε, καὶ ὁ Δ τὸν Ε πολλαπλασιάσας τὸν Ζ ποιείτω. λέγω, ὅτι τοῦ λόγου τῶν Α, Β πηλικότης ἐστὶν ὁ Ζ, τουτέστιν ὅτι ὁ Ζ τὸν Β πολλαπλασιάσας τὸν Α ποιεῖ. ὁ δὴ Ζ τὸν Β πολλαπλασιάσας τὸν Η ποιείτω. ἐπεὶ οὖν ὁ Δ τὸν μὲν Ε πολλαπλασιάσας τὸν Ζ πεποίηκεν, τὸν δὲ Γ πολλαπλασιάσας τὸν Α πεποίηκεν, ἔστιν ἄρα, ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Γ, ὁ Ζ πρὸς τὸν Α. πάλιν ἐπεὶ ὁ Β τὸν Ε πολλαπλασιάσας τὸν Γ πεποίηκεν, τὸν δὲ Ζ πολλαπλασιάσας τὸν Η πεποίηκεν, ἔστιν ἄρα, ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ, ὁ Γ πρὸς τὸν Η. ἐναλλάξ, ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Γ, ὁ Ζ πρὸς τὸν Η. ἦν δέ, ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Γ, ὁ Ζ πρὸς τὸν Α· ἴσος ἄρα ὁ Η τῷ Α. ὥστε ὁ Ζ τὸν Β πολλαπλασιάσας τὸν Α πεποίηκεν.

μὴ ταραττέτω δὲ τοὺς ἐντυγχάνοντας τὸ διὰ τῶν ἀριθμητικῶν δεδεῖχθαι τοῦτο· οἵ τε γὰρ παλαιοὶ κέχρηνται ταῖς τοιαύταις ἀποδείξεσι μαθηματικαῖς μᾶλλον οὔσαις ἢ ἀριθμητικαῖς διὰ τὰς ἀναλογίας, καὶ ὅτι τὸ ζητούμενον ἀριθμητικόν ἐστιν. λόγοι γὰρ καὶ πηλικότητες λόγων καὶ πολλαπλασιασμοὶ τοῖς ἀριθμοῖς πρώτως ὑπάρχουσι καὶ δι᾽ αὐτῶν τοῖς μεγέθεσι, κατὰ τὸν εἰπόντα· ταῦτα γὰρ τὰ μαθήματα δοκοῦντι εἶμεν ἀδελφά.

---

4. τῶν] corr. ex τόν in scrib. W  7. πεποίηκε p.  10. πεποίηκε p.  16. πεποίηκε p. Mg. διότι τὸ Ζ πρὸς τὸ Δ καὶ Η λόγον τὸν αὐτὸν ἔχει τοῦ Ε πρὸς τὸ Γ, τὰ δὲ ἔχοντα πρὸς [τὸ αὐτὸ] τὸν αὐτὸν λόγον ἴσα m. 1 W (τὸ αὐτό om., ἴσα comp. m. 2) et p (τὸ αὐτό om., add. mg. ἔξω ἦν σχόλιον).  18. δεδεῖχθαι] p, δεδ ras. 3 litt. θαι W, δεδόσθαι w.  19. ἀποδείξεσιν W.  20. ὅτι] fort. αὐτό.  23. ὑπάρχουσιν W.

eorum numerus aliquis $\Gamma$, sitque proportionis $A : \Gamma$ quantitas $\Delta$, proportionis autem $\Gamma : B$ quantitas $E$, et sit




$$\Delta \times E = Z.$$

dico, $Z$ esse quantitatem proportionis $A : B$, h. e. esse

$$Z \times B = A.$$

sit igitur $Z \times B = H$. quoniam igitur est

$$\Delta \times E = Z,$$
$$\Delta \times \Gamma = A,$$

erit [Eucl. VII, 17] $E : \Gamma = Z : A$. rursus quoniam est $B \times E = \Gamma$, $B \times Z = H$, erit [ib.] $E : Z = \Gamma : H$. permutando $E : \Gamma = Z : H$. erat autem $E : \Gamma = Z : A$; quare $H = A$. ergo $Z \times B = A$.

ne offendat autem eos, qui legent, quod hoc arithmetice demonstratum est; nam et antiqui eius modi demonstrationibus usi sunt, quippe quae mathematicae potius quam arithmeticae sint propter proportiones, et quod quaeritur, arithmeticum esse constat. nam rationes quantitatesque rationum et multiplicationes proprie ad numeros pertinent et propter eos ad magnitudines, quod ipsum censuit, qui[1]) dixit: nam haec mathematica inter se cognata uidentur esse.

---

Vp in linea $H$ habent numeros $\overline{\alpha}\hat{\beta}$ et inter $H$ et $\Delta$ numerum $\overline{\gamma}$, sed scribendum ut supra (h. e. $1\frac{1}{3} \times 3$). in $\Delta$ pro $\omega$ ($\frac{2}{3}$) habent $\hat{\overline{o}}$.

---

1) Archytas Tarentinus; u. Nicomachus arithm. I, 3, 4.

### Εἰς τὸ ιγ'.

Δεῖ σημειώσασθαι, ὅτι τοῦτο τὸ θεώρημα τρεῖς ἔχει καταγραφάς, ὡς καὶ πολλάκις εἴρηται ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως· ἡ γὰρ ΔΕ ἢ ἀνωτέρω τοῦ Γ συμπίπτει τῇ ΑΓ ἢ κατ' αὐτοῦ τοῦ Γ ἢ ἐξωτέρω ἐκβαλλομένη τῇ ΑΓ συμπίπτει.

### Εἰς τὸ ιδ'.

Δυνατὸν ἦν καὶ οὕτως δεῖξαι, ὅτι, ὡς τὸ ἀπὸ ΑΣ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΣΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΞΤΟ.

ἐπεὶ γὰρ παράλληλός ἐστιν ἡ ΒΓ τῇ ΞΟ, ἔστιν, ὡς ἡ ΓΣ πρὸς ΣΑ, ἡ ΞΤ πρὸς ΤΑ, καὶ διὰ τὰ αὐτά, ὡς ἡ ΑΣ πρὸς ΣΒ, ἡ ΑΤ πρὸς ΤΟ· δι' ἴσου ἄρα, ὡς ἡ ΓΣ πρὸς ΣΒ, ἡ ΞΤ πρὸς ΤΟ. καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΓΣ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΣΒ, τὸ ἀπὸ ΞΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΞΤΟ. ἔστι δὲ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων, ὡς τὸ ἀπὸ ΑΣ πρὸς τὸ ἀπὸ ΣΓ, τὸ ἀπὸ ΑΤ πρὸς τὸ ἀπὸ ΞΤ· δι' ἴσου ἄρα, ὡς τὸ ἀπὸ ΑΣ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΣΓ, τὸ ἀπὸ ΑΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΞΤΟ.

καί ἐστιν, ὡς μὲν τὸ ἀπὸ ΑΣ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΣΓ, ἡ ΘΕ πρὸς ΕΠ, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΑΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΞΤΟ, ἡ ΘΕ πρὸς ΘΡ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΘΕ πρὸς ΕΠ, ἡ ΕΘ πρὸς ΘΡ. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΠ τῇ ΘΡ.

πτῶσιν μὲν οὖν οὐκ ἔχει, φανερὸς δέ ἐστιν ὁ σκοπὸς συνεχὴς ὢν τοῖς πρὸ αὐτοῦ τρισίν· ὁμοίως γὰρ ἐκείνοις τὴν διάμετρον τῶν ἀντικειμένων ζητεῖ τὴν ἀρχικὴν καὶ τὰς παρ' ἃς δύνανται.

---

1. ιγ'] w, γ e corr. W, ι e corr. p. 4. ἐλλίψεως W. 8. ΑΣ] Α e corr. W. 9. οὕτω p. 10. ΞΤΟ] ΖΤ Wp, corr. Comm. 11. ΞΟ] ΖΟ Wp, corr. Comm. 13. ΤΟ] τὸν W,

## Ad prop. XIII.

Animaduertendum, hanc propositionem tres figuras habere, ut iam saepe in ellipsi diximus; nam $\varDelta E$ aut supra $\Gamma$ cum $A\Gamma$ concurrit aut in ipso $\Gamma$ aut extra cum $A\Gamma$ producta concurrit.

## Ad prop. XIV.

Poterat sic quoque demonstrari, esse

$A\Sigma^2 : B\Sigma \times \Sigma\Gamma = AT^2 : \Xi T \times TO$ [I p. 58, 2—3]:

nam quoniam $B\Gamma$ rectae $\Xi O$ parallela est, erit $\Gamma\Sigma : \Sigma A = \Xi T : TA$ et eadem de causa

$$A\Sigma : \Sigma B = AT : TO \text{ [cfr. I p. 56, 24—27].}$$

ex aequo igitur $\Gamma\Sigma : \Sigma B = \Xi T : TO$. quare etiam $\Gamma\Sigma^2 : \Gamma\Sigma \times \Sigma B = \Xi T^2 : \Xi T \times TO$. uerum propter similitudinem triangulorum est [Eucl. VI, 4]

$$A\Sigma^2 : \Sigma\Gamma^2 = AT^2 : \Xi T^2;$$

itaque ex aequo $A\Sigma^2 : B\Sigma \times \Sigma\Gamma = AT^2 : \Xi T \times TO$.

est autem $A\Sigma^2 : B\Sigma \times \Sigma\Gamma = \Theta E : E\Pi$ et

$$AT^2 : \Xi T \times TO = \Theta E : \Theta P.$$

quare etiam $\Theta E : E\Pi = E\Theta : \Theta P$. ergo $E\Pi = \Theta P$ [cfr. I p. 58, 3—7].

casum non habet, et propositum satis adparet, cum adfine sit tribus, quae antecedunt; nam eodem modo, quo illae, diametrum principalem oppositarum parametrosque quaerit.

---

τ'' p, corr. Comm. 14. $TO$] τὸ $\Gamma\Sigma$ W, τὸ $\Sigma\Gamma$ p, corr. Comm. 15. τὸ ἀπό (alt.)] in ras m. 1 W. 16. Post ὑπό rep. $T\Sigma B$ ($B$ corr. ex $\Sigma$ p) τὸ ἀπὸ $\Xi T$ πρὸς τὸ ὑπό Wp, corr. Comm. $\Xi TO$] $\Xi T$ Wp, corr. Comm. ἔστιν W. 21. $\Theta E$] $\Theta\Sigma$ Wp, corr. Comm. 22. $\Xi TO$, ἡ $\Theta E$] $\Xi T$ ὁ $H\Theta E$ Wp, corr. Comm. 28. $E\Theta$] $E$ e corr. m. 1 p. $E\Pi$] $\Theta\Pi$ Wp, corr. Comm.

## *Εἰς τὸ ιϛ'.*

*Ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ ΒΚΑ τῷ ὑπὸ ΑΛΒ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΑ τῇ ΒΛ· ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΒΚΛ τῷ ὑπὸ ΑΛΒ ἐστιν ἴσον, ἀνάλογον ἔσται, ὡς ἡ ΚΒ πρὸς ΑΛ, ἡ ΛΒ πρὸς ΑΚ. καὶ ἐναλλάξ, ὡς ἡ ΚΒ πρὸς ΒΛ, ἡ ΛΑ πρὸς ΑΚ· καὶ συνθέντι, ὡς ἡ ΚΛ πρὸς ΛΒ, ἡ ΛΚ πρὸς ΚΑ· ἴση ἄρα ἡ ΚΑ τῇ ΒΛ.*

*δεῖ ἐπιστῆσαι, ὅτι ἐν τῷ πεντεκαιδεκάτῳ καὶ ἑκκαιδεκάτῳ θεωρήματι σκοπὸν ἔσχε ζητῆσαι τὰς καλουμένας δευτέρας καὶ συζυγεῖς διαμέτρους τῆς ἐλλείψεως καὶ τῆς ὑπερβολῆς ἤτοι τῶν ἀντικειμένων· ἡ γὰρ παραβολὴ οὐκ ἔχει τοιαύτην διάμετρον. παρατηρητέον δέ, ὅτι αἱ μὲν τῆς ἐλλείψεως διάμετροι ἐντὸς ἀπολαμβάνονται, αἱ δὲ τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῶν ἀντικειμένων ἐκτός. καταγράφοντας δὲ δεῖ τὰς μὲν παρ' ἃς δύνανται ἤτοι τὰς ὀρθίας πλευρὰς πρὸς ὀρθὰς τάττειν καὶ δηλονότι καὶ τὰς παραλλήλους αὐταῖς, τὰς δὲ τεταγμένως καταγομένας καὶ τὰς δευτέρας διαμέτρους οὐ πάντως· μάλιστα γὰρ ἐν ὀξείᾳ γωνίᾳ δεῖ κατάγειν αὐτάς, ἵνα σαφεῖς ὦσιν τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἕτεραι οὖσαι τῶν παραλλήλων τῇ ὀρθίᾳ πλευρᾷ.*

---

*Μετὰ τὸ ἑκκαιδέκατον θεώρημα ὅρους ἐκτίθεται περὶ τῆς καλουμένης δευτέρας διαμέτρου τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, οὓς διὰ καταγραφῆς σαφεῖς ποιήσομεν.*

*ἔστω ὑπερβολὴ ἡ ΑΒ, διάμετρος δὲ αὐτῆς ἔστω ἡ ΓΒΔ, παρ' ἣν δὲ δύνανται αἱ ἐπὶ τὴν ΒΓ κατ-*

---

7. *ΚΑ* (alt.)] *ΚΘ* W et p (*Θ* e corr. m. 1); corr. Comm. (ak). 8. ἑκκεδεκάτῳ W. 9. ἔσχεν W. 12. Mg. (н m. 1 W.

## Ad prop. XVI.

Quare $BK \times KA = A\Lambda \times \Lambda B$; itaque est $KA = B\Lambda$ [I p. 66, 9—11]: quoniam enim

$$BK \times KA = A\Lambda \times \Lambda B,$$

erit $KB : A\Lambda = \Lambda B : AK$. et permutando

$$KB : B\Lambda = \Lambda A : AK;$$

et componendo $K\Lambda : \Lambda B = \Lambda K : KA$; ergo $KA = B\Lambda$.

animaduertendum, in quinta decima et sexta decima propositionibus ei propositum fuisse diametros alteras et coniugatas, quae uocantur, ellipsis hyperbolaeque siue oppositarum quaerere; parabola enim talem diametrum non habet. obseruandum autem, diametros ellipsis intus comprehendi, hyperbolae uero oppositarumque extra. in figuris autem describendis oportet parametros siue recta latera perpendiculares collocari et, ut per se intellegitur, etiam rectas iis parallelas, rectas autem ordinate ductas diametrosque alteras non semper; melius enim in angulo acuto ducuntur, ut iis, qui legent, statim adpareat, eas alias esse ac rectas lateri recto parallelas.

---

Post propositionem sextam decimam de diametro altera, quae uocatur, hyperbolae et ellipsis definitiones exponit [I p. 66, 16 sq.], quas per figuram explicabimus.

sit $AB$ hyperbola, diametrus autem eius sit $\Gamma B\Delta$, $BE$ autem parametrus diametri $B\Gamma$. adparet igitur,

---

13. ἐλλείψεως] corr. ex ἐλλήψεως m. 2 W. 18. δευτέρας] β' p. 21. ὀρθίᾳ] ὀρθείαι W. 24—25. -εῖς ποι- in ras. m. 1 W.

*αγόμεναι ἡ ΒΕ. φανερὸν οὖν, ὅτι ἡ μὲν ΒΓ εἰς ἄπειρον αὔξεται διὰ τὴν τομήν, ὡς δέδεικται ἐν τῷ ὀγδόῳ θεωρήματι, ἡ δὲ ΒΔ, ἥτις ἐστὶν ἡ ὑποτείνουσα τὴν ἐκτὸς τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου γωνίαν πεπέρασται. ταύτην δὴ διχοτομοῦντες κατὰ τὸ Ζ καὶ ἀγαγόντες ἀπὸ τοῦ Α τεταγμένως κατηγμένην τὴν ΑΗ, διὰ δὲ τοῦ Ζ τῇ ΑΗ παράλληλον τὴν ΘΖΚ καὶ ποιήσαντες τὴν ΘΖ τῇ ΖΚ ἴσην, ἔτι μέντοι καὶ τὸ ἀπὸ ΘΚ ἴσον τῷ ὑπὸ ΔΒΕ, ἕξομεν τὴν ΘΚ δευτέραν διάμετρον. τοῦτο γὰρ δυνατὸν διὰ τὸ τὴν ΘΚ ἐκτὸς οὖσαν τῆς τομῆς εἰς ἄπειρον ἐκβάλλεσθαι καὶ δυνατὸν εἶναι ἀπὸ τῆς ἀπείρου προτεθείσῃ εὐθείᾳ ἴσην ἀφελεῖν. τὸ δὲ Ζ κέντρον καλεῖ, τὴν δὲ ΖΒ καὶ τὰς ὁμοίως αὐτῇ ἀπὸ τοῦ Ζ πρὸς τὴν τομὴν φερομένας ἐκ τοῦ κέντρου.*


*ταῦτα μὲν ἐπὶ τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῶν ἀντικειμένων· καὶ φανερόν, ὅτι πεπερασμένη ἐστὶν ἑκατέρα τῶν διαμέτρων, ἡ μὲν πρώτη αὐτόθεν ἐκ τῆς γενέσεως τῆς τομῆς, ἡ δὲ δευτέρα, διότι μέση ἀνάλογόν ἐστι πεπερασμένων εὐθειῶν τῆς τε πρώτης διαμέτρου καὶ τῆς παρ' ἣν δύνανται αἱ καταγόμεναι ἐπ' αὐτὴν τεταγμένως.*

*ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως οὔπω δῆλον τὸ λεγόμενον. ἐπειδὴ γὰρ εἰς ἑαυτὴν συννεύει, καθάπερ ὁ κύκλος, καὶ ἐντὸς ἀπολαμβάνει πάσας τὰς διαμέτρους καὶ ὡρισμένας αὐτὰς ἀπεργάζεται· ὥστε οὐ πάντως ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως ἡ μέση ἀνάλογον τῶν τοῦ εἴδους πλευρῶν καὶ διὰ τοῦ κέντρου τῆς τομῆς ἀγομένη καὶ ὑπὸ τῆς διαμέτρου διχοτομουμένη ὑπὸ τῆς τομῆς περατοῦται·*

---

4. *ἄξωνος* W. 9. *ὑπό*] *ἀπό* p. 19. *ἐστιν* W. 23. *οὔπω*] *οὕτω*? 26. *οὐ*] del. Comm.

$B\Gamma$ propter sectionem in infinitum crescere, sicut in propositione octaua demonstratum est, $B\Delta$ autem, quae sub angulo exteriore trianguli per axem positi subtendat, terminatam esse. hac igitur in $Z$ in duas partes aequales diuisa, ab $A$ autem $AH$ ordinate ducta et per $Z$ rectae $AH$ parallela ducta $\Theta ZK$ et sumpta $\Theta Z$ rectae $ZK$ aequali praetereaque sumpto




$$\Theta K^2 = \Delta B \times BE,$$


habebimus alteram diametrum $\Theta K$. hoc enim fieri potest, quia $\Theta K$, quae extra sectionem est, in infinitum produci potest, et quia ab infinita recta rectam datae aequalem abscindere possumus. $Z$ autem centrum uocat et $ZB$ easque, quae similiter a $Z$ ad sectionem ducuntur, radios.

haec quidem in hyperbola oppositisque; et adparet, utramque diametrum terminatam esse, priorem statim ex origine sectionis, alteram autem, quod media sit proportionalis inter rectas terminatas, priorem scilicet diametrum et parametrum rectarum ad illam ordinate ductarum.

in ellipsi uero nondum constat propositum. quoniam enim sicut circulus in se recurrit, omnes diametros intra se comprehendit et determinat; quare in ellipsi media inter latera figurae proportionalis per centrum sectionis ducta et a diametro in duas partes aequales secta non semper a sectione determinatur. fieri autem

δυνατὸν δὲ αὐτὴν συλλογίζεσθαι δι' αὐτῶν τῶν εἰρημένων ἐν τῷ πεντεκαιδεκάτῳ θεωρήματι. ἐπεὶ γάρ, ὡς ἐκεῖ δέδεικται, αἱ ἐπὶ τὴν ΔΕ καταγόμεναι παράλληλοι τῇ ΑΒ δύνανται τὰ παρακείμενα παρὰ τὴν τρίτην αὐταῖς ἀνάλογον γινομένην, τουτέστι τὴν ΖΔ, ἔστιν, ὡς ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΑΒ, ἡ ΑΒ πρὸς ΔΖ· ὥστε μέση ἀνάλογόν ἐστιν ἡ ΑΒ τῶν ΕΔ, ΔΖ. καὶ διὰ τοῦτο καὶ αἱ καταγόμεναι ἐπὶ τὴν ΑΒ παράλληλοι τῇ ΔΕ δυνήσονται τὰ παρὰ τὴν τρίτην ἀνάλογον παρακείμενα τῶν ΔΕ, ΑΒ, τουτέστι τὴν ΑΝ. διὰ δὴ τοῦτο μέση ἀνάλογον γίνεται ἡ ΔΕ δευτέρα διάμετρος τῶν ΒΑ, ΑΝ τοῦ εἴδους πλευρῶν.

δεῖ δὲ εἰδέναι καὶ τοῦτο διὰ τὸ εὔχρηστον τῶν καταγραφῶν· ἐπεὶ γὰρ ἄνισοί εἰσιν αἱ ΑΒ, ΔΕ διάμετροι· ἐν μόνῳ γὰρ τῷ κύκλῳ ἴσαι εἰσίν· δῆλον, ὅτι ἡ μὲν πρὸς ὀρθὰς ἀγομένη τῇ ἐλάσσονι αὐτῶν ὡς ἐνταῦθα ἡ ΔΖ ἅτε τρίτη ἀνάλογον οὖσα τῶν ΔΕ, ΑΒ μείζων ἐστὶν ἀμφοῖν, ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς ἀγομένη τῇ μείζονι ὡς ἐνταῦθα ἡ ΑΝ διὰ τὸ τρίτην ἀνάλογον εἶναι τῶν ΑΒ, ΔΕ ἐλάσσων ἐστὶν ἀμφοῖν· ὥστε καὶ συνεχῶς εἶναι τὰς τέσσαρας ἀνάλογον· ὡς γὰρ ἡ ΑΝ πρὸς ΔΕ, ἡ ΔΕ πρὸς ΑΒ καὶ ἡ ΑΒ πρὸς ΔΖ.




## Εἰς τὸ ιζ'.

Ὁ μὲν Εὐκλείδης ἐν τῷ πεντεκαιδεκάτῳ θεωρήματι τοῦ τρίτου βιβλίου τῆς στοιχειώσεως ἔδειξεν, ὅτι ἡ

5. τουτέστιν W. τήν] τῆι W, τῇ p, corr. Halley. ΖΔ] Δ e corr. p. 8. ΑΒ] Α e corr. in scrib. W. 10. τουτ-

potest, ut per ea ipsa, quae in propositione quinta decima dicta sunt, computetur. nam quoniam, ut ibi demonstratum est, rectae ad $\Delta E$ rectae $AB$ parallelae ductae quadratae aequales sunt spatiis ad tertiam earum proportionalem, hoc est ad $Z\Delta$, adplicatis, erit $\Delta E : AB = AB : \Delta Z$; quare $AB$ inter $E\Delta$, $\Delta Z$ media est proportionalis. qua de causa etiam rectae ad $AB$ rectae $\Delta E$ parallelae ductae quadratae aequales erunt spatiis ad tertiam rectarum $\Delta E$, $AB$ proportionalem, hoc est ad $AN$, adplicatis. qua de causa $\Delta E$ altera diametrus media est proportionalis inter $BA$, $AN$ latera figurae.

sciendum autem hoc quoque, quod ad figuras describendas utile est; quoniam enim diametri $AB$, $\Delta E$ inaequales sunt (nam in solo circulo sunt aequales), manifestum est, rectam ad minorem earum perpendicularem ductam ut hic $\Delta Z$, quippe quae tertia sit proportionalis rectarum $\Delta E$, $AB$, maiorem esse utraque, rectam autem ad maiorem perpendicularem ductam ut hic $AN$, quippe quae tertia sit proportionalis rectarum $AB$, $\Delta E$, minorem utraque [Eucl. V, 14]; quare etiam deinceps proportionales sunt quattuor illae rectae; nam $AN : \Delta E = \Delta E : AB = AB : \Delta Z$.

## Ad prop. XVII.

Euclides in propositione quinta decima[1]) tertii libri Elementorum demonstrauit, rectam, quae ad

1) Est Elem. III, 16.

ἐστιν W. μέση] μέν Wp, corr. Comm. 20. τῶν] om. p. $\Delta E$] $\Delta$ e corr. in scrib. W. 23. Post τρίτην del. εἶναι p. 26. $AN$] $N$ e corr. p.

πρὸς ὀρθὰς ἀγομένη ἀπ' ἄκρας τῆς διαμέτρου ἐκτός τε πίπτει καὶ ἐφάπτεται τοῦ κύκλου, ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ἐν τούτῳ καθολικόν τι δείκνυσι δυνάμενον ἐφαρμόσαι ταῖς τρισὶ τοῦ κώνου καὶ τῷ κύκλῳ.

τοσοῦτον διαφέρει ὁ κύκλος τῶν τοῦ κώνου τομῶν, ὅτι ἐπ' ἐκείνου μὲν αἱ τεταγμένως κατηγμέναι πρὸς ὀρθὰς ἄγονται τῇ διαμέτρῳ· οὐδὲ γὰρ ἄλλαι εὐθεῖαι παράλληλοι ἑαυταῖς ὑπὸ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου διχοτομοῦνται· ἐπὶ δὲ τῶν τριῶν τομῶν οὐ πάντως πρὸς ὀρθὰς ἄγονται, εἰ μὴ ἐπὶ μόνους τοὺς ἄξονας.

## Εἰς τὸ ιη'.

Ἔν τισιν ἀντιγράφοις τὸ θεώρημα τοῦτο ἐπὶ μόνης παραβολῆς καὶ ὑπερβολῆς ἐστιν, κάλλιον δὲ καθολικώτερον ἔχειν τὴν πρότασιν, εἰ μὴ ὅτι τὸ ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως ἐκείνοις ὡς ἀναμφίβολον παραλέλειπται· ἡ γὰρ ΓΔ ἐντὸς οὖσα τῆς τομῆς πεπερασμένης οὔσης καὶ αὐτὴ κατ' ἀμφότερα τέμνει τὴν τομήν.

δεῖ δὲ ἐπιστῆσαι, ὅτι, κἂν ἡ ΑΖΒ τέμνῃ τὴν τομήν, ἡ αὐτὴ ἀπόδειξις ἁρμόζει.

## Εἰς τὸ κ'.

Ἀπὸ τούτου τοῦ θεωρήματος ἀρχόμενος ἐφεξῆς ἐν πᾶσι τὰ συμπτώματα τῆς παραβολῆς αὐτῇ δείκνυσιν ὑπάρχοντα καὶ οὐκ ἄλλῃ τινί, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δὲ τῇ ὑπερβολῇ καὶ τῇ ἐλλείψει καὶ τῷ κύκλῳ τὰ αὐτὰ δείκνυσιν ὑπάρχοντα.

ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἄχρηστον φαίνεται τοῖς τὰ μηχα-

---

3. δείκνυσι] scripsi praeeunte Comm., δεικνύς Wp. 4. ταῖς] fort. ταῖς τε. τρισίν W. κώνου] κώνου τομαῖς Halley

diametrum in termino perpendicularis erigatur, extra circulum cadere eumque contingere, Apollonius uero hic propositionem uniuersalem demonstrat, quae simul de tribus coni sectionibus et de circulo ualet.

hoc tantum circulus a sectionibus coni differt, quod in eo rectae ordinate ductae ad diametrum perpendiculares ducuntur; neque enim aliae rectae inter se parallelae a diametro circuli in binas partes aequales secantur; in tribus uero sectionibus non semper perpendiculares ducuntur, sed ad axes solos.

## Ad prop. XVIII.

In nonnullis codicibus haec propositio in sola parabola hyperbolaque demonstratur, sed melius est, propositionem uniuersaliorem esse, nisi quod illi de ellipsi, quod ibi res dubia non sit, mentionem non fecerunt. nam *ΓΔ*, quae intra sectionem terminatam posita est, per se sectionem ab utraque parte secat.

animaduertendum autem, eandem demonstrationem quadrare, etiam si *ΔZB* sectionem secet.

## Ad prop. XX.

Ab hac propositione incipiens deinceps in omnibus proprietates parabolae ei soli adcidere demonstrat nec ulli alii, plerumque uero hyperbolae, ellipsi, circulo eadem adcidere demonstrat.

quoniam autem iis, qui mechanica scribunt, propter

---

praeeunte Comm. 6. ⟨H mg. m. 1 W. 13. *τοῦτο*] supra scr. m. 1 p. 14. *ἔστι* p. 15. *μή*] scripsi, *καί* Wp. *τό*] om. p in extr. lin. 16. *ἀναμφίβολον*] scripsi, *ἀμφίβολον* Wp, *οὐκ ἀμφίβολον* Halley cum Comm. 18. *αὐτή*] *αὐ-* e corr. in scrib. p. 19. *τέμνῃ*] e corr. p, *τέμνει* W. 23. *πᾶσιν* W. *αὐτῇ*] p, *αὗτη* W.

νικὰ γράφουσι διὰ τὴν ἀπορίαν τῶν ὀργάνων καὶ πολλάκις διὰ συνεχῶν σημείων γράφειν τὰς τοῦ κώνου τομὰς ἐν ἐπιπέδῳ, διὰ τούτου τοῦ θεωρήματος ἔστι πορίσασθαι συνεχῆ σημεῖα, δι' ὧν γραφήσεται ἡ παραβολὴ κανόνος παραθέσει. ἐὰν γὰρ ἐκθῶμαι εὐθεῖαν ὡς τὴν $AB$ καὶ ἐπ' αὐτῆς λάβω συνεχῆ σημεῖα ὡς τὰ $E$, $Z$ καὶ ἀπ' αὐτῶν πρὸς ὀρθὰς τῇ $AB$ καὶ ποιήσω ὡς τὰς $E\Gamma$, $Z\Delta$ λαβὼν ἐπὶ τῆς $E\Gamma$ τυχὸν σημεῖον τὸ $\Gamma$, εἰ μὲν εὐρυτέραν βουληθείην ποιῆσαι παραβολήν, πόρρω τοῦ $E$, εἰ δὲ στενωτέραν, ἐγγύτερον, καὶ ποιήσω, ὡς τὴν $AE$ πρὸς $AZ$, τὸ ἀπὸ $E\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $Z\Delta$, τὰ $\Gamma$, $\Delta$ σημεῖα ἐπὶ τῆς τομῆς ἔσται. ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλα ληψόμεθα, δι' ὧν γραφήσεται ἡ παραβολή.

## Εἰς τὸ κα'.

Τὸ θεώρημα σαφῶς ἔκκειται καὶ πτῶσιν οὐκ ἔχει· δεῖ μέντοι ἐπιστῆσαι, ὅτι ἡ παρ' ἣν δύνανται, τουτέστιν ἡ ὀρθία πλευρά, ἐπὶ τοῦ κύκλου ἴση ἐστὶ τῇ διαμέτρῳ. εἰ γάρ ἐστιν, ὡς το ἀπὸ $\Delta E$ πρὸς τὸ ὑπὸ $AEB$, ἡ $\Gamma A$ πρὸς $AB$, ἴσον δὲ τὸ ἀπὸ $\Delta E$ τῷ ὑπὸ $AEB$ ἐπὶ τοῦ κύκλου μόνου, ἴση ἄρα καὶ ἡ $\Gamma A$ τῇ $AB$.

δεῖ δὲ καὶ τοῦτο εἰδέναι, ὅτι αἱ καταγόμεναι ἐν τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ πρὸς ὀρθάς εἰσι πάντως τῇ διαμέτρῳ καὶ ἐπ' εὐθείας γίνονται ταῖς παραλλήλοις τῇ $A\Gamma$.

διὰ δὲ τούτου τοῦ θεωρήματος τῷ αὐτῷ τρόπῳ τοῖς ἐπὶ τῆς παραβολῆς εἰρημένοις προσέχοντες γρά-

---

1. γράφουσιν W. ἀπορίαν] p, corr. ex ἀπορείαν m. 1 W. 4. ἔστιν W. 7. τῇ] τήν W p, corr. Comm. καὶ ποιήσω] fort. δύο ἀναστήσω. 8. $Z\Delta$] Z W p, corr. Comm. $E\Gamma$] $ET$ W p,

penuriam instrumentorum non inutile uidetur interdum etiam per puncta continua coni sectiones in plano describere, per hanc propositionem fieri potest, ut continua puncta comparentur, per quae parabola describatur regula adposita. si enim rectam posuero ut $AB$ [u. fig. I p. 73] in eaque puncta continua sumpsero ut $E$, $Z$ et ab iis ad rectam $AB$ perpendiculares erexero ut $E\Gamma$, $Z\Delta$ sumpto in $E\Gamma$ puncto aliquo $\Gamma$, si parabolam latiorem efficere uoluero, ab $E$ remoto, sin angustiorem, propius, et fecero

$$E\Gamma^2 : Z\Delta^2 = AE : AZ,$$

puncta $\Gamma$, $\Delta$ in sectione erunt. et similiter alia quoque sumemus, per quae parabola describetur.

## Ad prop. XXI.

Propositio satis clare exposita est nec casum habet; animaduertendum autem, parametrum siue latus rectum in circulo diametro aequalem esse. nam si

$$\Delta E^2 : AE \times EB = \Gamma A : AB$$

et in solo circulo $\Delta E^2 = AE \times EB$, erit etiam $\Gamma A = AB$.

sciendum autem hoc quoque, rectas in ambitu circuli ordinate ductas omnino perpendiculares esse ad diametrum et positas in productis rectis rectae $A\Gamma$ parallelis.

per hanc uero propositionem eadem ratione usi, quam in parabola commemorauimus [ad prop. XX],

corr. Comm. 10. $E$] $A$ Wp, corr. Comm. 13. λήψώμεθα W, sed corr. m. 1. 18. ἤ] addidi, om. Wp. ἐστίν W. 19. ἐστι p. 20. ἀπό] om. Wp, corr. Comm. 28. γράφομεν] fort. γράψομεν.

φομεν ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν κανόνος παραθέσει. ἐκκείσθω γὰρ εὐθεῖα ἡ $AB$ καὶ προσεκβεβλήσθω ἐπ' ἄπειρον ἐπὶ τὸ $H$, καὶ ἀπὸ τοῦ $A$ ταύτῃ πρὸς ὀρθὰς ἤχθω ἡ $A\Gamma$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $B\Gamma$ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ εἰλήφθω τινὰ σημεῖα ἐπὶ τῆς $AH$ τὰ $E$, $H$, καὶ ἀπὸ τῶν $E$, $H$ τῇ $A\Gamma$ παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ $E\Theta$, $HK$, καὶ γινέσθω τῷ μὲν ὑπὸ $AHK$ ἴσον τὸ ἀπὸ $ZH$, τῷ δ' ὑπὸ $AE\Theta$ ἴσον τὸ ἀπὸ $\Delta E$· διὰ γὰρ τῶν $A$, $\Delta$, $Z$ ἥξει ἡ ὑπερβολή. ὁμοίως δὲ κατασκευάσομεν καὶ τὰ ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως.

## Εἰς τὸ κγ'.


Δεῖ ἐπιστῆσαι, ὅτι ἐν τῇ προτάσει δύο διαμέτρους λέγει οὐχ ἁπλῶς τὰς τυχούσας, ἀλλὰ τὰς καλουμένας συζυγεῖς, ὧν ἑκατέρα παρὰ τεταγμένως κατηγμένην ἦκται καὶ μέσον λόγον ἔχει τῶν τοῦ εἴδους πλευρῶν τῆς ἑτέρας διαμέτρου, καὶ διὰ τοῦτο δίχα τέμνουσι τὰς ἀλλήλων παραλλήλους, ὡς δέδεικται ἐν τῷ ιε' θεωρήματι. εἰ γὰρ μὴ οὕτως ληφθῇ, συμβήσεται τὴν μεταξὺ εὐθεῖαν τῶν δύο διαμέτρων τῇ ἑτέρᾳ αὐτῶν παράλληλον εἶναι· ὅπερ οὐχ ὑπόκειται.

ἐπειδὴ δὲ τὸ $H$ ἔγγιόν ἐστι τῆς διχοτομίας τῆς $AB$ ἤπερ τὸ $\Theta$, καί ἐστι τὸ μὲν ὑπο $BHA$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $HM$ ἴσον τῷ ἀπὸ $AM$, τὸ δὲ ὑπὸ $A\Theta B$ μετὰ

---

1. ἔλλιψιν W. 5. $H$] e corr. p. 6. $H$] e corr. p. τῇ $A\Gamma$] mg. p. $E\Theta$] corr. ex $EH$ in scrib. W. 7. $HK$] $NK$ p. τῷ] scripsi, τό Wp. τό] W, τῷ p. ἀπό] om. Wp, corr. Comm. 8. τῷ] scripsi, τό Wp. τό] W, τῷ p. 16. τέμνουσιν W. 17. ιε'] om. Wp, corr. Halley (δεκάτῳ πέμπτῳ). 18. οὕτω in extr. linea W, p. 21. δέ] om. p. ἔγγιον] ι corr. ex ει m. 2 W. ἐστιν W. 22. $AB$] $B$ e corr. p, $AM$ W. ἐστιν W. $BHA$] $BAH$ Wp, corr. Comm. 23. $HM$] $HB$ p. $AM$] $AB$ p.

hyperbolam ellipsimque regula adposita describimus. ponatur enim recta $AB$ et in infinitum producatur




ad $H$, ab $A$ autem ad eam perpendicularis ducatur $A\Gamma$, ducaturque $B\Gamma$ et producatur, in $AH$ autem puncta aliqua sumantur $E, H$, et ab $E, H$ rectae $A\Gamma$ parallelae ducantur $E\Theta$, $HK$, fiatque $ZH^2 = AH \times HK$, $\Delta E^2 = AE \times E\Theta$; tum enim hyperbola per $A$, $\Delta$, $Z$ ueniet. similiter autem etiam in ellipsi faciemus.

## Ad prop. XXIII.

Animaduertendum, duas diametros, quas in propositione nominet, quaslibet duas non esse, sed coniugatas, quae uocentur, quarum utraque rectae ordinate ductae parallela ducta est et media proportionalis est inter latera figurae alterius diametri; quare altera alterius parallelas in binas partes aequales secat, ut in propositione XV demonstratum est. nam si ita non sumpserimus, fieri poterit, ut recta inter duas diametros posita alteri earum parallela sit; quod contra hypothesim est.

quoniam autem $H$ puncto medio rectae $AB$ propius est quam $\Theta$, et

$$BH \times HA + HM^2 = AM^2 = A\Theta \times \Theta B + \Theta M^2$$

[Eucl. II, 5], uerum $\Theta M^2 > HM^2$, erit

$$BH \times HA > B\Theta \times \Theta A \text{ [I p. 78, 10—11].}$$

---

Figura corrupta est in W, imperfecta in p.

τοῦ ἀπὸ ΘΜ ἴσον τῷ αὐτῷ, το δὲ ἀπὸ ΘΜ τοῦ ἀπὸ ΗΜ μεῖζον, το ἄρα ὑπὸ ΒΗΔ μεῖζον τοῦ ὑπὸ ΒΘΔ.

### Εἰς τὸ κε΄.

Ἔν τισι φέρεται καὶ αὕτη ἡ ἀπόδειξις·

εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς τομῆς τὸ Θ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΘ· ἡ ΖΘ ἄρα ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ ΔΓ· ὥστε καὶ ἡ ΖΕ. πάλιν δὴ εἰλήφθω, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΚΖ καὶ ἐκβεβλήσθω· συμπεσεῖται δὴ τῇ ΒΑ ἐκβαλλομένῃ· ὥστε καὶ ἡ ΖΗ.

### Εἰς τὸ κϛ΄.

Τὸ θεώρημα τοῦτο πτώσεις ἔχει πλείους, πρῶτον μέν, ὅτι ἡ ΕΖ ἢ ἐπὶ τὰ κυρτὰ μέρη τῆς τομῆς λαμβάνεται ὡς ἐνταῦθα ἢ ἐπὶ τα κοῖλα, ἔπειτα, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Ε παρὰ τεταγμένως κατηγμένην ἔσω μὲν καθ' ἓν σημεῖον συμβάλλει ἀδιαφόρως τῇ διαμέτρῳ ἀπείρῳ οὔσῃ, ἔξω δὲ οὖσα καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆς ὑπερβολῆς ἔχει θέσιν ἢ ἐξωτέρω τοῦ Β ἢ ἐπὶ τοῦ Β ἢ μεταξὺ τῶν Α, Β.

### Εἰς τὸ κζ΄.

Ἔν τισιν ἀντιγράφοις τοῦ κζ΄ θεωρήματος φέρεται τοιαύτη ἀπόδειξις·

ἔστω παραβολή, ἧς διάμετρος ἡ ΑΒ, καὶ ταύτην τεμνέτω εὐθεῖά τις ἡ ΗΔ ἐντὸς τῆς τομῆς. λέγω,


---

1. ΘΜ] ΘΒ p. ΘΜ] ΘΒ p. 2. ΗΜ e corr. p. 3. κε΄] supra ε scr. β m. 1 p. 4. τισιν W. 7. ΔΓ] Δ corr. ex Γ in scrib. W. 9. ἡ] scripsi, τῇ Wp. 10. κϛ΄] ϛ e corr. m. 1 p. 12. ἢ] om. p. 14. τε-] in ras. ante ras. 2—3 litt. W. ἔσω] scripsi, ἕως Wp. 15. ἀδιαφόρως] scripsi, διαφόρως Wp. 17. θέσιν] comp. p, θέσει W. ἢ ἐπί — 18. μεταξύ] in ras. p. 19. Εἰς τὸ κζ΄] καὶ τοῦτο

## Ad prop. XXV.

In quibusdam codicibus haec quoque fertur demonstratio:

sumatur in sectione punctum aliquod $\Theta$, ducaturque $Z\Theta$; $Z\Theta$ igitur producta cum $\Delta\Gamma$ concurrit [prop. XXIII]; quare etiam $ZE$. rursus punctum sumatur, ducaturque $KZ$ et producatur; concurret igitur cum $BA$ producta. quare etiam $ZH$.




## Ad prop. XXVI.

Haec propositio complures habet casus, primum quod $EZ$ aut ad partes conuexas sectionis sumitur sicut hic aut ad concauas, deinde quod recta ab $E$ ordinate ducta intus quidem indifferenter in uno aliquo puncto cum diametro concurrit, quae infinita est, extra uero posita, maxime in hyperbola, aut extra $B$ aut in ipso $B$ aut inter $A$, $B$ cadere potest.

## Ad prop. XXVII.

In quibusdam codicibus haec fertur demonstratio propositionis XXVII:

sit parabola, cuius diametrus sit $AB$, secetque eam recta aliqua $H\Delta$ intra sectionem posita. dico,

---

*Εὐτοκίου* p. κζ′] κβ, β mut. in ε (euan.), W; corr.. Comm. 20. φέρεται] φέρεται ἡ p, ερ euan. 22. παραβολῆς p. ῆς] om. p.

ὅτι ἡ $H\Delta$ ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη συμπεσεῖται τῇ τομῇ.

ἤχθω γάρ τις διὰ τοῦ $A$ παρατεταγμένως ἡ $AE$· ἡ $AE$ ἄρα ἐκτὸς πεσεῖται τῆς τομῆς.

ἤτοι δὴ ἡ $H\Delta$ τῇ $AE$ παράλληλός ἐστιν ἢ οὔ.

εἰ μὲν οὖν παράλληλός ἐστιν, αὐτὴ τεταγμένως κατῆκται· ὥστε ἐκβαλλομένη ἐφ' ἑκάτερα, ἐπεὶ δίχα τέμνεται ὑπὸ τῆς διαμέτρου, συμπεσεῖται τῇ τομῇ.

μὴ ἔστω δὴ παράλληλος τῇ $AE$, ἀλλὰ ἐκβαλλομένη συμπιπτέτω τῇ $AE$ κατὰ τὸ $E$ ὡς ἡ $H\Delta E$.

ὅτι μὲν οὖν τῇ τομῇ ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη συμπίπτει, ἐφ' ἅ ἐστι τὸ $E$, δῆλον· εἰ γὰρ τῇ $AE$ συμβάλλει, πολὺ πρότερον τεμεῖ τὴν τομήν.


λέγω, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ τομῇ.

ἔστω γὰρ παρ' ἣν δύνανται ἡ $MA$, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείας αὐτῇ ἡ $AZ$· ἡ $MA$ ἄρα τῇ $AB$ πρὸς ὀρθάς ἐστιν. πεποιήσθω, ὡς τὸ ἀπὸ $AE$ πρὸς τὸ $AE\Delta$ τρίγωνον, οὕτως ἡ $MA$ πρὸς $AZ$, καὶ διὰ τῶν $M$, $Z$ τῇ $AB$ παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ $ZK$, $MN$· τετραπλεύρου οὖν ὄντος τοῦ $\Lambda A\Delta H$ καὶ θέσει οὔσης τῆς $\Lambda A$ ἤχθω τῇ $\Lambda A$ παράλληλος ἡ $\Gamma KB$ ἀποτέμνουσα τὸ $\Gamma KH$ τρίγωνον τῷ $\Lambda A\Delta H$ τετραπλεύρῳ ἴσον, καὶ διὰ τοῦ $B$ τῇ $ZAM$ παράλληλος ἤχθω ἡ $\Xi BN$. καὶ ἐπεί ἐστιν, ὡς τὸ ἀπὸ $AE$ πρὸς τὸ $AE\Delta$ τρίγωνον, ἡ $MA$ πρὸς $AZ$, ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ἀπὸ $AE$ πρὸς τὸ $AE\Delta$ τρίγωνον, τὸ ἀπὸ $\Gamma B$ πρὸς τὸ $\Delta\Gamma B$ τρίγωνον· παράλληλος γάρ ἐστιν ἡ $AE$ τῇ $\Gamma B$, καὶ ἐπιζευγνύουσιν αὐτὰς αἱ $\Gamma E$, $AB$· ὡς δὲ ἡ $MA$ πρὸς

6. αὐτή] scripsi, αὕτη Wp. 9. μή] addidi, om. Wp; post δή add. Halley cum Comm. 13. πρότερον] corr. ex

rectam $H\Delta$ productam in utramque partem cum sectione concurrere.

ducatur enim per $A$ ordinate recta $AE$; $AE$ igitur extra sectionem cadet [I, 17].




aut igitur parallela erit $H\Delta$ rectae $AE$ aut non erit.

si igitur parallela est, et ipsa ordinate ducta est; quare in utramque partem producta, quoniam a diametro in duas partes aequales secatur [I def. 5], cum sectione concurret [prop. XIX].

ne sit igitur rectae $AE$ parallela, sed producta cum $AE$ in $E$ concurrat, ut $H\Delta E$.

hanc igitur in altera parte, in qua est $E$, cum sectione concurrere, manifestum est; nam siquidem cum $AE$ concurrit, multo prius sectionem secabit.

dico, eam etiam ad alteram partem productam cum sectione concurrere.

sit enim $MA$ parametrus, et in ea producta posita sit $AZ$; $MA$ igitur ad $AB$ perpendicularis est. fiat $MA : AZ = AE^2 : \triangle AE\Delta$, et per $M$, $Z$ rectae $AB$ parallelae ducantur $ZK$, $MN$; itaque cum $\Lambda A\Delta H$ quadrilaterum sit et $\Lambda A$ positione data, ducatur rectae $\Lambda A$ parallela $\Gamma KB$ triangulum $\Gamma KH$ abscindens quadrilatero $\Lambda A\Delta H$ aequalem, et per $B$ rectae $ZAM$ parallela ducatur $\Xi BN$. et quoniam est

$$AE^2 : AE\Delta = MA : AZ,$$

uerum [Eucl. VI, 19] $AE^2 : AE\Delta = \Gamma B^2 : \Delta\Gamma B$; nam

---

πρώτερον in scrib. W. 14. μέρῃ W. 25. ὡς] om. Wp, corr. Comm. $AE$ πρὸς τό] om. Wp, corr. Comm.

*ΑΖ*, τὸ *ΑΜΝΒ* παραλληλόγραμμον προς τὸ *ΑΞ* παραλληλόγραμμον, ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ *ΓΒ* πρὸς τὸ *ΓΔΒ* τρίγωνον, οὕτως τὸ *ΑΜΝΒ* παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ *ΑΖΞΒ* παραλληλόγραμμον· ἐναλλάξ, ὡς τὸ ἀπὸ *ΓΒ* πρὸς τὸ *ΑΜΝΒ* παραλληλόγραμμον, οὕτως τὸ *ΓΔΒ* τρίγωνον πρὸς τὸ *ΑΖΞΒ* παραλληλόγραμμον. ἴσον δέ ἐστι τὸ *ΖΑΒΞ* παραλληλόγραμμον τῷ *ΓΒΔ* τριγώνῳ· ἐπεὶ γὰρ τὸ *ΓΗΚ* τρίγωνον τῷ *ΑΛΗΔ* τετραπλεύρῳ ἐστὶν ἴσον, κοινὸν δὲ τὸ *ΗΔΒΚ* τετράπλευρον, τὸ *ΛΑΒΚ* παραλληλόγραμμον τῷ *ΓΔΒ* τριγώνῳ ἐστὶν ἴσον· τὸ δὲ *ΛΑΒΚ* παραλληλόγραμμον τῷ *ΖΑΒΞ* παραλληλογράμμῳ ἐστὶν ἴσον· ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεώς ἐστι τῆς *ΑΒ* καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς *ΑΒ*, *ΖΚ*. ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ *ΓΔΒ* τρίγωνον τῷ *ΞΖΑΒ* παραλληλογράμμῳ· ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ *ΓΒ* τῷ *ΑΜΝΒ* παραλληλογράμμῳ ἐστὶν ἴσον. τὸ δὲ *ΜΑΒΝ* παραλληλόγραμμον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ *ΜΑΒ*· ἡ γὰρ *ΜΑ* πρὸς ὀρθάς ἐστι τῇ *ΑΒ*· τὸ ἄρα ὑπὸ *ΜΑΒ* ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ *ΓΒ*. καί ἐστιν ἡ *ΜΑ* ὀρθία τοῦ εἴδους πλευρά, ἡ δὲ *ΑΒ* διάμετρος, καὶ ἡ *ΓΒ* τεταγμένως· παράλληλος γάρ ἐστι τῇ *ΑΕ*· τὸ *Γ* ἄρα πρὸς τῇ τομῇ ἐστιν. ἡ *ΔΗΓ* ἄρα συμβάλλει τῇ τομῇ κατὰ τὸ *Γ*· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

### σχόλια εἰς τὸ προτεθὲν θεώρημα.

πεποιήσθω δή, ὡς τὸ ἀπὸ *ΑΕ* πρὸς τὸ *ΑΕΔ* τρίγωνον, ἡ *ΜΑ* πρὸς *ΑΖ*] τοῦτο δέδεικται ἐν σχολίῳ τοῦ ια΄ θεωρήματος. ἀναγράψας γὰρ τὸ ἀπο *ΑΕ* καὶ παρὰ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ τῷ *ΑΕΔ* τριγώνῳ ἴσον παραβαλὼν ἕξω τὸ ζητούμενον.

3. οὕτω p. 4. Ante ἐναλλάξ ins. καί comp. W. 5. τό] τὸ ἀπό Wp, corr. Comm. οὕτω p. 6. ἐστι] comp. p,

$AE$, $\Gamma B$ parallelae sunt, et $\Gamma E$, $AB$ eas iungunt; et [Eucl. VI, 1] $MA : AZ = AMNB : A\Xi$, erit

$$\Gamma B^2 : \Gamma\Delta B = AMNB : AZ\Xi B.$$

permutando $\Gamma B^2 : AMNB = \Gamma\Delta B : AZ\Xi B$. est autem $ZAB\Xi = \Gamma B\Delta$; quoniam enim $\Gamma HK = \Lambda AH\Delta$, commune autem quadrilaterum $H\Delta BK$, erit

$$\Lambda ABK = \Gamma\Delta B;$$

est autem $\Lambda ABK = ZAB\Xi$ [Eucl. I, 35]; nam in eadem basi $AB$ et in iisdem parallelis $AB$, $ZK$ posita sunt; ergo $\Gamma\Delta B = \Xi ZAB$. quare etiam $\Gamma B^2 = AMNB$. uerum $MABN = MA \times AB$; $MA$ enim ad $AB$ perpendicularis est; itaque $MA \times AB = \Gamma B^2$. et $MA$ latus rectum est figurae, $AB$ autem diametrus, et $\Gamma B$ ordinate ducta; nam rectae $AE$ parallela est; ergo punctum $\Gamma$ ad sectionem positum est [prop. XI]. ergo $\Delta H\Gamma$ cum sectione in $\Gamma$ concurrit; quod erat demonstrandum.

## Ad propositionem propositam scholia.

Fiat igitur $MA : AZ = AE^2 : AE\Delta$ p. 238, 18—19] hoc in scholio propositionis XI demonstratum est [u. supra p. 216]. descripto enim quadrato $AE^2$ et ad latus eius spatio adplicato triangulo $AE\Delta$ aequali habebo, quod quaerimus.

---

ἐστιν W. 7. $ZAB\Xi$] e corr. p, mut. in $\Xi ABZ$ m. rec. W. 8. $\Lambda AH\Delta$] Halley, $\Lambda A\Delta H$ Wp. 9. $\Lambda ABK$] $\Lambda AB$ Wp, corr. Comm. 11. παραλληλογράμμῳ] comp. p, παραλληλόγραμμον W. 12. ἐστιν W. $AB$] p, $A\Delta$ W. 13. $ZK$] p, $ZH$ W. 14. ἐστίν W. 17. ἐστι] ἐστιν W. 18. ἐστίν W. 20. ἐστιν W. 24. τό (alt.)] τὸ ἀπό Wp, corr. Comm. 26. ια′] e corr. p. γάρ] om. p. 27. τῷ] p, τό W. 28. παραραβαλών W.

εἰς τὸ αὐτό.

τετραπλεύρου ὄντος τοῦ $ΛΑΔΗ$ ἤχθω τῇ $ΛΑ$ παράλληλος ἡ $ΓΚΒ$ ἀποτέμνουσα τὸ $ΓΗΚ$ τρίγωνον τῷ $ΛΑΔΗ$ τετραπλεύρῳ ἴσον] τοῦτο δὲ ποιήσομεν οὕτως· ἐὰν γάρ, ὡς ἐν τοῖς στοιχείοις ἐμάθομεν, τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ τῷ $ΛΑΔΗ$ τετραπλεύρῳ ἴσον καὶ ἄλλῳ τῷ δοθέντι τῷ $ΑΕΔ$ τριγώνῳ ὅμοιον τὸ αὐτὸ συστησώμεθα τὸ $ΣΤΥ$, ὥστε ὁμόλογον εἶναι τὴν $ΣΥ$ τῇ $ΑΔ$, καὶ ἀπολάβωμεν τῇ μὲν $ΣΥ$ ἴσην τὴν $ΗΚ$, τῇ δὲ $ΤΥ$ ἴσην τὴν $ΗΓ$, καὶ ἐπιζεύξωμεν τὴν $ΓΚ$, ἔσται τὸ ζητούμενον. ἐπεὶ γὰρ ἡ πρὸς τῷ $Υ$ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ $Δ$, τουτέστι τῇ $Η$, διὰ τοῦτο ἴσον καὶ ὅμοιον τὸ $ΓΗΚ$ τῷ $ΣΤΥ$. καὶ ἴση ἡ $Γ$ γωνία τῇ $Ε$, καί εἰσιν ἐναλλάξ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΚ$ τῇ $ΑΕ$.

φανερὸν δή, ὅτι, ὅταν ἡ $ΑΒ$ ἄξων ἐστίν, ἡ $ΜΑ$ ἐφάπτεται τῆς τομῆς, ὅταν δὲ μὴ ἄξων, τέμνει, εἰ πρὸς ὀρθὰς ἄγεται πάντως τῇ διαμέτρῳ.

Εἰς τὸ κη'.

Ὅτι, κἂν ἡ $ΓΔ$ τέμνῃ τὴν ὑπερβολήν, τὰ αὐτὰ συμβήσεται, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ὀκτωκαιδεκάτου.

Εἰς τὸ λ'.


Καὶ ὡς ἄρα ἐπὶ μὲν τῆς ἐλλείψεως συνθέντι, ἐπὶ δὲ τῶν ἀντικειμένων ἀνάπαλιν καὶ ἀνα-

---

5. στοιχείοις] w, στυχίοις e corr. W, σχολίοις p. 6. τῷ (pr.)] ἐν τῷ Wp, corr. Comm. 7. $ΑΘΔ$ p. 8. τὸ αὐτό] τῷ αὐτῷ Wp, corr. Halley. συστησώμεθα] scripsi, συστησόμεθα Wp. 9. $ΕΤ$ p. τῇ (alt.)] τήν Wp, corr. Comm. $ΕΤ$ p. 10. τήν] τῇ Wp, corr. Comm. Post $ΗΚ$ del. τὴν δὲ $\overline{τυ}$

## Ad eandem.

Cum $\Lambda A \Delta H$ quadrilaterum sit, ducatur rectae $\Lambda A$ parallela $\Gamma K B$ triangulum $\Gamma H K$ abscindens quadrilatero $\Lambda A \Delta H$ aequalem p. 238, 21—24] hoc uero ita efficiemus. si enim, ut in Elementis [VI, 25] didicimus, datae figurae rectilineae, quadrilatero $\Lambda A \Delta H$, aequalem et alii figurae datae, triangulo $A E \Delta$, similem eandem figuram construxerimus $\Sigma T \Upsilon$, ita ut $\Sigma \Upsilon$ lateri $A \Delta$ respondeat,




et posuerimus $HK = \Sigma \Upsilon$, $H\Gamma = T\Upsilon$, et duxerimus $\Gamma K$, effectum erit, quod quaerimus. quoniam enim $\angle \Upsilon = \Delta = H$, erit $\Gamma H K \simeq \Sigma T \Upsilon$ [Eucl. I, 4]. et $\angle \Gamma = E$, et alterni sunt; itaque [Eucl. I, 27] $\Gamma K$, $AE$ parallelae sunt.

manifestum igitur, si $AB$ axis sit, rectam $MA$ sectionem contingere, sin non axis, secare, si quidem semper ad diametrum perpendicularis ducitur.

## Ad prop. XXVIII.

Etiamsi $\Gamma \Delta$ hyperbolam secat, eadem adcident, sicut in prop. XVIII [u. supra p. 230, 19].

## Ad prop. XXX.

Quare etiam, in ellipsi componendo, in oppositis autem e contrario et conuertendo

---

ἴσην τὴν τῇ $\overline{\eta\kappa}$ p. τῇ] τήν Wp, corr. Halley. τήν] W, τῇ? p. 12. τῷ] p, corr. ex τό W ἐστίν W. τουτέστιν W. 14. Γ] ΑΓ Wp, corr. Comm. 16. δή] δέ Halley cum Comm. 17. εἰ] scripsi, om. Wp. 23. ἐλλίψεως W.

*στρέψαντι*] ἐπὶ μὲν οὖν τῆς ἐλλείψεως ἐροῦμεν· ἐπειδή ἐστιν, ὡς τὸ ὑπὸ *ΑΖΒ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΔΖ*, τὸ ὑπὸ *ΑΗΒ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΗΕ*, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ *ΔΖ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΖΓ*, τὸ ἀπὸ *ΕΗ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΗΓ*, δι' ἴσου, ὡς τὸ ὑπὸ *ΑΖΒ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΖΓ*, τὸ ὑπὸ *ΑΗΒ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΗΓ*· συνθέντι, ὡς τὸ ὑπὸ *ΑΖΒ* μετὰ τοῦ ἀπὸ *ΖΓ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΖΓ*, τουτέστι τὸ ἀπὸ *ΑΓ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓΖ*· ἡ γὰρ *ΑΒ* τέτμηται εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ *Γ*, εἰς δὲ ἄνισα κατὰ τὸ *Ζ*· οὕτως τὸ ἀπὸ *ΓΒ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓΗ*· καὶ ἐναλλάξ, ὡς τὸ ἀπὸ *ΑΓ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓΒ*, τὸ ἀπὸ *ΖΓ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓΗ*. ἐπὶ δὲ τῶν ἀντικειμένων· ἐπεί ἐστιν, ὡς τὸ ὑπὸ *ΒΖΑ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΖΓ*, τὸ ὑπὸ *ΑΗΒ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓΗ*, διότι δι' ἴσου, ἀνάπαλιν, ὡς τὸ ἀπὸ *ΖΓ* πρὸς τὸ ὑπὸ *ΒΖΑ*, τὸ ἀπὸ *ΓΗ* πρὸς τὸ ὑπὸ *ΑΗΒ*· ἀναστρέψαντι, ὡς τὸ ἀπο *ΖΓ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓΑ*, τὸ ἀπὸ *ΗΓ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓΒ*· εὐθεῖα γάρ τις ἡ *ΑΒ* τέτμηται δίχα κατὰ τὸ *Γ*, καὶ πρόσκειται ἡ *ΖΑ*, καὶ τὸ ὑπὸ *ΒΖΑ* μετὰ τοῦ ἀπὸ *ΑΓ* ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ *ΓΖ*, ὥστε τὸ ἀπὸ *ΓΖ* τοῦ ὑπὸ *ΒΖΑ* ὑπερέχει τῷ ἀπὸ *ΑΓ*, καὶ καλῶς εἴρηται τὸ ἀναστρέψαντι.

## Εἰς τὸ λα'.

*Διελόντι τὸ ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΗΒ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΘΒ*] ἐπεὶ γὰρ εὐθεῖα ἡ *ΑΒ* τέτμηται δίχα κατὰ τὸ *Γ*, καὶ πρόσκειται αὐτῇ ἡ *ΒΗ*, τὸ ὑπὸ *ΑΗΒ* μετὰ τοῦ ἀπὸ *ΓΒ* ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ *ΓΗ*· ὥστε τὸ ἀπὸ *ΓΗ* τοῦ ὑπὸ *ΑΗΒ* ὑπερέχει τῷ ἀπὸ *ΓΒ*. διὰ δὲ τὴν

2. *ΖΔ* p. 3. Ante *ΔΖ* ras. 1 litt. p. 7. *ΖΓ* (pr.)] in ras. W. τουτέστιν W. 9. οὕτω p. 10. *ΑΓ* — 11.

I p. 92, 9—10] in ellipsi igitur dicemus: quoniam est

$$AZ \times ZB : \Delta Z^2 = AH \times HB : HE^2$$ [I p. 92, 2]

et

$$\Delta Z^2 : Z\Gamma^2 = EH^2 : H\Gamma^2,$$

ex aequo erit

$$AZ \times ZB : Z\Gamma^2 = AH \times HB : H\Gamma^2.$$

componendo $AZ \times ZB + Z\Gamma^2 : Z\Gamma^2$ (h. e. $A\Gamma^2 : \Gamma Z^2$ [Eucl. II, 5]; nam $AB$ in $\Gamma$ in partes aequales, in $Z$ autem in inaequales secta est) $= \Gamma B^2 : \Gamma H^2$; et permutando $A\Gamma^2 : \Gamma B^2 = Z\Gamma^2 : \Gamma H^2$. in oppositis uero ita: quoniam est $BZ \times ZA : Z\Gamma^2 = AH \times HB : \Gamma H^2$, quia ex aequo sunt, e contrario erit

$$Z\Gamma^2 : BZ \times ZA = \Gamma H^2 : AH \times HB.$$

conuertendo $Z\Gamma^2 : \Gamma A^2 = H\Gamma^2 : \Gamma B^2$; nam recta aliqua $AB$ in $\Gamma$ in duas partes aequales secta est, et adiecta est $ZA$, et $BZ \times ZA + A\Gamma^2 = \Gamma Z^2$ [Eucl. II, 6], quare $\Gamma Z^2 \div BZ \times ZA = A\Gamma^2$, et recte dictum est conuertendo.

## Ad prop. XXXI.

Dirimendo $\Gamma B^2 : AH \times HB > \Gamma B^2 : A\Theta \times \Theta B$ I p. 94, 13—15] quoniam enim recta $AB$ in $\Gamma$ in duas partes aequales secta est, et ei adiecta est $BH$, erit [Eucl. II, 6] $AH \times HB + \Gamma B^2 = \Gamma H^2$; quare $\Gamma H^2 \div AH \times HB = \Gamma B^2$. eadem autem de causa

---

ἀπό (pr.)] om. W, lac. p; corr. Comm. 13. ἀπό (pr.)] om. W, lac. p; corr. Comm. 19. ἐστίν W. 26. $AHB$] $AHK$ Wp, corr. Comm. 27. ἐστίν W.

αὐτὴν αἰτίαν καὶ τὸ ἀπὸ ΓΘ τοῦ ὑπὸ ΑΘΒ ὑπερέχει τῷ ἀπὸ ΓΒ· ὥστε ὀρθῶς εἴρηται τὸ διελόντι.

## Εἰς τὸ λβ'.

Ἐν τῷ ἑπτακαιδεκάτῳ θεωρήματι ἁπλούστερον ἔδειξεν, ὅτι ἡ διὰ τῆς κορυφῆς παρὰ τὴν κατηγμένην τεταγμένως ἀγομένη ἐφάπτεται, ἐνταῦθα δὲ τὸ ἐν τοῖς στοιχείοις ἐπὶ τοῦ κύκλου μόνου δεδειγμένον καθολικώτερον ἐπὶ πάσης κώνου τομῆς ὑπάρχον ἐπιδείκνυσι.
δεῖ μέντοι ἐπιστῆσαι, ὅπερ κἀκεῖ ἐδείχθη, ὅτι καμπύλην μὲν ἴσως γραμμὴν οὐδὲν ἄτοπόν ἐστιν ἐμπίπτειν μεταξὺ τῆς εὐθείας καὶ τῆς τομῆς, εὐθεῖαν δὲ ἀμήχανον· τεμεῖ γὰρ αὕτη τὴν τομὴν καὶ οὐκ ἐφάψεται· δύο γὰρ ἐφαπτομένας εὐθείας κατὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου εἶναι ἀδύνατον.

πολυτρόπως δεδειγμένου τούτου τοῦ θεωρήματος ἐν διαφόροις ἐκδόσεσιν ἡμεῖς τὴν ἀπόδειξιν ἁπλουστέραν καὶ σαφεστέραν ἐποιήσαμεν.

## Εἰς τὸ λδ'.

Δεῖ ἐπιστῆσαι, ὅτι ἡ ΓΔ κατηγμένη ἐπὶ τὴν διάμετρον ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς τὰς ΔΒ, ΔΑ ὁρίζουσα τὴν ΒΑ καταλιμπάνει ὀφείλουσαν τμηθῆναι εἰς τὸν τῶν ΒΔΑ λόγον, ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως καὶ τοῦ κύκλου ἀνάπαλιν τὴν ΒΑ τέμνουσα εἰς ὡρισμένον λόγον τὸν τῶν ΒΔΑ ἐπιζητεῖν ἡμᾶς ποιεῖ τὸν τῶν ΒΕ, ΕΑ· οὐδὲν γὰρ δυσχερὲς λόγου δοθέντος ἴσον αὐτῷ πορίσασθαι.

---

2. τό] τῷ W. 6. τό] om. p. τοῖς] comp. p, τοῖ W. 7. μόνον p. 9. ⊕ mg. W. 10. ἄτοπόν] corr. ex ἄτω-

etiam $\Gamma\Theta^2 \div A\Theta \times \Theta B = \Gamma B^2$. ergo recte dictum est dirimendo.

## Ad prop. XXXII.

In prop. XVII simplicius demonstrauit, rectam per uerticem rectae ordinate ductae parallelam ductam contingere, hic uero, quod in Elementis [III, 16] de solo circulo demonstratum est, uniuersalius de omni coni sectione ualere ostendit.

animaduertendum uero, quod ibi quoque [Eucl. III, 16] demonstratum est, fortasse fieri posse, ut curua linea inter rectam sectionemque cadat, ut recta autem sic cadat, fieri non posse; ea enim sectionem secabit, non continget; neque enim fieri potest, ut in eodem puncto duae rectae contingant.

cum haec propositio in uariis editionibus multis modis demonstraretur, nos demonstrationem simpliciorem et clariorem fecimus.

## Ad prop. XXXIV.

Animaduertendum, rectam $\Gamma\Delta$ ad diametrum ordinate ductam in hyperbola rectas $\Delta B$, $\Delta A$ determinantem rectam $BA$ relinquere secundum rationem $B\Delta : \Delta A$ secandam, in ellipsi autem circuloque rursus rectam $BA$ secundum rationem determinatam $B\Delta : \Delta A$ secantem nobis rationem $BE : EA$ quaerendam relinquere; neque enim difficile est, data ratione aliam aequalem parare.

---

πον W. 12. τέμει W. 16. ἀπόδειξιν] addidi, om. Wp. 19. δεῖ] e corr. p. 24. τόν (pr.)] corr. ex τῶν p. ἐπιζητεῖν] corr. ex ἐπιζητῶν? p.

δεῖ μέντοι εἰδέναι, ὅτι καθ' ἑκάστην τομὴν καταγραφαί εἰσι δύο τοῦ Z σημείου ἢ ἐσωτέρω τοῦ Γ λαμβανομένου ἢ ἐξωτέρω· ὥστε εἶναι τὰς πάσας πτώσεις ἕξ.

χρῆται δὲ καὶ δύο λήμμασιν, ἅπερ ἑξῆς γράψομεν.

μεῖζον ἄρα τὸ ὑπὸ *ANΞ* τοῦ ὑπὸ *AOΞ*· ἡ *NO* ἄρα πρὸς *ΞO* μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ *OA* πρὸς *AN*] ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ *AN*, *NΞ* μεῖζόν ἐστι τοῦ ὑπὸ *AO*, *OΞ*, γινέσθω τῷ ὑπὸ *AN*, *NΞ* ἴσον τὸ ὑπὸ τῆς *AO* καὶ ἄλλης τινὸς τῆς *ΞΠ*, ἥτις μείζων ἔσται τῆς *ΞO*· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ *OA* πρὸς *AN*, ἡ *NΞ* πρὸς *ΞΠ*. ἡ δὲ *NΞ* πρὸς *ΞO* μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ πρὸς τὴν *ΞΠ*· καὶ ἡ *OA* ἄρα πρὸς *AN* ἐλάττονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ *NΞ* πρὸς *ΞO*.

φανερὸν δὴ καὶ τὸ ἀνάπαλιν, ὅτι, κἂν ἡ *NΞ* πρὸς *ΞO* μείζονα λόγον ἔχῃ ἤπερ ἡ *OA* πρὸς *AN*, τὸ ὑπὸ *ΞN*, *NA* μεῖζόν ἐστι τοῦ ὑπὸ *AO*, *OΞ*.

γινέσθω γάρ, ὡς ἡ *OA* πρὸς *AN*, οὕτως ἡ *NΞ* πρὸς μείζονα δηλονότι τῆς *ΞO* ὡς τὴν *ΞΠ*· τὸ ἄρα ὑπὸ *ΞN*, *NA* ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ *AO*, *ΞΠ*· ὥστε μεῖζόν ἐστι τὸ ὑπὸ *ΞN*, *NA* τοῦ ὑπὸ *AO*, *OΞ*.

εἰς τὸ αὐτό.

ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ὑπὸ *BK*, *AN* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓE*, τὸ ὑπὸ *BΔA* πρὸς τὸ ἀπὸ *EΔ*] ἐπεὶ οὖν διὰ


---

2. εἰσιν W. ἐσωτέρω] p, ἐσωτέρου W. 5. δύο] δυσί p. 6—8. ⸏ mg. W. 6. τό] τοῦ W, τ p, corr. Comm. *ANΞ*] Comm., *AHΞ* Wp. τδῦ] τ seq. lac. 2 litt. p. 8. *OA*] corr. ex *ΘA* W. τό] τοῦ Wp, corr. Comm. 9. ἐστιν W. τοῦ] τ seq. lac. p. 12. *ΞO*] corr. ex *ΞΘ* W. 13. ἄρα] om. Wp, corr. Comm. 14. ἐλάττονα] μείζονα Wp, corr. Comm. 15. δή] e corr. p. 16. ἔχῃ] Halley, ἔχει Wp. 17. ἐστιν W.

sciendum autem, in singulis sectionibus binas figuras esse, prout punctum $Z$ intra $\Gamma$ aut extra $\Gamma$ sumatur; quare omnino sex sunt casus.

utitur autem duobus lemmatis, quae iam infra perscribemus.

quare $A N \times N \Xi > A O \times O \Xi$; itaque
$$N \Xi : \Xi O > O A : A N$$ I p. 102, 24—26]
quoniam enim $A N \times N \Xi > A O \times O \Xi$, fiat
$$A O \times \Xi \Pi = A N \times N \Xi,$$
$\Xi \Pi$ maiore sumpta quam $\Xi O$; itaque
$$O A : A N = N \Xi : \Xi \Pi.$$
uerum $N \Xi : \Xi O > N \Xi : \Xi \Pi$ [Eucl. V, 8]; ergo etiam $O A : A N < N \Xi : \Xi O$.[1])




manifestum iam rursus, si
$$N \Xi : \Xi O > O A : A N,$$
esse $\Xi N \times N A > A O \times O \Xi$.

fiat enim $N \Xi : \Xi \Pi = O A : A N$, $\Xi \Pi$ sumpta maiore quam $\Xi O$ [Eucl. V, 8]. itaque $\Xi N \times N A = A O \times \Xi \Pi$. ergo $\Xi N \times N A > A O \times O \Xi$.

## Ad eandem.

Est autem $B K \times A N : \Gamma E^2 = B \Delta \times \Delta A : E \Delta^2$ I p. 104, 2—4] quoniam, quia $A N$, $E \Gamma$, $K B$ parallelae

---

1) Cum coniectura Commandini lin. 14 parum sit probabilis, nec alia melior reperiri possit, crediderim, Eutocium ipsum errore μείζονα scripsisse.

---

In fig. pro $O$ bis $\Theta$ W, om. p.

---

20. ΞΠ· ὥστε] scripsi; ξ̄ πῶς τέ Wp. 21. ἐστιν W. ΟΞ] Ο e corr. W. 23. τὸ ἀπὸ ΓΕ] p, τὸν ᾱε̄γ̄ W. 24. οὖν] γάρ?

τὸ παραλλήλους εἶναι τὰς $AN$, $E\Gamma$, $KB$ ἐστιν, ὡς ἡ $AN$ πρὸς $E\Gamma$, ἡ $A\varDelta$ πρὸς $\varDelta E$, ὡς δὲ ἡ $E\Gamma$ πρὸς $KB$, ἡ $E\varDelta$ πρὸς $\varDelta B$, δι' ἴσου ἄρα, ὡς ἡ $AN$ πρὸς $KB$, ἡ $A\varDelta$ πρὸς $\varDelta B$· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ $AN$ πρὸς τὸ ὑπὸ $AN$, $KB$, τὸ ἀπὸ $A\varDelta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A\varDelta B$. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ $E\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $AN$, τὸ ἀπὸ $E\varDelta$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\varDelta A$· δι' ἴσου ἄρα, ὡς τὸ ἀπὸ $E\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ $AN$, $KB$, τὸ ἀπὸ $E\varDelta$ πρὸς τὸ ὑπὸ $A\varDelta B$· καὶ ἀνάπαλιν, ὡς τὸ ὑπὸ $KB$, $AN$ πρὸς τὸ ἀπὸ $E\Gamma$, τὸ ὑπὸ $B\varDelta A$ πρὸς τὸ ἀπὸ $E\varDelta$.

## Εἰς τὸ λζ'.

Διὰ τούτων τῶν θεωρημάτων φανερόν, ὅπως ἐστὶ δυνατὸν διὰ τοῦ δοθέντος σημείου ἐπὶ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς κορυφῆς τῆς τομῆς ἐφαπτομένην ἀγαγεῖν.

## Εἰς τὸ λη'.

Ἔν τισιν ἀντιγράφοις τὸ θεώρημα τοῦτο ἐπὶ μόνης τῆς ὑπερβολῆς εὑρίσκεται δεδειγμένον, καθολικῶς δὲ ἐνταῦθα δέδεικται· τὰ γὰρ αὐτὰ συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τομῶν. καὶ τῷ Ἀπολλωνίῳ δὲ δοκεῖ μὴ μόνον τὴν ὑπερβολήν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔλλειψιν ἔχειν δευτέραν διάμετρον, ὡς πολλάκις αὐτοῦ ἠκούσαμεν ἐν τοῖς προλαβοῦσιν.

καὶ ἐπὶ μὲν τῆς ἐλλείψεως πτῶσιν οὐκ ἔχει, ἐπὶ δὲ τῆς ὑπερβολῆς τρεῖς· τὸ γὰρ $Z$ σημεῖον, καθ' ὃ συμβάλλει ἡ ἐφαπτομένη τῇ δευτέρᾳ διαμέτρῳ, ἢ κατω-

3. πρός (pr.)] bis p. 5. ὑπό (pr.)] ἀπό Wp, corr. Comm. $AN$] $AH$? p. Post πρός del. $\varDelta B$ καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ $AN$ p. 8. ὑπό (alt.)] corr. ex ἀπό W. $A\varDelta B$] $A$ e corr. W.

sunt, est $AN : E\Gamma = A\varDelta : \varDelta E$, $E\Gamma : KB = E\varDelta : \varDelta B$ [Eucl. I, 29; VI, 4], ex aequo erit $AN : KB = A\varDelta : \varDelta B$; quare $AN^2 : AN \times KB = A\varDelta^2 : A\varDelta \times \varDelta B$. est autem [Eucl. VI, 4] $E\Gamma^2 : AN^2 = E\varDelta^2 : \varDelta A^2$; ex aequo igitur $E\Gamma^2 : AN \times KB = E\varDelta^2 : A\varDelta \times \varDelta B$; et e contrario $KB \times AN : E\Gamma^2 = B\varDelta \times \varDelta A : E\varDelta^2$.

## Ad prop. XXXVII.

Per haec theoremata[1]) manifestum est, quo modo fieri possit, ut per datum punctum diametri[2]) et per uerticem[3]) sectionis recta contingens ducatur.

## Ad prop. XXXVIII.

In nonnullis codicibus haec propositio de sola hyperbola demonstrata reperitur, hic autem uniuersaliter demonstrata est; nam eadem etiam in reliquis sectionibus adcidunt. et Apollonio quoque non modo hyperbola, sed etiam ellipsis alteram diametrum habere uidetur, sicut in praecedentibus saepius ab eo audiuimus.

et in ellipsi casum non habet, in hyperbola autem tres; nam punctum $Z$, in quo recta contingens cum altera diametro concurrit, aut infra $\varDelta$ positum est aut in $\varDelta$ aut supra $\varDelta$, et ea de causa $\Theta$ et ipsum tres habebit positiones,

1) Propp. XXXVII—VIII; cfr. I p. 118, 1 sq.
2) Per aequationem $ZH \times H\Theta = H\Gamma^2$, unde datis rectis $ZH$, $H\Gamma$ inueniri potest $H\Theta$ et ita $E$.
3) Per aequationem $H\Theta \times \Theta Z : \Theta E =$ latus rectum: transuersum, unde dato uertice $E$ et ideo datis $E\Theta$ et $H\Theta$ inueniri potest $\Theta Z$ et punctum $Z$.

10. $B\varDelta A$] $A$ e corr. p. 17. εὐρί-] e corr. p. 25. κατωτέρωι W, ut saepius.

τέρω τοῦ Δ ἐστιν ἢ ἐπὶ τοῦ Δ ἢ ἀνωτέρω τοῦ Δ, καὶ διὰ τοῦτο τὸ Θ ὁμοίως αὐτῷ τρεῖς ἕξει τόπους, καὶ προσεκτέον, ὅτι, εἴτε κατωτέρω πέσῃ τὸ Ζ τοῦ Δ, καὶ τὸ Θ τοῦ Γ ἔσται κατωτέρω, εἴτε τὸ Ζ ἐπὶ τὸ Δ, καὶ τὸ Θ ἐπὶ τὸ Γ, εἴτε ἀνωτέρω τὸ Ζ τοῦ Δ, καὶ τὸ Θ τοῦ Γ ἔσται ἀνωτέρω.

## Εἰς τὸ μα'.

Τὸ θεώρημα τοῦτο ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς πτῶσιν οὐκ ἔχει, ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως, ἐὰν ἡ καταγομένη ἐπὶ τὸ κέντρον πίπτῃ, τὰ δὲ λοιπὰ γένηται τὰ αὐτά, τὸ ἀπὸ τῆς κατηγμένης εἶδος ἴσον ἔσται τῷ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου εἴδει.

ἔστω γὰρ ἔλλειψις, ἧς διάμετρος ἡ ΑΒ, κέντρον τὸ Δ, καὶ κατήχθω τεταγμένως ἡ ΓΔ, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπό τε τῆς ΓΔ καὶ τῆς ΑΔ εἴδη ἰσογώνια τὰ ΑΖ, ΔΗ, ἐχέτω δὲ ἡ ΔΓ πρὸς ΓΗ τὸν συγκείμενον λόγον ἔκ τε τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΑΔ πρὸς ΔΖ καὶ τοῦ ὃν ἔχει ἡ ὀρθία πρὸς τὴν πλαγίαν.

λέγω, ὅτι τὸ ΑΖ ἴσον ἐστὶ τῷ ΔΗ.

ἐπεὶ γὰρ ἐν τῷ ῥητῷ δέδεικται, ὡς τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ΑΖ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΔΒ πρὸς τὸ ΔΗ, φημί, ὅτι καὶ ἐναλλάξ, ὡς τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΔΒ, οὕτως τὸ ΑΖ πρὸς τὸ ΔΗ. ἴσον δὲ τὸ ἀπὸ ΑΔ τῷ ὑπὸ ΑΔΒ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ΑΖ τῷ ΔΗ.

## Εἰς τὸ μβ'.

Τὸ θεώρημα τοῦτο ἔχει πτώσεις $\overline{\iota\alpha}$, μίαν μέν, εἰ ἐσωτέρω λαμβάνοιτο τὸ Δ τοῦ Γ· δῆλον γάρ, ὅτι καὶ


6. ἀνωτέρω] corr. ex ἀνοτέρω W. 10. πίπτῃ, τά] in ras. W. 13. διάμετρος] corr. ex διάμετρον W, comp. p. κέντρον δέ Halley. 16. ΔΗ, ΑΖ Comm. 18. ὅν] in

et animaduertendum est, siue $Z$ infra $\Delta$ cadat, etiam $\Theta$ infra $\Gamma$ positum esse, siue in $\Delta$ cadat $Z$, etiam $\Theta$ in $\Gamma$, siue $Z$ supra $\Delta$, etiam $\Theta$ supra $\Gamma$ positum esse.[1])

## Ad prop. XLI.

Haec propositio in hyperbola casum non habet, in ellipsi autem, si recta ordinate ducta in centrum cadit, reliqua autem eadem fiunt, figura in recta ordinate ducta descripta aequalis erit figurae in radio descriptae.

sit enim ellipsis, cuius diametrus sit $AB$, centrum $\Delta$, et ordinate ducatur $\Gamma\Delta$, describanturque et in $\Gamma\Delta$ et in $A\Delta$ figurae aequiangulae $AZ, \Delta H$, habeat autem $\Delta\Gamma : \Gamma H$ rationem compositam ex ratione $A\Delta : \Delta Z$ et ea, quam habet latus rectum ad transuersum.




dico, esse $AZ = \Delta H$.

nam quoniam in uerbis Apollonii [I p. 126, 7—8] demonstratum est, esse $A\Delta^2 : AZ = A\Delta \times \Delta B : \Delta H$, dico, etiam permutando esse

$$A\Delta^2 : A\Delta \times \Delta B = AZ : \Delta H.$$

uerum $A\Delta^2 = A\Delta \times \Delta B$; ergo etiam $AZ = \Delta H$.

## Ad prop. XLII.

Haec propositio XI casus habet, unum, si $\Delta$ intra $\Gamma$ sumitur; manifestum enim, etiam parallelas intra

1) Quia $ZH : H\Gamma = H\Gamma : H\Theta$ et $H\Gamma = H\Delta$.

ras. W. 19. ἐστίν W. 21. οὕτω p. 23. οὕτω p. τὸ ΔH. ἴσον δέ] bis W. 24. AZ] ΔZ Wp, corr. Comm.

αἱ παράλληλοι ἐσωτέρω πεσοῦνται τῶν $ΑΓΘ$. ἑτέρας δὲ πέντε οὕτως· ἐὰν τὸ $Δ$ ἐξωτέρω ληφθῇ τοῦ $Γ$, ἡ μὲν $ΔΖ$ παράλληλος δηλονότι ἐξωτέρω πεσεῖται τῆς $ΘΓ$, ἡ δὲ $ΔΕ$ ἢ μεταξὺ τῶν $Α$, $Β$ ἢ ἐπὶ τὸ $Β$ ἢ μεταξὺ τῶν $Β$, $Θ$ ἢ ἐπὶ τὸ $Θ$ ἢ ἐξωτέρω τοῦ $Θ$· τοῦ γὰρ $Α$ ἐξωτέρω πεσεῖν αὐτὴν ἀδύνατον, ἐπειδὴ τὸ $Δ$ ἐξωτέρω ἐστὶ τοῦ $Γ$ καὶ δηλονότι καὶ ἡ δι' αὐτοῦ παράλληλος ἀγομένη τῇ $ΑΓ$. ἐὰν δὲ τὸ $Δ$ ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη ληφθῇ τῆς τομῆς, ἢ ἀμφότεραι αἱ παράλληλοι μεταξὺ τῶν $Θ$, $Β$ περατωθήσονται, ἢ ἡ μὲν $ΔΖ$ ἐσωτέρω τοῦ $Θ$, τὸ δὲ $Ε$ ἐπὶ τὸ $Θ$, ἢ τῆς $ΔΖ$ ὡσαύτως μενούσης τὸ $Ε$ ἐξωτέρω τοῦ $Θ$ ἐλεύσεται· τοῦ δὲ $Ε$ πάλιν ἐξωτέρω πίπτοντος τὸ $Ζ$ ἢ ἐπὶ τὸ $Θ$ πεσεῖται, ὡς εἶναι τὴν $ΓΘΔ$ μίαν εὐθεῖαν, εἰ καὶ μὴ σώζεται κυρίως τότε τὸ τῆς παραλλήλου ἰδίωμα, ἢ ἐξωτέρω τοῦ $Θ$. δεῖ δὲ ἐπὶ τῆς ἀποδείξεως τῶν τελευταίων πέντε πτώσεων τὴν $ΔΖ$ ἐκβάλλειν ἕως τῆς τομῆς καὶ τῆς $ΗΓ$ παραλλήλου καὶ οὕτως ποιεῖσθαι τὴν ἀπόδειξιν.

δυνατὸν δὲ καὶ ἄλλην μίαν καταγραφὴν ἐπινοεῖν ἐκ τούτων, ὅταν δὴ λαμβανομένου ἑτέρου σημείου αἱ ἐξ ἀρχῆς εὐθεῖαι ποιῶσι τὸ λεγόμενον, ἀλλὰ τοῦτο θεώρημα μᾶλλόν ἐστιν ἢ πτῶσις.

## Εἰς τὸ μγ΄.

Ἔν τισι φέρεται ἀπόδειξις τοῦ θεωρήματος τούτου τοιαύτη·

---

1. αἱ] addidi, om. Wp. 2. οὕτω p. 5. τό] τῷ W. 7. ἐξωτέρω] Halley, ἐσωτέρω Wp. ἐστίν W. 8. ἐάν] p, ἐν W. 10. ἤ] om. Wp, corr. Comm. 11. $Ε$] om. Wp, corr. Comm. $ΔΖ$] $Δ$ e corr. W. 18. οὕτω p. ἀπόδειξιν] corr. ex

$\varDelta\Gamma$, $\Gamma\Theta$ cadere; alios autem quinque hoc modo: si $\varDelta$ extra $\Gamma$ sumitur, parallela $\varDelta Z$, ut adparet, extra $\Theta\Gamma$ cadet, $\varDelta E$ autem aut inter $A$, $B$ cadet aut in $B$ aut inter $B$, $\Theta$ aut in $\Theta$ aut extra $\Theta$; neque enim fieri potest, ut extra $A$ cadat, quoniam $\varDelta$ extra $\Gamma$ positum est et, ut adparet, etiam recta per id rectae $A\Gamma$ parallela ducta. sin $\varDelta$ ad alteram partem sectionis sumitur, aut utraque parallela inter $\Theta$, $B$ terminabitur, aut $\varDelta Z$ intra $\Theta$, $E$ autem in $\Theta$, aut $\varDelta Z$ in eadem positione manente $E$ extra $\Theta$ cadet; rursus puncto $E$ extra $\Theta$ cadente $Z$ aut in $\Theta$ cadet, ita ut $\Gamma\Theta\varDelta$ una sit recta, quamquam ita proprietas parallelae non prorsus seruatur, aut extra $\Theta$. oportet autem in quinque ultimis casibus demonstrandis rectam $\varDelta Z$ usque ad sectionem parallelamque $H\Gamma$ producere et ita demum demonstrationem perficere.

fieri autem potest, ut ex his alia quaedam figura fingatur, ubi scilicet sumpto alio puncto rectae ab initio sumptae efficiant[1]), quod quaerimus; sed haec propositio est potius quam casus.

## Ad prop. XLIII.

In nonnullis codicibus demonstratio huius propositionis haec fertur:

---

1) Haec non satis intellego. fortasse scr. lin. 21 δὴ μή, ita ut significetur propositio $A\Theta\Gamma = B\Gamma$; cfr. infra p. 258, 19 sq.

---

ἀπόδειξιν W. 22. ποιῶσιν W. τοῦτο] τοῦτο τό Wp, corr. Halley. 23. μᾶλλόν] scripsi, ἔστω Wp (permutatis λλ et ω), om. Comm. ἤ] scripsi, ἡ Wp, οὐ Comm. 25. τισιν W.

ἐπεὶ γὰρ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΖΓΔ τῷ ἀπὸ ΓΒ, ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΖΓ πρὸς ΓΒ, ἡ ΓΒ πρὸς ΓΔ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΒ εἶδος, οὕτως ἡ ΖΓ πρὸς τὴν ΓΔ. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ἀπὸ ΖΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ, τὸ ΕΖΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΛΓΒ τρίγωνον, ὡς δὲ ἡ ΖΓ πρὸς ΓΔ, τὸ ΕΖΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΕΓΔ τρίγωνον· ὡς ἄρα τὸ ΕΓΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΛΓ τρίγωνον, τὸ ΕΓΖ πρὸς τὸ ΕΓΔ τρίγωνον. ἴσον ἄρα τὸ ΕΓΔ τρίγωνον τῷ ΒΓΛ. καὶ ὡς ἄρα ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς ἀναστρέψαντι, ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως ἀνάπαλιν καὶ διελόντι, [ὡς] τὸ ΕΖΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΕΛΒΖ τετράπλευρον, οὕτως τὸ ΕΓΖ πρὸς τὸ ΕΔΖ τρίγωνον· ἴσον ἄρα τὸ ΕΔΖ τρίγωνον τῷ ΕΛΒΖ τετραπλεύρῳ. καὶ ἐπεί ἐστιν, ὡς τὸ ἀπὸ ΓΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ, τὸ ΕΓΖ πρὸς τὸ ΛΓΒ τρίγωνον, ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς διελόντι, ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως ἀνάπαλιν καὶ ἀναστρέψαντι καὶ ἀνάπαλίν ἐστιν, ὡς τὸ ὑπὸ ΑΖΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΓ, τὸ ΕΛΒΖ τετράπλευρον πρὸς τὸ ΒΛΓ τρίγωνον. ὁμοίως δὲ καί, ὡς τὸ ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΚΒ, οὕτως τὸ ΛΓΒ τρίγωνον πρὸς τὸ ΜΛΒΚ τετράπλευρον· δι' ἴσου ἄρα, ὡς τὸ ὑπὸ ΑΖΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΚΒ, τὸ ΕΛΒΖ τετράπλευρον πρὸς τὸ ΛΒΚΜ. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΑΖΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΚΒ, τὸ ἀπὸ ΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΚ, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΚ, τὸ ΕΔΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΗΘΚ τρίγωνον· καὶ ὡς ἄρα τὸ ΕΔΖ πρὸς τὸ ΗΘΚ, τὸ ΕΛΒΖ τετράπλευρον πρὸς τὸ ΜΛΒΚ. ἐναλλάξ, ὡς τὸ ΕΔΖ πρὸς τὸ ΕΛΒΖ, οὕτως τὸ ΗΘΚ πρὸς τὸ ΜΛΒΚ. ἴσον δὲ

1. ἐστί] ἐστίν W. 4. ΖΓ (alt.)] τῆς ΖΓ p. 5. ΛΓΒ] ΛΓΒ corr. ex ΛΒΓ W; corr. Comm. ΛΓΒ — 7. πρὸς τό]

quoniam enim est $Z\Gamma \times \Gamma\Delta = \Gamma B^2$ [prop XXXVII], erit [Eucl. VI, 17] $Z\Gamma : \Gamma B = \Gamma B : \Gamma\Delta$; quare etiam, ut figura in $\Gamma Z$ descripta ad figuram in $\Gamma B$ descriptam, ita $Z\Gamma : \Gamma\Delta$ [Eucl. VI, 19 coroll.]. est autem [Eucl. VI, 19] $Z\Gamma^2 : \Gamma B^2 = EZ\Gamma : \Lambda\Gamma B$ et [Eucl. VI, 1] $Z\Gamma : \Gamma\Delta = EZ\Gamma : E\Gamma\Delta$; itaque

$$E\Gamma Z : B\Lambda\Gamma = E\Gamma Z : E\Gamma\Delta.$$

quare $E\Gamma\Delta = B\Gamma\Lambda$ [Eucl. V, 9][1]). itaque etiam in hyperbola conuertendo, in ellipsi autem e contrario et dirimendo $EZ\Gamma : E\Lambda BZ = E\Gamma Z : E\Delta Z$; quare $E\Delta Z = E\Lambda BZ$. et quoniam est

$$\Gamma Z^2 : \Gamma B^2 = E\Gamma Z : \Lambda\Gamma B,$$

erit in hyperbola dirimendo, in ellipsi autem e contrario et conuertendo et e contrario

$$\Lambda Z \times ZB : B\Gamma^2 = E\Lambda BZ : B\Lambda\Gamma.$$

similiter autem etiam $\Gamma B^2 : \Lambda K \times KB = \Lambda\Gamma B : M\Lambda BK$; ex aequo igitur

$$\Lambda Z \times ZB : \Lambda K \times KB = E\Lambda BZ : \Lambda BKM.$$

uerum $\Lambda Z \times ZB : \Lambda K \times KB = EZ^2 : HK^2$ [prop. XXI] $= E\Delta Z : H\Theta K$ [Eucl. VI, 19]; quare etiam

$$E\Delta Z : H\Theta K = E\Lambda BZ : M\Lambda BK.$$

---

1. Uerba *ἴσον* — $B\Gamma\Lambda$ lin. 9 superflua sunt.

---

om. p. 8. $B\Lambda\Gamma$] $B\Lambda\Gamma$ p et $\Lambda$ e corr. W; *lcb* Comm., $B\Gamma\Lambda$ Halley. $E\Gamma\Delta$] $\Lambda\Gamma\Delta$ Wp, corr. Comm. 9. *τρίγωνον*] corr. ex *τριγώνων* W. $B\Gamma\Lambda$] $B\Gamma A$ W et $\Gamma$ e corr. p, corr. Halley, *lcb* Comm. *καὶ ὡς*] *ἔστιν* Halley. 11. *ὡς*] deleo; *καὶ ἔτι ἀνάπαλιν ὡς* Comm., Halley; *καὶ ἀνάπαλιν* mg. m. 2 U. 12. *οὕτω* p. 14. $E\Lambda B\Delta$ p. 16. $\Lambda\Gamma B$] $A\Gamma B$ Wp, corr. Comm. 19. $E\Lambda BZ$] $EAZB$ Wp, corr. Comm. 20. *δέ*] e corr. p. *οὕτω* p. 21. $M\Lambda BK$] $M\Lambda KB$ Wp, corr. Comm. 23. $\Lambda BKM$] scripsi praeeunte Comm., $ABKM$ Wp. 29. *οὕτω* p.

τὸ ΕΔΖ τῷ ΕΔΒΖ ἐδείχθη· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ΗΘΚ τῷ ΜΔΒΚ τετραπλεύρῳ. τὸ ἄρα ΜΓΚ τρίγωνον τοῦ ΗΘΚ διαφέρει τῷ ΔΒΓ.

ἐπιστῆσαι δεῖ ταύτῃ τῇ δείξει· ὀλίγην γὰρ ἀσάφειαν ἔχει ἐν ταῖς ἀναλογίαις τῆς ἐλλείψεως· ἵνα τὰ διὰ τὴν συντομίαν τοῦ ῥητοῦ ὁμοῦ λεγόμενα διῃρημένως ποιήσωμεν, οἷον — φησὶ γάρ· ἐπεί ἐστιν, ὡς τὸ ἀπὸ ΖΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ, τὸ ΕΓΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΒΓ, ἀνάπαλιν καὶ ἀναστρέψαντι καὶ ἀνάπαλιν — ὡς τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΖ, τὸ ΔΒΓ πρὸς τὸ ΕΖΓ· ἀναστρέψαντι, ὡς τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΖΒ, τουτέστιν ἡ ὑπεροχὴ τοῦ ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΖ διὰ τὸ διχοτομίαν εἶναι τὸ Γ τῆς ΑΒ, οὕτως τὸ ΔΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΒΖΕ τετράπλευρον· ἀνάπαλιν, ὡς τὸ ὑπὸ ΑΖΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΓ, τὸ ΕΔΒΖ τετράπλευρον πρὸς τὸ ΔΒΓ τρίγωνον.

ἔχει δὲ πτώσεις ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς $\overline{\iota\alpha}$, ὅσας εἶχε καὶ τὸ πρὸ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς παραβολῆς, καὶ ἄλλην μίαν, ὅταν τὸ ἐπὶ τοῦ Η λαμβανόμενον σημεῖον ταὐτὸν ᾖ τῷ Ε· τότε γὰρ συμβαίνει τὸ ΕΔΖ τρίγωνον μετὰ τοῦ ΔΒΓ ἴσον εἶναι τῷ ΓΕΖ· δέδεικται μὲν γὰρ τὸ ΕΔΖ τρίγωνον ἴσον τῷ ΔΒΖΕ τετραπλεύρῳ, τὸ δὲ ΔΒΖΕ τοῦ ΓΖΕ τριγώνου διαφέρει τῷ ΔΒΓ. ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως ἢ ταὐτόν ἐστι τὸ Η τῷ Ε ἢ ἐσωτέρω λαμβάνεται τοῦ Ε· καὶ δῆλον, ὅτι ἀμφότεραι αἱ παράλληλοι μεταξὺ πεσοῦνται τῶν Δ, Ζ, ὡς ἔχει

1. ΕΔΒΖ] Δ in ras. W. τό] mut. in τῷ W, τῷ p. 2. τῷ ΜΔΒΚ] om. Wp, corr. Comm. τὸ ἄρα] om. W initio lin., lac. 3 litt. p, corr. Comm. ΜΓΚ] ΜΓΔ Wp, corr. Comm. 3. ΗΘΚ] Θ e corr. W. ΔΒΓ] scripsi, ΑΒΓ Wp. 6. τήν] e corr. p. 7. ποιήσωμεν] corr. ex ποιήσομεν W. φησίν Wp. γάρ] om. Halley. 9. ΔΒΓ] Δ e corr. W.

permutando $E\Delta Z : EABZ = H\Theta K : MABK$. demonstrauimus autem $E\Delta Z = EABZ$; quare etiam $H\Theta K = MABK$. ergo $M\Gamma K = AB\Gamma + H\Theta K$ [1]).

In hanc demonstrationem inquirendum est (est enim in proportionibus ellipsis subobscura), ut, quae propter breuitatem uerborum Apollonii coniunguntur, explicemus, uelut [2]) (dicit enim: quoniam est

$$Z\Gamma^2 : \Gamma B^2 = E\Gamma Z : AB\Gamma,$$

e contrario et conuertendo et e contrario [u. supra p. 256, 17]) $B\Gamma^2 : \Gamma Z^2 = AB\Gamma : EZ\Gamma$; conuertendo $B\Gamma^2 : AZ \times ZB$ (hoc est $\Gamma B^2 \div \Gamma Z^2$ [Eucl. II, 5], quia $\Gamma$ punctum medium est rectae $AB$) $=$ $AB\Gamma : ABZE$; e contrario

$$AZ \times ZB : B\Gamma^2 = EABZ : AB\Gamma.$$

Habet autem in hyperbola XI casus, quot habuit etiam propositio praecedens in parabola, et unum alium, ubi punctum in $H$ sumptum idem est ac $E$; ita enim sequitur, esse $E\Delta Z + AB\Gamma = \Gamma EZ$; demonstrauimus enim, esse $E\Delta Z = ABZE$, et

$$ABZE = \Gamma ZE \div AB\Gamma.$$

in ellipsi autem aut idem est $H$ ac $E$ aut intra $E$ sumitur; et manifestum, ita utramque parallelam inter

1) Scriptum oportuit lin. 3 *τῷ* $H\Theta K$ *διαφέρει τοῦ* $AB\Gamma$.
2) *οἷον* lin. 7 sanum uix est.

Post *ἀνάπαλιν* (alt.) add. *ἔστι γὰρ ἀνάπαλιν* Halley cum Comm., fort. recte. 10. $\Lambda B\Gamma$] $AB\Gamma$ Wp, corr. Halley; *lcb* Comm. 13. *οὕτω* p. 18. *εἶχεν* W. 19. *ὅταν*] om. Wp, corr. Halley cum Comm. 22. Post *τρίγωνον* del. *μετὰ τούτου* $\overline{\lambda\beta\gamma}$ *ἴσον εἶναι* p. 23. *δέ*] $\overline{\Delta E}$ W. *τοῦ* $\Gamma ZE$] scripsi; om. Wp, *τοῦ* $\Gamma EZ$ Halley cum Comm. *τριγώνου*] $\overset{\omega}{\nabla}$ p. $AB\Gamma$ p. 24. *ἔστιν* W.

ἐν τῷ ῥητῷ. εἰ δὲ ἐξωτέρω ληφθῇ τὸ *H* τοῦ *E*, καὶ ἡ ἀπ' αὐτοῦ τῇ *EZ* παράλληλος μεταξὺ πέσῃ τῶν *Z*, *Γ*, τὸ *Θ* σημεῖον ποιεῖ πτώσεις πέντε· ἢ γὰρ μεταξὺ τῶν *Δ*, *B* πίπτει ἢ ἐπὶ τὸ *B* ἢ μεταξὺ τῶν *B*, *Z* ἢ ἐπὶ τὸ *Z* ἢ μεταξὺ τῶν *Z*, *Γ*. ἐὰν δὲ ἡ διὰ τοῦ *H* τῇ κατηγμένῃ παράλληλος ἐπὶ τὸ *Γ* κέντρον πίπτῃ, τὸ *Θ* πάλιν σημεῖον ποιήσει ἄλλας πέντε πτώσεις ὡσαύτως· καὶ δεῖ ἐπὶ τούτῳ σημειώσασθαι, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν παραλλήλων ταῖς *EΔ*, *EZ* γιγνόμενον τρίγωνον ἴσον γίνεται τῷ *ΔBΓ* τριγώνῳ· ἐπεὶ γάρ ἐστιν, ὡς τὸ ἀπὸ *EZ* πρὸς τὸ ἀπὸ *HΓ*, τὸ *EΔZ* τρίγωνον πρὸς τὸ *HΘΓ*· ὅμοια γάρ· ὡς δὲ τὸ ἀπὸ *EZ* πρὸς τὸ ἀπὸ *HΓ*, τὸ ὑπὸ *BZΔ* πρὸς τὸ ὑπὸ *BΓΔ*, τουτέστι τὸ ἀπὸ *BΓ*, ὡς ἄρα τὸ *EΔZ* τρίγωνον πρὸς τὸ *HΘΓ*, τὸ ὑπὸ *BZΔ* πρὸς τὸ ἀπὸ *BΓ*. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ *BZΔ* πρὸς τὸ ἀπὸ *BΓ*, οὕτως ἐδείχθη ἔχον τὸ *ΔBZE* τετράπλευρον πρὸς τὸ *ΔBΓ* τρίγωνον· καὶ ὡς ἄρα τὸ *EΔZ* τρίγωνον πρὸς τὸ *HΘΓ*, τὸ *ΔBZE* τετράπλευρον πρὸς τὸ *ΔBΓ* τρίγωνον. καὶ ἐναλλάξ. καὶ ἄλλως δὲ ταύτας δυνατὸν δεῖξαι λέγοντας, ὅτι ἐπὶ τῶν διπλασίων αὐτῶν παραλληλογράμμων ταῦτα δέδεικται ἐν τῷ σχολίῳ τοῦ μα' θεωρήματος.

ἐὰν δὲ ἡ διὰ τοῦ *H* τῇ *EZ* παράλληλος ἀγομένη μεταξὺ πέσῃ τῶν *Γ*, *Δ*, ἐκβληθήσεται μέν, ἕως ὅτε ἡ *ΓE* αὐτῇ συμπέσῃ, τὸ δὲ *Θ* σημεῖον ποιήσει πτώσεις

---

1. ληφθῇ] scripsi, λειφθῇ W, ληφθείη p, m. 2 W. 3. *Θ*] *O* Wp, corr. Comm. 4. *B* ἢ] βη W. 5. τό] corr. ex τῷ W. ἢ] ins. m. 1 W. 6. πίπτῃ] scripsi, πίπτει Wp. 13. ὑπό (alt.)] om. Wp, corr. Comm. τουτέστιν W. 16. *ΔBZE*] *Δ* corr. ex *A* W, *ABZE* p. 18. τετράπλευρον] -άπλευ- in ras. W. 19. *ΔBΓ*] *ABΓ* Wp, corr. Comm. 21. ἐν τῷ] p, ὄντως W. σχολίῳ] comp. p, χ̊ W. 23. *H*] in ras. W.

$\Delta$, $Z$ cadere, sicut apud Apollonium est. sin $H$ extra $E$ sumitur, et recta ab eo rectae $EZ$ parallela ducta inter $Z$, $\Gamma$ cadit, punctum $\Theta$ quinque casus efficit; aut enim inter $\Delta$, $B$ cadit aut in $B$ aut inter $B$, $Z$ aut in $Z$ aut inter $Z$, $\Gamma$. sin recta per $H$ ordinatae parallela ducta in $\Gamma$ centrum cadit, rursus punctum $\Theta$ quinque alios casus efficiet eodem modo; et hic animaduertendum, triangulum a rectis $E\Delta$, $EZ$ rectis parallelis effectum aequalem fieri triangulo $AB\Gamma$; nam quoniam est $EZ^2 : H\Gamma^2 = E\Delta Z : H\Theta\Gamma$ [Eucl. VI, 19]; nam similes sunt; et


$$EZ^2 : H\Gamma^2 = BZ \times Z A : B\Gamma \times \Gamma A \text{ [prop. XXI]}$$
$$= BZ \times ZA : B\Gamma^2, \text{ erit}$$

$$E\Delta Z : H\Theta\Gamma = BZ \times ZA : B\Gamma^2.$$

demonstrauimus autem, esse

$$BZ \times ZA : B\Gamma^2 = ABZE : AB\Gamma;$$

quare etiam $E\Delta Z : H\Theta\Gamma = ABZE : AB\Gamma$. et permutando.[1]) uerum hos casus[2]) aliter quoque demonstrare possumus dicentes, haec in scholio ad prop. XLI [supra p. 252] de parallelogrammis demonstrata esse, quae his triangulis duplo maiora sunt.




sin recta per $H$ rectae $EZ$ parallela ducta inter $\Gamma$, $A$ cadit, producetur, donec $\Gamma E$ cum ea concurrat,

1) Et $E\Delta Z = ABZE$, ut supra demonstrauimus.
2) Sc. ubi recta per $H$ ducta in centrum ellipsis cadit.

Fig. in W parum recte descripta est.

ζ̄· ἢ γὰρ μεταξὺ τῶν *Β*, *Δ* ἢ ἐπὶ τὸ *Β* πίπτει ἢ μεταξὺ τῶν *Β*, *Ζ* ἢ ἐπὶ τὸ *Ζ* ἢ μεταξὺ τῶν *Ζ*, *Γ* ἢ ἐπὶ τὸ *Γ* ἢ μεταξὺ τῶν *Γ*, *Α*· καὶ ἐπὶ τούτων τῶν πτώσεων συμβαίνει τὴν διαφορὰν τῶν *ΑΒΓ*, *ΗΘΚ* τριγώνων κατωτέρω συνίστασθαι τῆς *ΑΒ* εὐθείας ὑπὸ τῆς *ΑΓ* ἐκβαλλομένης.

ἐὰν δὲ τὸ *Η* ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη ληφθῇ τῆς τομῆς, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ *Η* τῇ *ΕΖ* παράλληλος μεταξὺ πίπτῃ τῶν *Β*, *Ζ*, ἐκβληθήσεται μὲν διὰ τὴν ἀπόδειξιν, ἕως οὗ τέμῃ τὴν *ΑΓ*, τὸ δὲ *Θ* σημεῖον ποιήσει πτώσεις ζ̄ ἢ μεταξὺ ὂν τῶν *Β*, *Ζ* ἢ ἐπὶ τὸ *Ζ* πῖπτον ἢ μεταξὺ τῶν *Ζ*, *Γ* ἢ ἐπὶ τὸ *Γ* ἢ μεταξὺ τῶν *Γ*, *Α* ἢ ἐπὶ τὸ *Α* ἢ ἐξωτέρω τοῦ *Α*. ἐὰν δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ *Η* τῇ *ΕΖ* παράλληλος ἐπὶ τὸ *Ζ* πίπτῃ, ὥστε μίαν εὐθεῖαν εἶναι τὴν *ΕΖΗ*, τὸ *Θ* σημεῖον ποιήσει πτώσεις ε̄· ἢ γὰρ μεταξὺ τῶν *Ζ*, *Γ* πεσεῖται ἢ ἐπὶ τὸ *Γ* ἢ μεταξὺ τῶν *Γ*, *Α* ἢ ἐπὶ τὸ *Α* ἢ ἐξωτέρω τοῦ *Α*. ἐὰν δὲ ἡ *ΗΚ* μεταξὺ πίπτῃ τῶν *Ζ*, *Γ*, τὸ *Θ* ποιήσει πτώσεις ε̄· ἢ γὰρ μεταξὺ τῶν *Ζ*, *Γ* πεσεῖται ἢ ἐπὶ τὸ *Γ* ἢ μεταξὺ τῶν *Γ*, *Α* ἢ ἐπὶ τὸ *Α* ἢ ἐξωτέρω τοῦ *Α*. ἐὰν δὲ ἡ *ΗΚ* ἐπὶ τὸ *Γ* κέντρον πίπτῃ, τὸ *Θ* σημεῖον ποιήσει πτώσεις τρεῖς ἢ μεταξὺ πῖπτον τῶν *Γ*, *Α* ἢ ἐπὶ τὸ *Α* ἢ ἐξωτέρω τοῦ *Α*· καὶ ἐπὶ τούτων τῶν πτώσεων συμβήσεται πάλιν τὸ *ΗΘΚ* τρίγωνον ἴσον γίνεσθαι τῷ *ΑΒΓ* τριγώνῳ. ἐὰν δὲ ἡ *ΗΚ* μεταξὺ πίπτῃ τῶν *Γ*, *Α*, τὸ *Θ* σημεῖον ἢ μεταξὺ τῶν *Γ*, *Α* πεσεῖται ἢ ἐπὶ τὸ *Α* ἢ ἐξωτέρω τοῦ *Α*.

συμβαίνει οὖν ἐπί τινος ἐλλείψεως τὰς πάσας πτώσεις εἶναι μβ̄ καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ κύκλου δὲ περιφερείας

---

5. τῆς] scripsi, τάς Wp. 6. *ΑΓ*] scripsi, *ΑΒ* Wp. 8. πίπτῃ] scripsi, πίπτει Wp. 10. *ΑΓ*] *ΑΓ* p. 11. ὂν —

et punctum *Θ* casus VII efficiet; aut enim inter *B*, *Δ* cadit aut in *B* aut inter *B*, *Z* aut in *Z* aut inter *Z*, *Γ* aut in *Γ* aut inter *Γ*, *Δ*. et in his casibus adcidit, ut differentia triangulorum *ΔBΓ*, *HΘK* infra rectam *ΔB* a recta *ΔΓ* producta construatur.

sin *H* ad alteram partem sectionis sumitur, et recta ab *H* rectae *EZ* parallela inter *B*, *Z* cadit, demonstrationis causa producetur, donec rectam *ΔΓ* secet, punctum *Θ* autem casus efficiet VII aut inter *B*, *Z* positum aut in *Z* cadens aut inter *Z*, *Γ* aut in *Γ* aut inter *Γ*, *Δ* aut in *Δ* aut extra *Δ*. sin recta ab *H* rectae *EZ* parallela in *Z* cadit, ita ut *EZH* una sit recta, punctum *Θ* casus V efficiet; nam aut inter *Z*, *Γ* cadet aut in *Γ* aut inter *Γ*, *Δ* aut in *Δ* aut extra *Δ*. sin *HK* inter *Z*, *Γ* cadit, *Θ* casus V efficiet; aut enim inter *Z*, *Γ* cadet aut in *Γ* aut inter *Γ*, *Δ* aut in *Δ* aut extra *Δ*. sin *HK* in *Γ* centrum cadit, punctum *Θ* tres casus efficiet aut inter *Γ*, *Δ* cadens aut in *Δ* aut extra *Δ*; et in his casibus rursus adcidet, ut sit $H\Theta K = \Delta B\Gamma$. sin *HK* inter *Γ*, *Δ* cadit, punctum *Θ* aut inter *Γ*, *Δ* cadet aut in *Δ* aut extra *Δ*.

adcidit igitur, ut in ellipsi omnino XLII sint casus et in ambitu quoque circuli totidem, ita ut casus huius propositionis omnino sint XCVI.

---

*μεταξύ*] om. p. 14. *πίπτῃ*] corr. ex *πίπτει* p. 18. *μεταξύ* — 21. *HK*] om. p. 19. *ἤ* (alt.)] om. W, corr. Comm. 20. *τό*] *τῶι* W. 22. *τό*] p, *τῶν* W. 25. *ΛΒΓ*] *ΑΒ* Wp, corr. Comm. 26. *τῶν* — *πεσεῖ-*] in ras. W. 27. *τό*] p, *τῶι* W. *ἤ*] p, om. W. 28. *τινος*] *τῆς*?

τοσαύτας, ὡς εἶναι τὰς πάσας πτώσεις τούτου τοῦ θεωρήματος ϙϛ.

Εἰς τὸ μδ'.

Ἐπεὶ οὖν ἀντικείμεναί εἰσιν αἱ ΖΑ, ΒΕ, ὧν διάμετρος ἡ ΑΒ, ἡ δὲ διὰ τοῦ κέντρου ἡ ΖΓΕ καὶ ἐφαπτόμεναι τῶν τομῶν αἱ ΖΗ, ΔΕ, παράλληλός ἐστιν ἡ ΖΗ τῇ ΕΔ] ἐπεὶ γὰρ ὑπερβολή ἐστιν ἡ ΑΖ καὶ ἐφαπτομένη ἡ ΖΗ καὶ κατηγμένη ἡ ΖΟ, ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΟΓΗ τῷ ἀπὸ ΓΑ διὰ τὸ λζ' θεώρημα· ὁμοίως δὴ καὶ τὸ ὑπὸ ΞΓΔ τῷ ὑπὸ ΓΒ ἐστιν ἴσον. ἔστιν ἄρα, ὡς τὸ ὑπὸ ΟΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΞΓΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΓ, καὶ ἐναλλάξ, ὡς τὸ ὑπὸ ΟΓΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΞΓΔ, τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ. ἴσον δὲ τὸ ἀπὸ ΑΓ τῷ ἀπὸ ΓΒ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΟΓΗ τῷ ὑπὸ ΞΓΔ. καί ἐστιν ἡ ΟΓ τῇ ΓΞ ἴση· καὶ ἡ ΗΓ ἄρα τῇ ΓΔ ἐστιν ἴση· ἔστι δὲ καὶ ἡ ΖΓ τῇ ΓΕ διὰ τὸ λ'· αἱ ἄρα ΖΓΗ ἴσαι εἰσὶ ταῖς ΕΓΔ. καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσι τὰς πρὸς τῷ Γ· κατὰ κορυφὴν γάρ. ὥστε καὶ ἡ ΖΗ τῇ ΕΔ ἐστιν ἴση καὶ ἡ ὑπὸ ΓΖΗ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΕΔ. καί εἰσιν ἐναλλάξ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ ΕΔ.

αἱ πτώσεις αὐτοῦ ιβ εἰσιν, καθάπερ ἐπὶ τῆς ὑπερβολῆς ἐν τῷ μγ' ἔχει, καὶ ἡ ἀπόδειξις ἡ αὐτή.

Εἰς τὸ με'.

Ἐπιστῆσαι χρὴ τῷ θεωρήματι τούτῳ πλείους ἔχοντι πτώσεις. ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ὑπερβολῆς ἔχει κ· τὸ γὰρ

3. Hic Εἰς τὸ με' l. 24 — p. 266, 24 hab. W. 7. τῇ] scripsi, τῆς Wp. 9. ΖΟ] ΖΘ Wp, corr. Comm. ΟΓΗ] ΘΓΗ Wp, corr. Comm. 10. δέ Halley cum Comm. ὑπό (alt.)] ἀπό p. 11. ΟΓΗ] ΘΓΗ Wp, corr. Comm. 12.

## Ad prop. XLIV.

Quoniam igitur $ZA$, $BE$ oppositae sunt, quarum diametrus est $AB$, recta autem per centrum ducta $Z\Gamma E$, sectionesque contingentes $ZH$, $\Delta E$, rectae $\Delta E$ parallela est $ZH$ I p. 134, 21—24] quoniam enim $AZ$ hyperbola est et contingens $ZH$ et ordinate ducta $ZO$, erit propter prop. XXXVII $O\Gamma \times \Gamma H = \Gamma A^2$. iam eodem modo etiam

$$\Xi\Gamma \times \Gamma\Delta = \Gamma B^2.$$

itaque $O\Gamma \times \Gamma H : A\Gamma^2 = \Xi\Gamma \times \Gamma\Delta : B\Gamma^2$, et permutando $O\Gamma \times \Gamma H : \Xi\Gamma \times \Gamma\Delta = A\Gamma^2 : \Gamma B^2$. uerum

$$A\Gamma^2 = \Gamma B^2;$$

itaque etiam $O\Gamma \times \Gamma H = \Xi\Gamma \times \Gamma\Delta$. est autem $O\Gamma = \Gamma\Xi$ [prop. XXX]; quare etiam $H\Gamma = \Gamma\Delta$. est autem etiam propter prop. XXX $Z\Gamma = \Gamma E$; itaque $Z\Gamma$, $\Gamma H$ rectis $E\Gamma$, $\Gamma\Delta$ aequales sunt. et angulos ad $\Gamma$ positos aequales comprehendunt; ad uerticem enim inter se positi sunt; itaque [Eucl. I, 4] $ZH = E\Delta$ et $\angle\, \Gamma ZH = \Gamma E\Delta$. et sunt alterni; ergo $ZH$, $E\Delta$ parallelae sunt [Eucl. I, 27].

Casus huius propositionis XII sunt, sicut in hyperbola in prop. XLIII se habet, et demonstratio eadem est.

## Ad prop. XLV.

Inquirendum est in hanc propositionem, quae complures habeat casus. in hyperbola enim XX habet;

---


οὔτω p. 13. ὑπό] corr. ex ἀπό W. $O\Gamma H$] $\Theta\Gamma H$ Wp, corr. Comm. 14. $\Gamma B$ (alt.)] corr. ex $\Gamma H$ W, $\Gamma\Theta$ p. 15. $O\Gamma H$] $\Theta\Gamma H$ Wp, corr. Comm. 16. $O\Gamma$] $\Theta\Gamma$ Wp, corr. Comm. ἔστιν W. 17. τῇ] ἴσῃ τῇ Halley. εἰσίν W. 18. περιέχουσιν W. τῷ] scripsi, τό Wp. 24 sq. ante l. 3 hab. W.

*δύναται δὲ τὰ τῆς προτάσεως δείκνυσθαι καὶ ἐπὶ ἀντικειμένων.*

*Εἰς τὸ μς'.*

*Τοῦτο τὸ θεώρημα πτώσεις ἔχει πλείους, ἃς δείξομεν προσέχοντες ταῖς πτώσεσι τοῦ μβ'.*

*ὑποδείγματος δὲ χάριν, ἐὰν τὸ Ζ ἐπὶ τὸ Β πίπτοιτο, αὐτόθεν ἐροῦμεν· ἐπεὶ τὸ ΒΔΛ ἴσον ἐστὶ τῷ ΘΒΔΜ,*




*κοινὸν ἀφῃρήσθω τὸ ΝΜΔΒ· λοιπὸν ἄρα τὸ ΛΝΜ τῷ ΝΘΒ ἐστιν ἴσον.*

*ἐπὶ δὲ τῆς λοιπῆς ἐροῦμεν· ἐπειδὴ τὸ ΛΕΔ τῷ ΘΒΔΜ ἐστιν ἴσον, τουτέστι τῷ ΚΗΔΜ καὶ τῷ ΗΖΕ, τουτέστι τῷ ΖΚΝ καὶ τῷ ΝΕΔΜ, κοινὸν ἀφῃρήσθω τὸ ΝΕΔΜ· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ΛΝΜ τῷ ΚΖΝ ἴσον.*

*Εἰς τὸ μζ'.*

*Τοῦτο τὸ θεώρημα ἐπὶ μὲν τῆς ὑπερβολῆς πτώσεις ἔχει, ὅσας τὸ πρὸ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς παραβολῆς εἶχεν, τὰς*

4. *ἅς*] addidi, om. Wp. *δείξομεν δέ* Halley cum Comm. 5. *πτώσεσιν* W. 6. *πίπτοιτο*] p, corr. ex *πίπτειτο* W. 7. *ἐροῦμεν*] *ἐροῦ* p. *ἐπεί*] *ἐπί* Wp, corr. Comm. *ΒΔΛ*] *ΒΔΑ* Wp, corr. Comm. *ἐστίν* W. *τῷ*] *τό* Wp, corr. Comm. *ΘΒΔΜ*] *ΟΒΔΜ* Wp, corr. Comm. 8. *ΝΜΔΒ*] *ΝΜΔΑΒ* Wp, corr. Comm. 10. *ἐπί*] -*ί* in ras. W. *δέ*] -*έ* in ras. W. *ΛΕΔ*] *Δ* e corr. p. 11. *τουτέστιν* W. 12. *τουτέστιν* W. 13. *καί*] p, *καὶ αἱ* W, om. Comm. *λοιπόν*] -*ό*- e corr. W. *ἄρα*] addidi cum Comm., om. Wp. *ΛΝΜ*] *ΑΝΜ* Wp, corr. Comm. *ΚΖΝ*] *Ν* ins. m. 1 W, *ΚΖΗ* p.

propositio autem etiam de oppositis demonstrari potest.

## Ad prop XLVI.

Haec propositio complures habet casus, quos demonstrabimus ad casus propositionis XLII animaduertentes.

exempli autem gratia, si $Z$ in $B$ cadit, statim dicemus: quoniam est [prop. XLII] $B\Delta\Lambda = \Theta B\Delta M$, auferatur, quod commune est, $NM\Delta B$; itaque, qui relinquitur, triangulus $\Lambda NM = N\Theta B$.


in reliqua autem figura dicemus: quoniam

$$\Lambda E\Delta = \Theta B\Delta M \text{ [prop. XLII]}$$
$$= KH\Delta M + HZE = ZKN + NE\Delta M,$$

auferatur, quod commune est, $NE\Delta M$; erit igitur etiam, qui relinquitur, triangulus $\Lambda NM = KZN$.

## Ad prop. XLVII.

Haec propositio in hyperbola totidem habet casus, quot praecedens in parabola habuit, demonstrationes




autem eorum efficiemus ad casus propositionis XLIII animaduertentes, et in ellipsi quoque demonstrationes

---

In Fig. 1 om. $\Lambda$ W, pro $N$ hab. $H$ W.
In Fig. 3 pro $\Lambda$ hab. $A$, pro $E$ hab. $O$, $O$ et $N$ om. W.

δὲ ἀποδείξεις αὐτῶν ποιησόμεθα προσέχοντες ταῖς πτώσεσι τοῦ μγ' θεωρήματος, καὶ ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως δὲ τὰς ἀποδείξεις ἐκ τῶν πτώσεων τοῦ μγ', οἷον ἐπὶ τῆς ὑποκειμένης καταγραφῆς τοῦ Η σημείου ἐκτὸς εἰλημμένου, ἐπειδὴ ἴσον ἐστὶ τὸ ΔΑΓ τρίγωνον τοῖς ΘΗΩ, ΩΓΜ, τουτέστι τοῖς ΟΘΓ, ΟΗΜ τριγώνοις, τῷ δὲ ΔΑΓ ἴσον ἐστὶ τό τε ΞΠΓ τρίγωνον καὶ τὸ ΛΑΠΞ τετράπλευρον, τουτέστι τὸ ΝΘΠ τρίγωνον διὰ τὰ δεδειγμένα ἐν τῷ μγ' θεωρήματι, καὶ τὰ ΞΠΓ, ΝΘΠ ἄρα τρίγωνα ἴσα ἐστὶ τοῖς ΟΘΓ, ΟΜΗ τριγώνοις. κοινὸν ἀφῃρήσθω τὸ ΘΟΓ τρίγωνον· λοιπὸν ἄρα τὸ ΞΟΝ τῷ ΗΟΜ ἴσον ἐστίν. καὶ παράλληλος ἡ ΝΞ τῇ ΜΗ· ἴση ἄρα ἡ ΝΟ τῇ ΟΗ.

## Εἰς τὸ μη'.

Καὶ τούτου αἱ πτώσεις ὡσαύτως ἔχουσι τοῖς προειρημένοις ἐπὶ τοῦ μϛ' κατὰ τὴν τῆς ὑπερβολῆς καταγραφήν.

## Εἰς τὸ μθ'.

Λοιπὸν ἄρα τὸ ΚΛΝ τρίγωνον τῷ ΔΛΠΓ παραλληλογράμμῳ ἐστὶν ἴσον. καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΛΠ γωνία τῇ ὑπὸ ΚΛΝ γωνίᾳ· διπλάσιον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΚΛΝ τοῦ ὑπὸ ΛΔΓ] ἐκκείσθω γὰρ χωρὶς τὸ ΚΛΝ τρίγωνον καὶ τὸ ΔΛΠΓ παραλ-

2. πτώσεσιν W. 5. ἐστίν W. 6. τουτέστιν W. 7. τῷ] scripsi, τό W p. δέ] γάρ W p, corr. Halley. ἐστίν W. τό] W, τῷ p. ΖΠΓ p. τρίγωνον] scripsi, τριγώνῳ W p. τό] W, τῷ p. 8. τετράπλευρον] W, comp. p. τουτέστιν W. 10. ἐστίν W. ΟΜΗ] ΟΜ W, ΟΔΛ p, corr. Comm. 12. ΗΟΜ] ΗΘΜ W p, corr. Halley, mog Comm. 13. ΟΗ] ΘΗ W p, corr. Comm. 15. ἔχουσιν W. 22. ἐστίν W. 23. ΔΛΠΓ] ΔΛΠΤ W p, corr. Comm.

efficiemus e casibus propositionis XLIII, uelut in figura infra descripta puncto $H$ extra $E$ sumpto, quoniam est [prop. XLIII]

$$\Lambda A\Gamma = \Theta H\Omega + \Omega\Gamma M = O\Theta\Gamma + OHM,$$

et $\Xi\Pi\Gamma + \Lambda A\Pi\Xi = \Lambda A\Gamma = \Xi\Pi\Gamma + N\Theta\Pi$ propter ea, quae in prop. XLIII demonstrata sunt [u. supra p. 258, 2], erit etiam $\Xi\Pi\Gamma + N\Theta\Pi = O\Theta\Gamma + OMH$. auferatur, qui communis est, triangulus $\Theta O\Gamma$; erit igitur, qui relinquitur, triangulus $\Xi ON = HOM$. et $N\Xi$, $MH$ parallelae sunt; ergo $NO = OH$.

## Ad prop. XLVIII.


Huius quoque propositionis casus eodem modo se habent atque ii, quos in prop. XLVII in figura hyperbolae explicauimus.

## Ad prop. XLIX.

Erit igitur $K\Lambda N = \Delta\Lambda\Pi\Gamma$. est autem $\angle \Delta\Lambda\Pi = \angle K\Lambda N$; itaque erit

$$K\Lambda \times \Lambda N = 2\Lambda\Delta \times \Delta\Gamma \text{ I p. 148, 3--6]}$$

seorsum enim describantur triangulus $K\Lambda N$ et parallelogrammum $\Delta\Lambda\Pi\Gamma$. et quoniam est $K\Lambda N = \Delta\Pi$, per $N$ rectae $\Lambda K$ parallela ducatur $NP$, per $K$ autem rectae $\Lambda N$ parallela $KP$; parallelogrammum igitur est $\Lambda P$ et $= 2K\Lambda N$




[Eucl. I, 34]; quare etiam $\Lambda P = 2\Delta\Pi$. iam $\Delta\Gamma$, $\Lambda\Pi$ ad $\Sigma$, $T$ producantur, et ponatur $\Gamma\Sigma = \Delta\Gamma$,

Figura est codicis W, nisi quod ibi ducta est $\Lambda P$; pro $\Pi$ hab. $K$; $K$ corr. m. rec. ex $M$.

ληλόγραμμον. καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστὶ τὸ ΚΛΝ τρίγωνον τῷ ΔΠ παραλληλογράμμῳ, ἤχθω διὰ τοῦ Ν τῇ ΛΚ παράλληλος ἡ ΝΡ, διὰ δὲ τοῦ Κ τῇ ΛΝ ἡ ΚΡ· παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ ΛΡ καὶ διπλάσιον τοῦ ΚΛΝ τριγώνου· ὥστε καὶ τοῦ ΔΠ παραλληλογράμμου. ἐκβεβλήσθωσαν δὴ αἱ ΔΓ, ΛΠ ἐπὶ τὰ Σ, Τ, καὶ κείσθω τῇ ΔΓ ἴση ἡ ΓΣ, τῇ δὲ ΛΠ ἡ ΠΤ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΣΤ· παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ ΔΤ διπλάσιον τοῦ ΔΠ· ὥστε ἴσον τὸ ΛΡ τῷ ΛΣ. ἔστι δὲ αὐτῷ καὶ ἰσογώνιον διὰ τὸ τὰς πρὸς τῷ Λ γωνίας κατὰ κορυφὴν οὔσας ἴσας εἶναι· τῶν δὲ ἴσων καὶ ἰσογωνίων παραλληλογράμμων ἀντιπεπόνθασιν αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευραί· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΚΛ πρὸς ΛΤ, τουτέστι πρὸς ΔΣ, ἡ ΔΛ πρὸς ΛΝ, καὶ τὸ ὑπὸ ΚΛΝ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΛΔΣ. καὶ ἐπεὶ διπλῆ ἐστιν ἡ ΔΣ τῆς ΔΓ, τὸ ὑπὸ ΚΛΝ διπλάσιόν ἐστι τοῦ ΛΔΓ.

ἐὰν δὲ ἡ μὲν ΔΓ τῇ ΛΠ ἐστι παράλληλος, ἡ δὲ ΓΠ τῇ ΛΔ μή ἐστι παράλληλος, τραπέζιον μὲν δηλονότι ἐστὶ τὸ ΔΓΠΛ, καὶ οὕτως δέ φημι, ὅτι τὸ ὑπο ΚΛΝ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΔΛ καὶ συναμφοτέρου τῆς ΓΔ, ΛΠ. ἐὰν γὰρ τὸ μὲν ΛΡ ἀναπληρωθῇ, ὡς προείρηται, ἐκβληθῶσι δὲ καὶ αἱ ΔΓ, ΛΠ, καὶ τεθῇ τῇ μὲν ΛΠ ἴση ἡ ΓΣ, τῇ δὲ ΔΓ ἡ ΠΤ, καὶ ἐπιζευχθῇ ἡ ΣΤ, παραλληλόγραμμον ἔσται τὸ ΔΤ διπλάσιον τοῦ ΔΠ, καὶ ἡ ἀπόδειξις ἡ αὐτὴ ἁρμόσει. χρησιμεύσει δὲ τοῦτο εἰς τὸ ἑξῆς.

## Εἰς τὸ ν'.

*Αἱ πτώσεις τούτου τοῦ θεωρήματος ὡσαύτως ἔχουσι ταῖς τοῦ μγ', ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ να'.*

1. ἐστίν W. τρίγωνον] om. p. 2. ΔΠ] ΛΠ Wp, corr. Comm. 4. ἐστίν W. 5. ΚΛΝ] Λ supra scr. m. 1 W.

$\Pi T = \Lambda\Pi$, ducaturque $\Sigma T$; $\Delta T$ igitur parallelogrammum est et $= 2\,\Delta\Pi$ [Eucl. VI, 1]; quare $\Delta P = \Lambda\Sigma$. uerum etiam aequiangula sunt, quia anguli ad $\Lambda$ aequales sunt ad uerticem inter se positi; in parallelogrammis autem aequalibus et aequiangulis latera aequales angulos comprehendentia in contraria proportione sunt [Eucl. VI, 14]; itaque

$$K\Lambda : \Lambda T = \Delta\Lambda : \Lambda N = K\Lambda : \Delta\Sigma$$

et $K\Lambda \times \Lambda N = \Lambda\Delta \times \Delta\Sigma$. et quoniam $\Delta\Sigma = 2\,\Delta\Gamma$, erit $K\Lambda \times \Lambda N = 2\,\Lambda\Delta \times \Delta\Gamma$.

sin $\Delta\Gamma$ rectae $\Lambda\Pi$ parallela est, $\Gamma\Pi$ autem rectae $\Lambda\Delta$ non parallela, trapezium adparet esse $\Delta\Gamma\Pi\Lambda$, sed sic quoque dico, esse

$$K\Lambda \times \Lambda N = \Delta\Lambda \times (\Gamma\Delta + \Lambda\Pi).$$

nam si $\Lambda P$ expletur, sicut antea dictum est, et $\Delta\Gamma$, $\Lambda\Pi$ producuntur, poniturque $\Gamma\Sigma = \Lambda\Pi$, $\Pi T = \Delta\Gamma$, et ducitur $\Sigma T$, $\Delta T$ parallelogrammum erit et $= 2\,\Delta\Pi$, et eadem ualebit demonstratio. hoc uero in sequentibus [I p. 152, 14] utile erit.

## Ad prop. L.

Casus huius propositionis eodem modo se habent atque in prop. XLIII, et similiter etiam in prop. LI.

---

6. $\Delta\Gamma, \Lambda\Pi$] e corr. p; $\Delta\Lambda, \Gamma\Pi$ W. 7. $\Gamma\Sigma$] p?, $\Gamma E$ W. δέ] $\Delta E$ W. $\Lambda\Pi$ ἤ] e corr. p. 8. ἐστίν W. 9. τό] τῷ p. ἔστιν W. 14. τουτέστιν W. 15. ἐστίν W. $\Delta\Sigma$] $\Lambda\Sigma$ Wp, corr. Comm. 16. $K\Lambda N$] $K\Lambda H$ p. ἐστι] ἐστιν, ι in ras., W. $\Lambda\Delta\Gamma$] $\Lambda A\Gamma$ Wp, corr. Comm. 17. ἐστιν W. ἡ — 18. παράλληλος] om. p. 18. $\Lambda\Delta$] $\Lambda A$ W, corr. Halley; *dl* Comm. ἐστιν W. τραπέζειον W. 19. ἐστίν W. $\Delta\Gamma\Pi\Lambda$] $A\Gamma\Pi\Lambda$ Wp, corr. Comm. οὕτω p. 20. ἐστίν W. 21. ἐάν — 22. $\Lambda\Pi$] om. p. 22. ἐκβληθῶσιν W. $\Delta\Gamma$] corr. ex $\Delta$ m. 1 W. 23. $\Gamma\Sigma$] $\Gamma O$ Wp, corr. Comm. 28. ἔχουσιν W.

## Εἰς τὸν ἐπίλογον.

Τὴν ἐκ τῆς γενέσεως διάμετρον λέγει τὴν γεναμένην ἐν τῷ κώνῳ κοινὴν τομὴν τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου καὶ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου· ταύτην δὲ καὶ ἀρχικὴν διάμετρον λέγει. καί φησιν, ὅτι πάντα τὰ δεδειγμένα συμπτώματα τῶν τομῶν ἐν τοῖς προειρημένοις θεωρήμασιν ὑποθεμένων ἡμῶν τὰς ἀρχικὰς διαμέτρους συμβαίνειν δύνανται καὶ τῶν ἄλλων πασῶν διαμέτρων ὑποτιθεμένων.

## Εἰς τὸ νδ'.

Καὶ ἀνεστάτω ἀπὸ τῆς *ΑΒ* ἐπίπεδον ὀρθὸν πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον, καὶ ἐν αὐτῷ περὶ τὴν *ΑΒ* γεγράφθω κύκλος ὁ *ΑΕΒΖ*, ὥστε τὸ τμῆμα τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου τὸ ἐν τῷ *ΑΕΒ* τμήματι πρὸς τὸ τμῆμα τῆς διαμέτρου το ἐν τῷ *ΑΖΒ* τμήματι μὴ μείζονα λόγον ἔχειν τοῦ ὃν ἔχει ἡ *ΑΒ* πρὸς *ΒΓ*] ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ *ΑΒ*, *ΒΓ*, καὶ δέον ἔστω περὶ τὴν *ΑΒ* κύκλον γράψαι, ὥστε τὴν διάμετρον αὐτοῦ τέμνεσθαι ὑπὸ τῆς *ΑΒ* οὕτως, ὥστε τὸ πρὸς τῷ *Γ* μέρος αὐτῆς πρὸς τὸ λοιπὸν μὴ μείζονα λόγον ἔχειν τοῦ τῆς *ΑΒ* πρὸς *ΒΓ*.

ὑποκείσθω μὲν νῦν τὸν αὐτόν, καὶ τετμήσθω ἡ *ΑΒ* δίχα κατὰ τὸ *Δ*, καὶ δι' αὐτοῦ πρὸς ὀρθὰς τῇ *ΑΒ* ἤχθω ἡ *ΕΔΖ*, καὶ γεγονέτω, ὡς ἡ *ΑΒ* πρὸς

---


3. *γεναμένην*] W, *γενομένην* p. 5. *διάμετρον*] p, m. rec. W, *καὶ ἄμετρον* m. 1 W. 9. *ὑποτιθεμένων*] scripsi, *ὑποθεμένων* Wp. 14. *τοῦ*] addidi, om. Wp. 15. *τό* (alt.)] *τά* Wp, corr. Halley. 16. *ΑΖΒ*] *ΑΒΖ* Wp, corr. Comm. *μή*] om. Wp, corr. Comm. 20. *τῷ*] scripsi, *τό* Wp. 21. *ΑΒ*] *Β* e corr. p. 22. *μὲν νῦν*] v, *μενυυ* W (*μὲν οὖν*?), *με νῦν* p. *αὐτὸν ἔχειν* Halley cum Comm.

## Ad epilogum [I p. 158, 1—15].

Diametrum originalem uocat [I p. 158, 2] sectionem in cono factam communem plani secantis trianguli que per axem positi; hanc autem etiam diametrum principalem uocat [I p. 158, 14]. et dicit, omnes proprietates sectionum, quae in propositionibus praecedentibus demonstratae sint supponentibus nobis diametros originales, etiam omnibus aliis diametris suppositis euenire posse.

## Ad prop. LIV.

Et in $AB$ planum ad planum subiacens perpendiculare erigatur, et in eo circum $AB$ circulus describatur $AEBZ$, ita ut pars diametri circuli in segmento $AEB$ posita ad partem diametri in $AZB$ positam maiorem rationem non habeat quam $AB : B\Gamma$ I p. 166, 24 — 168, 2] sint duae rectae $AB$, $B\Gamma$, et oporteat circum $AB$ circulum describere, ita ut diametrus eius ab $AB$ sic secetur, ut pars eius ad $\Gamma$ posita ad reliquam rationem habeat non maiorem quam $AB : B\Gamma$.




supponatur nunc eandem habere, et $AB$ in duas partes aequales secetur in $\Delta$, et per id ad $AB$ perpen-

In fig. $E$ m. rec. W, pro $B$ hab. $E$ e corr.

*ΒΓ, ἡ ΕΔ πρὸς ΔΖ, καὶ δίχα τετμήσθω ἡ ΕΖ· δῆλον δή, ὅτι, εἰ μὲν ἡ ΑΒ τῇ ΒΓ ἐστιν ἴση καὶ ἡ ΕΔ τῇ ΔΖ, διχοτομία ἔσται τῆς ΕΖ τὸ Δ, εἰ δὲ ἡ ΑΒ τῆς ΒΓ μείζων καὶ ἡ ΕΔ τῆς ΔΖ, ἡ διχοτομία κατωτέρω ἐστὶ τοῦ Δ, εἰ δὲ ἡ ΑΒ τῆς ΒΓ ἐλάσσων, ἀνωτέρω.*

*ἔστω δὲ νῦν τέως κατωτέρω ὡς τὸ Η, καὶ κέντρῳ τῷ Η διαστήματι τῷ ΗΖ κύκλος γεγράφθω· δεῖ δὴ διὰ τῶν Α, Β σημείων ἥξειν ἢ ἐσωτέρω ἢ ἐξωτέρω. καὶ εἰ μὲν διὰ τῶν Α, Β σημείων ἔρχοιτο, γεγονὸς ἂν εἴη τὸ ἐπιταχθέν· ὑπερπιπτέτω δὲ τὰ Α, Β, καὶ ἐκβληθεῖσα ἐφ' ἑκάτερα ἡ ΑΒ συμπιπτέτω τῇ περιφερείᾳ κατὰ τὰ Θ, Κ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΖΘ, ΘΕ, ΕΚ, ΚΖ, καὶ ἤχθω διὰ τοῦ Β τῇ μὲν ΖΚ παράλληλος ἡ ΜΒ, τῇ δὲ ΚΕ ἡ ΒΛ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΜΑ, ΑΛ· ἔσονται δὴ καὶ αὐταὶ παράλληλοι ταῖς ΖΘ, ΘΕ διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν μὲν ΑΔ τῇ ΔΒ, τὴν δὲ ΔΘ τῇ ΔΚ καὶ πρὸς ὀρθὰς εἶναι τὴν ΖΔΕ τῇ ΘΚ. καὶ ἐπεὶ ὀρθή ἐστιν ἡ πρὸς τῷ Κ γωνία, καὶ παράλληλοι αἱ ΜΒΛ ταῖς ΖΚΕ, ὀρθὴ ἄρα καὶ ἡ πρὸς τῷ Β· διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ πρὸς τῷ Α. ὥστε ὁ περὶ τὴν ΜΛ κύκλος γραφόμενος ἥξει διὰ τῶν Α, Β. γεγράφθω ὡς ὁ ΜΑΛΒ. καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ΜΒ τῇ ΖΚ, ἔστιν, ὡς ἡ ΖΔ πρὸς ΔΜ, ἡ ΚΔ πρὸς ΔΒ. ὁμοίως δὴ καί, ὡς ἡ ΚΔ πρὸς ΔΒ, ἡ ΕΔ πρὸς ΔΛ. καὶ*

---

3. *δέ*] *δή* p. 4. *ΕΔ*] *ΣΔ* Wp, corr. Comm. 5. *ἐστίν*, *-ίν* in ras., W. 8. *τῷ* (pr.)] p, *τό* W. 9. *ἥξειν* — 10. *σημείων*] om. p. 9. *ἥξειν*] *ἥξει* W, corr. Comm.; fort. *ἥξει* retinendum et pro *δεῖ* lin. 8 scrib. *ἤτοι*. 17. *τῇ*] p, *τήν* W. *ΔΒ*] *ΔΕ* Wp, corr. Comm. *δέ*] p, *ΔΕ* W. 18. *ΖΔΕ*] scripsi, *ΔΖΕ* Wp, *ΕΔΖ* Halley cum Comm. 19. *ΜΒΛ*] scripsi, *ΜΒΔ* Wp, *ΜΒ*, *ΒΛ* Halley cum Comm. 22. *Β*] *Γ*

dicularis ducatur $E\Delta Z$, et fiat $E\Delta : \Delta Z = AB : B\Gamma$, seceturque $EZ$ in duas partes aequales; manifestum igitur, si $AB = B\Gamma$ et $E\Delta = \Delta Z$, punctum $\Delta$ esse medium rectae $EZ$, sin $AB > B\Gamma$ et $E\Delta > \Delta Z$, punctum medium infra $\Delta$ positum esse, sin $AB < B\Gamma$, supra $\Delta$.

nunc autem infra sit positum ut $H$, et centro $H$ radio $HZ$ circulus describatur; is igitur aut per puncta $A$, $B$ ueniet aut intra ea aut extra. iam si per puncta $A$, $B$ uenerit, effectum erit, quod propositum est; cadat uero extra $A$, $B$, et $AB$ ad utramque partem producta cum ambitu in $\Theta$, $K$ concurrat, ducanturque $Z\Theta$, $\Theta E$, $EK$, $KZ$, per $B$ autem rectae $ZK$ parallela ducatur $MB$, rectae $KE$ autem parallela $B\Lambda$, ducanturque $M\Lambda$, $A\Lambda$; eae igitur et ipsae rectis $Z\Theta$, $\Theta E$ parallelae erunt, quia $A\Delta = \Delta B$, $\Delta\Theta = \Delta K$, et $Z\Delta E$ ad $\Theta K$ perpendicularis [Eucl. I, 4]. et quoniam angulus ad $K$ positus rectus est, et $MB$, $B\Lambda$ rectis $ZK$, $KE$ parallelae, erit etiam angulus ad $B$ positus rectus; eadem de causa etiam angulus ad $A$ positus rectus est. quare circulus circum $M\Lambda$ descriptus per $A$, $B$ ueniet [Eucl. III, 31]. describatur ut $MA\Lambda B$. et quoniam $MB$, $ZK$ parallelae sunt, erit [Eucl. VI, 4] $Z\Delta : \Delta M = K\Delta : \Delta B$. iam eodem modo erit $K\Delta : \Delta B = E\Delta : \Delta\Lambda$.[1]) et permutando $E\Delta : \Delta Z = \Lambda\Delta : \Delta M = AB : B\Gamma$.

1) Post $\Delta\Lambda$ lin. 25 excidisse uidentur haec fere: ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ $Z\Delta$ πρὸς $\Delta M$, ἡ $E\Delta$ πρὸς $\Delta\Lambda$.

Wp, corr. Comm. 23. $MA\Lambda B$] $MAAB$ Wp, corr. Comm. 25. $\Delta B$] $B$ e corr. m. 1 W. $\Delta\Lambda$] $AA$ Wp, corr. Comm.

ἐναλλάξ, ὡς ἡ *ΕΔ* πρὸς *ΔΖ*, τουτέστιν ἡ *ΑΒ* πρὸς *ΒΓ*, ἡ *ΛΔ* πρὸς *ΔΜ*.

ὁμοίως δέ, κἂν ὁ γραφόμενος περὶ τὴν *ΖΕ* κύκλος τέμνοι τὴν *ΑΒ*, τὸ αὐτὸ δειχθήσεται.

## Εἰς τὸ νε΄.

Καὶ ἐπὶ τῆς *ΑΔ* γεγράφθω ἡμικύκλιον τὸ *ΑΖΔ*, καὶ ἤχθω τις εἰς τὸ ἡμικύκλιον παράλληλος τῇ *ΑΘ* ἡ *ΖΗ* ποιοῦσα τὸν τοῦ ἀπὸ *ΖΗ* πρὸς τὸ ὑπὸ *ΔΗΑ* λόγον τὸν αὐτὸν τῷ τῆς *ΓΑ* πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς *ΑΔ*] ἔστω ἡμικύκλιον τὸ *ΑΒΓ* ἐπὶ διαμέτρου τῆς *ΑΓ*, ὁ δὲ δοθεὶς λόγος ὁ τῆς *ΕΖ* πρὸς *ΖΗ*, καὶ δέον ἔστω ποιῆσαι τὰ προκείμενα.

κείσθω τῇ *ΕΖ* ἴση ἡ *ΖΘ*, καὶ τετμήσθω ἡ *ΘΗ* δίχα κατὰ τὸ *Κ*, καὶ ἤχθω ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ τυχοῦσα εὐθεῖα ἡ *ΓΒ* ἐν γωνίᾳ τῇ ὑπὸ *ΑΓΒ*, καὶ ἀπὸ τοῦ *Λ* κέντρου ἤχθω ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἡ *ΛΣ* καὶ ἐκβληθεῖσα συμβαλλέτω τῇ περιφερείᾳ κατὰ τὸ *Ν*, καὶ διὰ τοῦ *Ν* τῇ *ΓΒ* παράλληλος ἤχθω ἡ *ΝΜ*· ἐφάψεται ἄρα τοῦ κύκλου. καὶ πεποιήσθω, ὡς ἡ *ΖΘ* πρὸς *ΘΚ*, ἡ *ΜΞ* πρὸς *ΞΝ*, καὶ κείσθω τῇ *ΞΝ* ἴση ἡ *ΝΟ*, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ *ΛΞ*, *ΛΟ* τέμνουσαι τὸ ἡμικύκλιον κατὰ τὰ *Π*, *Ρ*, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ *ΠΡΔ*.

ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ *ΞΝ* τῇ *ΝΟ*, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ *ΝΛ*, ἴση ἄρα καὶ ἡ *ΛΟ* τῇ *ΛΞ*. ἔστι δὲ καὶ ἡ *ΛΠ* τῇ *ΛΡ*· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ *ΠΟ* τῇ *ΡΞ*


1. *ΔΖ*, τουτέστιν] scripsi, *ΔΖΤ* οὔτε ἐστίν Wp. 2. *ΛΔ*] *ΑΔ* Wp, corr. Comm. 4. τέμνοι] Wp. 5. νε΄] in ras. plur. litt. W. 9. τῷ] in ras. m. 1 W. 15. *ΑΓΒ*] e corr. p. 16. *ΛΣ*] scripsi, *ΛΕ* Wp. 22. *Ρ*, *Π* Comm. 23. *ΝΟ*] *ΝΘ* Wp, corr. Comm. 24. *ΝΛ*] *ΜΛ* Wp, corr. Comm. ἔστιν W. 25. τῇ (pr.)] ἴση τῇ Halley.

et similiter etiam, si circulus circum $ZE$ descriptus rectam $AB$ secat, idem demonstrabitur.

## Ad prop. LV.

Et in $A\Delta$ semicirculus describatur $AZ\Delta$, ad semicirculum autem recta ducatur $ZH$ rectae $A\Theta$ parallela, quae faciat
$ZH^2 : \Delta H \times HA = \Gamma A : 2 A\Delta$ I p. 172, 8—12]
sit $AB\Gamma$ semicirculus in diametro $A\Gamma$, data autem ratio $EZ : ZH$, et oporteat efficere, quod propositum est.

ponatur $Z\Theta = EZ$, et $\Theta H$ in $K$ in duas partes aequales secetur, ducaturque in semicirculo recta aliqua $\Gamma B$ in angulo $A\Gamma B$, et ab $\Lambda$ centro ad eam




perpendicularis ducatur $\Lambda\Sigma$ productaque cum ambitu in $N$ concurrat, et per $N$ rectae $\Gamma B$ parallela ducatur $NM$; ea igitur circulum continget [Eucl. III, 16 coroll.]. et fiat $M\Xi : \Xi N = Z\Theta : \Theta K$, ponaturque $NO = \Xi N$, et ducantur $\Lambda\Xi$, $\Lambda O$ semicirculum in $\Pi$, $P$ secantes, ducaturque $\Pi P \Delta$.

quoniam igitur $\Xi N = NO$, communis autem et perpendicularis $N\Lambda$, erit etiam $\Lambda O = \Lambda\Xi$ [Eucl. I, 4]. uerum etiam $\Lambda\Pi = \Lambda P$; quare etiam reliqua $\Pi O = P\Xi$.

---

In fig. pro $\Sigma$ hab. $E$ W, pro $\Pi$ hab. $H$ (hoc corr. w).

ἐστιν ἴση. παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΠΡΔ τῇ ΜΟ. καί ἐστιν, ὡς ἡ ΖΘ πρὸς ΘΚ, ἡ ΜΞ πρὸς ΝΞ· ὡς δὲ ἡ ΘΚ πρὸς ΘΗ, ἡ ΝΞ πρὸς ΞΟ· δι' ἴσου ἄρα, ὡς ἡ ΘΖ πρὸς ΘΗ, ἡ ΜΞ πρὸς ΞΟ· ἀνάπαλιν, ὡς ἡ ΗΘ πρὸς ΘΖ, ἡ ΟΞ πρὸς ΞΜ· συνθέντι, ὡς ἡ ΗΖ πρὸς ΖΘ, τουτέστι πρὸς ΖΕ, ἡ ΟΜ πρὸς ΜΞ, τουτέστιν ἡ ΠΔ πρὸς ΔΡ. ὡς δὲ ἡ ΠΔ πρὸς ΔΡ, τὸ ὑπὸ ΠΔΡ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΡ, ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ ΠΔΡ τῷ ὑπὸ ΑΔΓ· ὡς ἄρα ἡ ΗΖ πρὸς ΖΕ, τὸ ὑπὸ ΑΔΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΡ. ἀνάπαλιν ἄρα, ὡς ἡ ΕΖ πρὸς ΖΗ, τὸ ἀπὸ ΔΡ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΔΓ.

## Εἰς τὸ νη'.

*Καὶ ἐπὶ τῆς ΑΕ γεγράφθω ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΖ, καὶ τῇ ΑΔ παράλληλος ἤχθω ἐν αὐτῷ ἡ ΖΗ λόγον ποιοῦσα τὸν τοῦ ἀπὸ ΖΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΗΕ τὸν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς ΑΕ*] ἔστω ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ καὶ ἐν αὐτῷ εὐθεῖά τις ἡ ΑΒ, καὶ κείσθωσαν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ ΔΕ, ΕΖ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΕΖ ἐπὶ τὸ Η, καὶ τῇ ΔΕ ἴση κείσθω ἡ ΖΗ, καὶ τετμήσθω ὅλη ἡ ΕΗ δίχα κατὰ τὸ Θ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Κ, καὶ ἀπ' αὐτοῦ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΒ ἤχθω καὶ συμβαλλέτω τῇ περιφερείᾳ κατὰ τὸ Λ, καὶ διὰ τοῦ Λ τῇ ΑΒ παράλληλος ἤχθω ἡ ΛΜ, καὶ ἐκβλη-


1. ἡ — 2. ἐστιν] om. Wp, corr. Halley cum Comm. 3. ΘΗ] ΘΝ p. 4. ΘΗ] ΘΝ p. ΞΟ] corr. ex ΞΑ W. ἀνάπαλιν] διὸ πάλιν Wp, corr. Comm. 5. ΗΘ] corr. ex ΘΖ m. 1 W. ΘΖ] Ζ in ras. W. ΟΞ] Ο in ras. W. 6. τουτέστιν W. ΟΜ] ΘΜ Wp, corr. Comm. 11. ΑΔΓ] ΔΑΓ Wp, corr. Comm. 12. νη'] om. Wp. 15. ποιοῦσα] ποι- in ras. W. 16. τὸν τῆς] τὸν αὐτὸν τῷ τῆς Halley cum Comm. 19. τό] p, τῷ W. 22. τό] p, τῷ W. 23. Λ] e corr. m. 2 W.

et similiter etiam, si circulus circum $ZE$ descriptus rectam $AB$ secat, idem demonstrabitur.

## Ad prop. LV.

Et in $A\varDelta$ semicirculus describatur $AZ\varDelta$, ad semicirculum autem recta ducatur $ZH$ rectae $A\Theta$ parallela, quae faciat
$ZH^2 : \varDelta H \times HA = \Gamma A : 2A\varDelta$ I p. 172, 8—12]
sit $AB\Gamma$ semicirculus in diametro $A\Gamma$, data autem ratio $EZ:ZH$, et oporteat efficere, quod propositum est.

ponatur $Z\Theta = EZ$, et $\Theta H$ in $K$ in duas partes aequales secetur, ducaturque in semicirculo recta aliqua $\Gamma B$ in angulo $A\Gamma B$, et ab $\varLambda$ centro ad eam




perpendicularis ducatur $\varLambda\Sigma$ productaque cum ambitu in $N$ concurrat, et per $N$ rectae $\Gamma B$ parallela ducatur $NM$; ea igitur circulum continget [Eucl. III, 16 coroll.]. et fiat $M\Xi : \Xi N = Z\Theta : \Theta K$, ponaturque $NO = \Xi N$, et ducantur $\varLambda\Xi$, $\varLambda O$ semicirculum in $\Pi$, $P$ secantes, ducaturque $\Pi P\varDelta$.

quoniam igitur $\Xi N = NO$, communis autem et perpendicularis $N\varLambda$, erit etiam $\varLambda O = \varLambda\Xi$ [Eucl. I, 4]. uerum etiam $\varLambda\Pi = \varLambda P$; quare etiam reliqua $\Pi O = P\Xi$.

---

In fig. pro $\Sigma$ hab. $E$ W, pro $\Pi$ hab. $H$ (hoc corr. w).

θεῖσα ἡ ΚΛ συμβαλλέτω τῇ ΛΜ κατὰ τὸ Μ, καὶ πεποιήσθω, ὡς ἡ ΘΖ πρὸς ΖΗ, ἡ ΛΜ πρὸς ΜΝ, καὶ τῇ ΛΝ ἴση ἔστω ἡ ΛΞ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΝΚ, ΚΞ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν, καὶ ἀναπληρωθεὶς ὁ κύκλος τεμνέτω αὐτὰς κατὰ τὰ Π, Ο, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΟΡΠ.

ἐπεὶ οὖν ἐστιν, ὡς ἡ ΖΘ πρὸς ΖΗ, ἡ ΛΜ πρὸς ΜΝ, συνθέντι, ὡς ἡ ΘΗ πρὸς ΗΖ, ἡ ΛΝ πρὸς ΝΜ· ἀνάπαλιν, ὡς η ΖΗ πρὸς ΗΘ, ἡ ΝΜ πρὸς ΝΛ, ὡς δὲ ἡ ΖΗ πρὸς ΗΕ, ἡ ΜΝ πρὸς ΝΞ· διελόντι, ὡς ἡ ΖΗ πρὸς ΖΕ, ἡ ΝΜ πρὸς ΜΞ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΝΛ τῇ ΛΞ, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΛΚ, ἴση ἄρα καὶ ἡ ΚΝ τῇ ΚΞ. ἔστι δὲ καὶ ἡ ΚΟ τῇ ΚΠ ἴση· παράλληλος ἄρα ἡ ΝΞ τῇ ΟΠ. ὅμοιον ἄρα τὸ ΚΜΝ τρίγωνον τῷ ΟΚΡ τριγώνῳ καὶ τὸ ΚΜΞ τῷ ΠΡΚ. ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΚΜ πρὸς ΚΡ, ἡ ΜΝ πρὸς ΡΟ. ἀλλὰ καί, ὡς αὐτὴ ἡ ΚΜ πρὸς ΚΡ, ἡ ΜΞ πρὸς ΠΡ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΝΜ πρὸς ΡΟ, ἡ ΜΞ πρὸς ΠΡ· καὶ ἐναλλάξ, ὡς ἡ ΝΜ πρὸς ΜΞ, ἡ ΟΡ πρὸς ΡΠ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΝΜ πρὸς ΜΞ, ἡ ΗΖ πρὸς ΖΕ, τουτέστιν ἡ ΔΕ πρὸς ΕΖ, ὡς δὲ ἡ ΟΡ πρὸς ΡΠ, τὸ ἀπὸ ΟΡ πρὸς τὸ ὑπὸ ΟΡΠ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΔΕ πρὸς ΕΖ, τὸ ἀπὸ ΟΡ πρὸς τὸ ὑπὸ ΟΡΠ. ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ ΟΡΠ τῷ ὑπὸ ΑΡΓ. ὡς ἄρα ἡ ΔΕ πρὸς ΕΖ, τὸ ἀπὸ ΟΡ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΡΓ.

3. ἔστω] -ω in ras. W. 5. Ο, Π Halley cum Comm. 10. δέ] ἄρα? 12. ΛΞ] ΛΖ Wp, corr. Comm. 13. ἔστιν W. 15. ΚΜΝ] ΚΜ Wp, corr. Comm. τῷ] corr. ex τό W. 17. αὐτή] ἡ αὐτή? 18. ΝΜ] ΗΜ Wp, corr. Halley, *mn* Comm. 20. ΗΖ] p, Ζ W. 25. ΑΡΓ] ΑΡΟ Wp, corr. Comm.

$AB$, ponanturque duae rectae inaequales $\Delta E$, $EZ$, et $EZ$ ad $H$ producatur, ponaturque $ZH = \Delta E$, et tota $EH$ in $\Theta$ in duas partes aequales secetur, centrum autem circuli sumatur $K$, et a $K$ ad $AB$ perpendicularis ducatur et cum ambitu in $\Lambda$ concurrat, per $\Lambda$ autem rectae $AB$ parallela ducatur $\Lambda M$, productaque $K\Lambda$ cum $\Lambda M$ in $M$ concurrat, et fiat

$$\Theta Z : ZH = \Lambda M : MN,$$

sitque $\Lambda \Xi = \Lambda N$, ducanturque $NK$, $K\Xi$ et producantur, circulusque expletus eas in $\Pi$, $O$ secet, ducaturque $OP\Pi$.

quoniam igitur $Z\Theta : ZH = \Lambda M : MN$, componendo est $\Theta H : HZ = \Lambda N : NM$; e contrario

$$ZH : H\Theta = NM : N\Lambda$$

et $ZH : HE = MN : N\Xi$; dirimendo

$$ZH : ZE = NM : M\Xi.$$

et quoniam $N\Lambda = \Lambda\Xi$, communis autem et perpendicularis $\Lambda K$, erit etiam [Eucl. I, 4] $KN = K\Xi$. uerum etiam $KO = K\Pi$; parallelae igitur sunt $N\Xi$, $O\Pi$. itaque similes sunt trianguli $KMN$, $OKP$ et $KM\Xi$, $\Pi PK$ [Eucl. I, 29; I, 15]. quare

$$KM : KP = MN : PO \text{ [Eucl. VI, 4].}$$

est autem etiam $KM : KP = M\Xi : \Pi P$ [ib.]; quare etiam $NM : PO = M\Xi : \Pi P$, et permutando

$$NM : M\Xi = OP : P\Pi.$$

uerum $NM : M\Xi = HZ : ZE = \Delta E : EZ$ et

$$OP : P\Pi = OP^2 : OP \times P\Pi;$$

quare etiam $\Delta E : EZ = OP^2 : OP \times P\Pi$. est autem $OP \times P\Pi = AP \times P\Gamma$ [Eucl. III, 35]. ergo

$$\Delta E : EZ = OP^2 : AP \times P\Gamma.$$

---

*Εἴρηται μὲν ἐν τοῖς μετὰ τὸ ι′ θεώρημα σχολίοις ὁ σκοπὸς τῶν ιγ̅ πρώτων θεωρημάτων καὶ ἐν τοῖς εἰς τὸ ἑκκαιδέκατον ὁ τῶν ἑξῆς τριῶν, δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι ἐν μὲν τῷ ιζ′ φησίν, ὅτι ἡ διὰ τῆς κορυφῆς παρὰ τεταγμένως κατηγμένην ἀγομένη ἐκτὸς πίπτει, ἐν δὲ τῷ ιη′ φησίν, ὅτι ἡ παράλληλος τῇ ὁπωσοῦν ἐφαπτομένῃ ἐντὸς τῆς τομῆς ἀγομένη τεμεῖ τὴν τομήν, ἐν τῷ ιθ′, ὅτι ἡ ἀπό τινος σημείου τῆς διαμέτρου παρὰ τεταγμένως κατηγμένην συμπίπτει τῇ τομῇ, ἐν τῷ κ′ καὶ κα′ τὰς καταγομένας ζητεῖ τῶν τομῶν, ὅπως ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας καὶ τὰ τῆς διαμέτρου ὑπ᾽ αὐτῶν γινόμενα τμήματα, ἐν τῷ κβ′ καὶ κγ′ λέγει περὶ τῆς εὐθείας τῆς κατὰ δύο σημεῖα τῇ τομῇ συμπιπτούσης, ἐν τῷ κδ′ καὶ κε′ περὶ τῆς εὐθείας τῆς καθ᾽ ἓν τῇ τομῇ συμπιπτούσης, τουτέστιν ἐφαπτομένης, ἐν τῷ κϛ′ περὶ τῆς ἀγομένης παραλλήλου τῇ διαμέτρῳ τῆς παραβολῆς καὶ τῆς ὑπερβολῆς, ἐν τῷ κζ′ περὶ τῆς τεμνούσης τὴν διάμετρον τῆς παραβολῆς, ὅτι κατ᾽ ἀμφότερα μέρη συμπίπτει τῇ τομῇ, ἐν τῷ κη′ περὶ τῆς ἀγομένης παραλλήλου τῇ ἐφαπτομένῃ μιᾶς τῶν ἀντικειμένων, ἐν τῷ κθ′ περὶ τῆς διὰ τοῦ κέντρου τῶν ἀντικειμένων ἐκβαλλομένης, ἐν τῷ λ′ φησιν, ὅτι διχοτομεῖται ἡ διὰ τοῦ κέντρου ἐκβαλλομένη τῆς ἐλλείψεως καὶ τῶν ἀντικειμένων, ἐν τῷ λα′ φησίν, ὅτι ἐπὶ τῆς ὑπερβολῆς ἡ ἐφαπτομένη τὴν διάμετρον τέμνει μεταξὺ τῆς κορυφῆς καὶ τοῦ κέντρου, ἐν τῷ λβ′ καὶ γ′ καὶ δ′ καὶ ε′ καὶ ϛ′ περὶ τῶν ἐφαπτομένων ποιεῖται τὸν λόγον, ἐν τῷ*

---

1. *τό*] e corr. W. 7. *ἐφαπτομένῃ*] scripsi, *ἐφησαπτομένῃ* Wp, *ἁπτομένῃ* Halley (et ita debuit dici). *τέμη* p. 8. *ιθ′*] e corr. p. *ὅτι*] om. Wp, corr. Halley. 9. *κατηγμένη* Halley. 10. *κα′*] *α* e corr. p. *τάς*] om. p. 11.

In scholiis post prop. X [supra p. 214] dictum est, quid XIII primis theorematis sit propositum, et in scholiis ad prop. XVI [supra p. 222, 24 et p. 224], quid tribus sequentibus propositum, sciendum autem, in prop. XVII eum dicere, rectam per uerticem rectae ordinate ductae parallelam ductam extra cadere, in prop. XVIII autem dicit, rectam rectae quoquo modo tangenti intra sectionem parallelam ductam sectionem secare, in prop. XIX autem, rectam ab aliquo puncto diametri rectae ordinate ductae parallelam cum sectione concurrere, in propp. XX et XXI quaerit, quo modo rectae in sectionibus ordinate ductae inter se et ad partes diametri ab iis effectas se habeant, in propp. XXII et XXIII de recta loquitur, quae cum sectione in duobus punctis concurrit, in propp. XXIV—XXV de recta, quae cum sectione in uno puncto concurrit siue contingit, in prop. XXVI de recta diametro parabolae hyperbolaeque parallela ducta, in prop. XXVII rectam diametrum parabolae secantem utrimque cum sectione concurrere, in prop. XXVIII de recta, quae rectae alterutram oppositarum contingenti parallela ducitur, in prop. XXIX de recta per centrum oppositarum producta, in prop. XXX dicit, rectam per centrum ellipsis oppositarumque productam in duas partes aequales secari, in prop. XXXI dicit, in hyperbola rectam contingentem inter uerticem centrumque diametrum secare, in propp. XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI de

---

*ἔχουσιν* W. 17. *τεμνούσης*] p, *τεμούσης* W. 19. *τομῇ*] *τὸ* (μ suprascr.) p, *τό* W. 26. *γ′*] e corr. p.

λζ′ περὶ τῶν ἐφαπτομένων καὶ τῶν ἀπὸ τῆς ἁφῆς κατηγμένων τῆς ἐλλείψεως καὶ τῆς ὑπερβολῆς, ἐν τῷ λη′ περὶ τῶν ἐφαπτομένων τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, ὅπως ἔχουσι πρὸς τὴν δευτέραν διάμετρον, ἐν τῷ λθ′ καὶ μ′ περὶ τῶν αὐτῶν ποιεῖται τὸν λόγον τοὺς συγκειμένους ἐκ τούτων λόγους ἐπιζητῶν, ἐν τῷ μα′ περὶ τῶν ἀναγραφομένων παραλληλογράμμων ἀπὸ τῆς κατηγμένης καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, ἐν τῷ μβ′ ἐπὶ τῆς παραβολῆς λέγει ἴσον εἶναι τὸ ὑπὸ τῆς ἐφαπτομένης καὶ τῆς κατηγμένης καταλαμβανόμενον τρίγωνον τῷ ἰσοϋψεῖ αὐτῷ παραλληλογράμμῳ, ἡμίσειαν δ' ἔχοντι βάσιν, ἐν τῷ μγ′ ἐπὶ τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως ζητεῖ, πῶς ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τὰ ὑπὸ τῶν ἐφαπτομένων καὶ τῶν κατηγμένων ἀπολαμβανόμενα τρίγωνα, ἐν τῷ μδ′ τὸ αὐτὸ ἐν ταῖς ἀντικειμέναις, ἐν τῷ με′ τὸ αὐτὸ ἐπὶ τῆς δευτέρας διαμέτρου τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, ἐν τῷ μς′ περὶ τῶν μετὰ τὴν ἀρχικὴν διάμετρον τῆς παραβολῆς ἑτέρων, ἐν τῷ μζ′ περὶ τῶν ἑτέρων διαμέτρων τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, ἐν τῷ μη′ περὶ τῶν ἑτέρων διαμέτρων τῶν ἀντικειμένων, ἐν τῷ μθ′ περὶ τῶν παρ' ἃς δύνανται αἱ καταγόμεναι ἐπὶ τὰς ἑτέρας διαμέτρους τῆς παραβολῆς, ἐν τῷ ν′ περὶ τοῦ αὐτοῦ τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, ἐν τῷ να′ περὶ τοῦ αὐτοῦ τῶν ἀντικειμένων. ταῦτα εἰπὼν καὶ προσθεὶς τοῖς εἰρημένοις

---

4. ἔχουσιν W. 11. καταλαμβανόμενον] Halley, καταλαμβάνον Wp. 14. ἔχουσιν W. 17. ἐπί] e corr. p.

contingentibus loquitur, in prop. XXXVII de contingentibus et de rectis, quae a puncto contactus in ellipsi hyperbolaque ordinate ducuntur, in prop. XXXVIII de rectis hyperbolam ellipsimque contingentibus, quo modo ad alteram diametrum se habeant, in propp. XXXIX et XL de iisdem loquitur rationes ex iis compositas quaerens, in prop. XLI de parallelogrammis in recta ordinate ducta radioque hyperbolae ellipsisque descriptis, in prop. XLII in parabola dicit triangulum a contingenti et recta ordinate ducta comprehensum aequalem esse parallelogrammo, quod eandem altitudinem habeat, basim autem dimidiam, in prop. XLIII in hyperbola ellipsique quaerit, quo modo trianguli a contingentibus rectisque ordinate ductis abscisi inter se habeant, in prop. XLIV idem in oppositis, in prop. XLV idem in altera diametro hyperbolae ellipsisque, in prop. XLVI de ceteris diametris parabolae praeter principalem, in prop. XLVII de ceteris diametris hyperbolae ellipsisque, in prop. XLVIII de ceteris diametris oppositarum, in prop. XLIX de parametris ceterarum diametrorum parabolae, in prop. L de eodem in hyperbola ellipsique, in prop. LI de eodem in oppositis. his dictis et epilogo quodam dictis adiecto [I p. 158] in propp. LII et LIII problema demonstrat, quo modo fieri possit, ut in plano parabola describatur, in propp. LIV

19. ἀρχικήν] p, ἀρχήν W. 21. τῶν (alt.)] Halley, om. p et extr. lin. W.

*ἐπίλογόν τινα ἐν τῷ νβ' καὶ νγ' δεικνύει πρόβλημα, ὡς δυνατὸν ἐν ἐπιπέδῳ γράψαι τὴν παραβολήν, ἐν τῷ νδ' καὶ νε' λέγει, πῶς δεῖ γράψαι τὴν ὑπερβολήν, ἐν τῷ νϛ' καὶ νζ' καὶ νη', πῶς δεῖ γράψαι τὴν ἔλλειψιν, ἐν τῷ νθ' λέγει, πῶς δεῖ γράφειν ἀντικειμένας, ἐν τῷ ξ' περὶ τῶν συζύγων ἀντικειμένων.*

4. *καί*] bis (comp.) p. *νζ'*] *ζ* e corr. p. *νη'*] *η* e corr. p. In fine: *πεπλήρωται σὺν θεῷ τὸ ὑπόμνημα τοῦ ᾱ βιβλίου τῶν κωνικῶν* Wp.

et LV dicit, quo modo hyperbola describenda sit, in propp. LVI, LVII, LVIII, quo modo ellipsis describenda sit, in prop. LIX dicit, quo modo oppositae describendae sint, in prop. LX de oppositis coniugatis.

## Εἰς τὸ δεύτερον.

Ἀρχόμενος τοῦ β' βιβλίου τῶν Κωνικῶν, ὦ φίλτατέ μοι Ἀνθέμιε, τοσοῦτον οἶμαι δεῖν προειπεῖν, ὅτι τοσαῦτα μόνα εἰς αὐτὸ γράφω, ὅσα ἂν μὴ ᾖ δυνατὸν διὰ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ νοηθῆναι.

## Εἰς τὸ α'.

Τὸ πρῶτον θεώρημα πτῶσιν οὐκ ἔχει, εἰ μὴ ἄρα .... τοῦτο γὰρ τῇ καταγραφῇ διαφορὰν οὐ ποιεῖ· αἱ γὰρ ΔΓ, ΓΕ ἀσύμπτωτοί τέ εἰσι τῇ τομῇ καὶ αἱ αὐταὶ διαμένουσι κατὰ πᾶσαν διάμετρον καὶ ἐφαπτομένην.

## Εἰς τὸ β'.

Τοῦτο τὸ θεώρημα πτῶσιν οὐκ ἔχει. ἡ μέντοι ΒΘ πάντως τεμεῖ τὴν τομὴν κατὰ δύο σημεῖα. ἐπεὶ γὰρ παράλληλός ἐστι τῇ ΓΔ, συμπεσεῖται τῇ ΓΘ· ὥστε πρότερον τῇ τομῇ συμπεσεῖται.

## Εἰς τὸ ια'.

Ἔν τισιν ἀντιγράφοις τὸ θεώρημα τοῦτο ἄλλως δείκνυται.

---

1. *Εὐτοκίου Ἀσκαλωνίτου εἰς τὸ δεύτερον* (β' p) *τῶν Ἀπολλωνίου κωνικῶν τῆς κατ' αὐτὸν ἐκδόσεως ὑπόμνημα* Wp. 4. *ὅσα*] scripsi, *ὡς* Wp. *μή*] addidi, om. Wp. 8. Post *ἄρα*

## In librum II.

Alterum librum Conicorum ordiens, Anthemie amicissime, hoc praemittendum censeo, me ea sola ad eum adnotare, quae ex iis, quae in librum primum scripta sint, non possint intellegi.

### Ad prop. I.

Propositio prima casum non habet, nisi quod *ΔB* non semper axis est; hoc autem ad figuram nihil interest. nam *ΔΓ*, *ΓE* asymptotae sunt sectionis et eaedem manent qualibet diametro contingentique sumpta.

### Ad prop. II.

Haec propositio casum non habet. *BΘ* uero semper sectionem in duobus punctis secabit; nam quoniam rectae *ΓΔ* parallela est, cum *ΓΘ* concurret; quare prius cum sectione concurret.

### Ad prop. XI.

In quibusdam codicibus haec propositio aliter demonstratur.

---

magnam lacunam hab. Wp; explenda sic fere: *ὅτι ἡ AB οὐ πάντως ἄξων ἐστίν.* *γάρ*] fort. scr. *δέ*. 9. *εἰσιν* Wp. *τῇ*] scripsi, *ἐν τῇ* Wp. *αἱ*] addidi, om. Wp. 10. *διαμένουσιν* W. 15. *ΓΔ*] *EΘ* Wp, corr. Comm. 18. *τισιν*] p, *τοῖς* W.

Ἔστω ὑπερβολή, ἧς ἀσύμπτωτοι αἱ ΑΒ, ΒΓ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείας ἡ ΒΕΔ, καὶ ἤχθω τις ἡ ΕΖ, ὡς ἔτυχεν, τέμνουσα τὰς ΔΒ, ΒΑ. λέγω, ὅτι συμπεσεῖται τῇ τομῇ.

εἰ γὰρ δυνατόν, μὴ συμπιπτέτω, καὶ διὰ τοῦ Β τῇ ΕΖ παράλληλος ἤχθω ἡ ΒΗ. ἡ ΒΗ ἄρα διάμετρός ἐστι τῆς τομῆς. καὶ παραβεβλήσθω παρὰ τὴν ΕΖ τῷ ἀπὸ ΒΗ ἴσον παραλληλόγραμμον ὑπερβάλλον εἴδει τετραγώνῳ καὶ ποιείτω τὸ ὑπὸ ΕΘΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΘΒ καὶ ἐκβεβλήσθω· συμπεσεῖται δὴ τῇ τομῇ. συμπιπτέτω κατὰ τὸ Κ, καὶ διὰ τοῦ Κ τῇ ΒΗ παράλληλος ἤχθω ἡ ΚΑΔ. τὸ ἄρα ὑπὸ ΔΚΑ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΒΗ· ὥστε καὶ τῷ ὑπὸ ΕΘΖ· ὅπερ ἄτοπον, ἐπείπερ ἡ ΑΔ παράλληλός ἐστι τῇ ΕΘ. ἡ ΕΖ ἄρα συμπεσεῖται τῇ τομῇ.


φανερὸν δή, ὅτι καὶ καθ' ἓν μόνον σημεῖον· παράλληλος γάρ ἐστι τῇ ΒΗ διαμέτρῳ.

## Εἰς τὸ ιβ'.

Ηὑρέθη ἔν τισιν ἀντιγράφοις τοῦτο τὸ θεώρημα δεικνύμενον διὰ δύο παραλλήλων ἀγομένων τῇ ἐφαπτομένῃ, μιᾶς μὲν διὰ τοῦ Δ, ἑτέρας δὲ διὰ τοῦ Η· καὶ ἡ ἀπόδειξις διὰ συνθέσεως λόγων ἐδείκνυτο. ἐπελεξά-

1. ὑπερβολή — ΒΓ] om. Wp magna lacuna relicta; suppleuit Comm. 3. ἔτυχε p. 7. ἐστιν W. 8. ὑπερβάλλον] corr. ex ὑπερβάλλων m. 1 W. 12. ἐστίν W. 13. ΒΗ] ΔΗ Wp, corr. Comm. 14. παράλληλός ἐστι τῇ ΕΘ] suppleui, lacunam magnam hab. Wp; „post haec uerba in graeco codice nonnulla desiderantur, qualia fortasse haec sunt: linea enim *dk* maior est quam *eh* et *ka* maior quam *hf*" Comm. fol. 47ᵛ omissis uerbis ἐπείπερ ἡ ΑΔ. ἡ ΕΖ ἄρα] suppleui praeeunte Comm., om. Wp in lac. 15. συμπεσεῖται] πεσεῖται

Sit hyperbola, cuius asymptotae sint $AB$, $B\Gamma$, et $BE\Delta$ in directum producatur, ducaturque recta aliqua $EZ$ quolibet modo rectas $\Delta B$, $BA$ secans. dico, eam cum sectione concurrere.




nam si fieri potest, ne concurrat, et per $B$ rectae $EZ$ parallela ducatur $BH$. $BH$ igitur diametrus est sectionis. et rectae $EZ$ quadrato $BH^2$ aequale parallelogrammum adplicetur figura quadrata excedens [Eucl. VI, 29] et efficiat $E\Theta \times \Theta Z$, ducaturque $\Theta B$ et producatur; concurret igitur cum sectione [prop. II]. concurrat in $K$, et per $K$ rectae $BH$ parallela ducatur $KA\Delta$. itaque erit $\Delta K \times KA = BH^2$ [prop. XI]; quare etiam $\Delta K \times KA = E\Theta \times \Theta Z$; quod absurdum est, quoniam $A\Delta$ rectae $E\Theta$ parallela est. ergo $EZ$ cum sectione concurret.

iam manifestum est, eam etiam in uno puncto solo concurrere [I, 26]; nam diametro $BH$ parallela est.

## Ad prop. XII.

In nonnullis codicibus haec propositio demonstrata reperiebatur duabus rectis contingenti parallelis ductis, altera per $\Delta$, altera per $H$; et demonstratio per

In fig. $H$ om. W.

Wp, corr. Comm. τομῇ] p, τοτμῆι W. 17. ἐστιν W. 19. εὑρέθη p. 21. $H$] e corr. m. 1 W.

μεθα δὲ ταύτην τὴν κατασκευὴν ὡς τὰ αὐτὰ δεικνῦσαν ἁπλουστέρως.

ἔχει δὲ καὶ πτώσεις ἕξ· τῶν γὰρ $EΔZ$ ἀχθεισῶν τὸ $E$ σημεῖον ἢ μεταξὺ ἔσται τῶν $Θ,B$ ἢ ἐπὶ τοῦ $B$ ἢ ἔξω τοῦ $B$, ὡς γίνονται τρεῖς, καὶ ὁμοίως ἐπὶ τοῦ $Z$ ἄλλαι τρεῖς.

Εἰς τὸ ιδ'.

Ἔν τισιν ἀντιγράφοις ηὑρέθη ἄλλως δεικνύμενον, ὅτι παντὸς τοῦ δοθέντος διαστήματος εἰς ἔλαττον ἀφικνοῦνται διάστημα.

τῶν γὰρ αὐτῶν ὑποκειμένων εἰλήφθω τοῦ δοθέντος διαστήματος ἔλαττον τὸ $EK$, καὶ πεποιήσθω, ὡς ἡ $KE$ πρὸς $EΘ$, ἡ $ΘΑ$ πρὸς $ΑΛ$, καὶ διὰ τοῦ $Λ$ τῇ $EZ$ παράλληλος ἡ $MΛB$. ἐπεὶ οὖν ἡ $ΞB$ μείζων ἐστὶ τῆς $ΛB$, ἡ $ΞB$ ἄρα πρὸς $ΘZ$ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ $ΛB$ πρὸς $ΘZ$. ὡς δὲ ἡ $ΞB$ πρὸς $ΘZ$, ἡ $ΘE$ πρὸς $MΞ$ διὰ τὸ ἴσον εἶναι τὸ ὑπὸ $ZΘE$ τῷ ὑπὸ $BΞM$· καὶ ἡ $ΘE$ ἄρα πρὸς $MΞ$ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ $ΛB$ πρὸς $ZΘ$. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ $ΛB$ πρὸς $ZΘ$, ἡ $ΛΑ$ πρὸς $ΑΘ$, ὡς δὲ ἡ $ΛΑ$ πρὸς $ΑΘ$, ἡ $ΘE$ πρὸς $EK$· καὶ ἡ $ΘE$ ἄρα πρὸς $MΞ$ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ $ΘE$ πρὸς $EK$. ἐλάσσων ἄρα ἡ $ΞM$ τῆς $KE$.

Ηὑρέθησαν δὲ ἔν τισι καὶ ταῦτα τὰ θεωρήματα

1. Post κατασκευήν magnam lacunam hab. Wp, fort. propter figuram scholii praecedentis, quam hic hab. W. 3. καί] om. p. $EΔZ$] scripsi, $EZ$ ἡ W, $EZH$ p. 4. $E$] scripsi, $Θ$ Wp. $Θ$] scripsi, $E$ Wp. Emendatio litterarum admodum incerta, quia non constat, quid Eutocius in diuisione secutus sit. 5. γίνεσθαι p. 6. ἄλλας p. 7. ιδ'] p, m. rec. W, ια' m. 1 W. 8. εὑρέθη p. 9. εἰς] εἰ p. 11. ἠλήφθω W. 14. $MΛB$] scripsi, $ΛMB$ W et, $B$ e corr., p; *mxlb* Comm. μείζων — 15. $ΞB$] addidi, om. Wp.


compositionem rationum perficiebatur. elegimus autem hanc constructionem, quia eadem simplicius ostendit.

habet autem etiam casus sex; nam ductis rectis $E\Delta$, $\Delta Z$ punctum $E$ aut inter $\Theta$, $B$ erit positum aut in $B$ aut extra $B$, ita ut tres casus oriantur, et similiter in $Z$ aliae tres.

## Ad prop. XIV.

In nonnullis codicibus aliter reperiebatur demonstratum, eas ad distantiam omni data distantia minorem peruenire.

nam iisdem suppositis data distantia minor sumatur $EK$, fiatque $\Theta A : A\Lambda = KE : E\Theta$, et per $\Lambda$ rectae




$EZ$ parallela $M\Lambda B$. quoniam igitur $\Xi B > \Lambda B$, erit

$$\Xi B : \Theta Z > \Lambda B : \Theta Z$$

[Eucl. V, 8]. est autem

$$\Xi B : \Theta Z = \Theta E : M\Xi,$$

quia $Z\Theta \times \Theta E = B\Xi \times \Xi M$ [prop. X]; quare etiam

$$\Theta E : M\Xi > \Lambda B : Z\Theta.$$

est autem $\Lambda B : Z\Theta = A\Lambda : A\Theta$ [Eucl. VI, 4] et $\Lambda A : A\Theta = \Theta E : EK$. itaque etiam $\Theta E : M\Xi > \Theta E : EK$. ergo $\Xi M < KE$ [Eucl. V, 10].

In nonnullis autem codicibus hae quoque propo-

---

Fig. in W paullo aliter descripta est ducta inter $EZ$, $MB$ iis parallela $\Delta N$ et ab $N$ ad $MB$ recta. litt. $E$, $\Xi$, $K$ om. W.

---

15. ἄρα] del. Halley cum Comm. $\Theta Z$] $OZ$ Wp, corr. Comm. 16. $\Theta Z$ (alt.)] p, e corr. W. 19. $Z\Theta$ (pr.)] scripsi, $E\Xi\Theta$ Wp, *hf* Comm. $\Lambda B$] $AB$? p. 21. καί — 22. $EK$] om. p. 21. ἄρα] om. W, corr. Halley. 23. εὑρέθησαν p. τισιν W. καί] ἀντιγράφοις p.

ἐγγεγραμμένα, ἅπερ ὡς περιττὰ ἀφῃρέθη ὑφ' ἡμῶν· δεδειγμένου γὰρ τούτου, ὅτι αἱ ἀσύμπτωτοι ἔγγιον προσάγουσι τῇ τομῇ καὶ παντὸς τοῦ δοθέντος εἰς ἔλαττον ἀφικνοῦνται, περιττὸν ἦν ταῦτα ζητεῖν. ἀμέλει οὐδὲ ἀποδείξεις ἔχουσί τινας, ἀλλὰ διαφορὰς καταγραφῶν. ἵνα δὲ τοῖς ἐντυγχάνουσι τὴν ἡμέραν δήλην ποιήσωμεν, ἐκκείσθω ἐνταῦθα τὰ ὡς περιττὰ ἀφῃρημένα.

Εἴ τινές εἰσιν ἀσύμπτωτοι τῇ τομῇ ἕτεραι τῶν προειρημένων, ἔγγιόν εἰσιν αἱ προειρημέναι τῇ τομῇ.

ἔστω ὑπερβολή, ἧς ἀσύμπτωτοι αἱ ΓΑ, ΑΔ. λέγω, ὅτι, εἴ τινές εἰσιν ἀσύμπτωτοι τῇ τομῇ, ἐκείνων ἔγγιόν εἰσιν αἱ ΓΑ, ΑΔ.

ὅτι μὲν οὖν, ὡς ἐπὶ τῆς πρώτης καταγραφῆς, οὐ δύνανται αἱ ΕΖΗ ἀσύμπτωτοι εἶναι, φανερόν, ὥστε εἶναι παράλληλον τὴν μὲν ΕΖ τῇ ΓΑ, τὴν δὲ ΖΗ τῇ ΑΔ· δέδεικται γάρ, ὅτι συμπεσοῦνται τῇ τομῇ· ἐν γὰρ τῷ ἀφοριζομένῳ τόπῳ ὑπὸ τῶν ἀσυμπτώτων καὶ τῆς τομῆς εἰσιν.

εἰ δέ, ὡς ἐπὶ τῆς δευτέρας πτώσεώς εἰσιν, ἀσύμπτωτοι αἱ ΕΖ, ΖΗ παράλληλοι οὖσαι ταῖς ΓΑ, ΑΔ, ἔγγιον μᾶλλόν εἰσιν αἱ ΓΑ, ΑΔ τῆς τομῆς ἤπερ αἱ ΕΖ, ΖΗ.

εἰ δέ, ὡς ἐπὶ τῆς τρίτης πτώσεως, καὶ οὕτως αἱ μὲν ΓΑ, ΑΔ, ἐὰν ἐκβληθῶσιν εἰς ἄπειρον, ἐγγίζουσι


3. προσάγουσιν W. 5. ἔχουσιν W. 6. ἐντυγχάνουσιν W. ἡμέραν] W, ἡμε seq. lac. p, ἡμετέραν γνώμην Halley praeeunte Commandino; sed puto prouerbium esse de opera superflua. 7. ἐκκείσθω] p, ἐκείσθω W. 10. ΓΑ, ΑΔ] ΓΔ, ΑΔ Wp, corr. Comm. 11. ὅτι εἴ] in ras. m. 1 W. εἰσιν ἄλλαι Halley cum Comm. 12. ΓΑ] ΓΔ Wp, corr. Comm. 13. ὡς] comp. p, comp. supra scr. m. 1 W. 21. ἤπερ] εἴπερ p. 24. ἐγγίζουσι] scripsi, ἐγγι (ι in ras., seq. lac. 1 litt.) αιουσιν W, ἔγγιαι οὖσαι p.

sitiones perscriptae reperiebantur, quae ut superfluae a nobis remotae sunt; nam hoc demonstrato, asymptotas ad sectionem propius adcedere et ad distantiam omni data distantia minorem peruenire, superfluum erat haec quaerere. scilicet ne demonstrationes quidem habent, sed differentias figurarum. sed ut legentibus lucem claram reddamus, hic collocentur, quae ut superflua remota sunt.

Si quae asymptotae sunt sectionis aliae atque eae, quas diximus supra, hae, quas supra diximus, sectioni propiores sunt.

sit hyperbola, cuius asymptotae sint $\Gamma A$, $A\Delta$. dico, si quae asymptotae sint sectionis, $\Gamma A$, $A\Delta$ iis propiores esse.


iam ut in prima figura $EZ$, $ZH$ asymptotas esse non posse, manifestum, ita scilicet, ut $EZ$ rectae $\Gamma A$ parallela sit, $ZH$ autem rectae $A\Delta$; nam demonstratum est [prop. XIII], eas cum sectione concurrere; sunt enim in spatio positae, quod asymptotis sectioneque continetur.





sin, ut in secundo sunt casu, asymptotae sunt $EZ$, $ZH$ rectis $\Gamma A$, $A\Delta$ parallelae, $\Gamma A$, $A\Delta$ sectioni propiores sunt quam $EZ$, $ZH$.

In fig. 2 $\Gamma$ om. W, $E$ in ras. hab.; figuras primas numeris $\alpha''$ $\beta''$ $\gamma''$ $\delta''$ notat W.

τῆς τομῆς καὶ εἰς ἔλαττον διάστημα παντὸς τοῦ δοθέντος ἀφικνοῦνται, αἱ δὲ *ΕΖΗ* κατὰ μὲν τὸ *Ζ* καὶ τὰ ἐγγὺς αὐτοῦ ἐντὸς ὄντα τῆς γωνίας σύνεγγύς εἰσι τῆς τομῆς, ἐκβληθεῖσαι δὲ ἀφίστανται τῆς τομῆς μᾶλλον· παντὸς γὰρ τοῦ δοθέντος, ὃ νῦν ἀφεστήκασιν, ἔστιν ἔλασσον.




ἔστωσαν δὴ πάλιν, ὡς ἐπὶ τῆς τετάρτης καταγραφῆς, ἀσύμπτωτοι αἱ *ΕΖ*, *ΖΗ*· φανερὸν δὴ καὶ οὕτως, ὅτι ἡ μὲν *ΓΑ* ἔγγιόν ἐστι τῆς τομῆς ἤπερ ἡ *ΕΖ*, ἐάν τε ἡ *ΕΖ* τῇ *ΓΑ* παράλληλός ἐστιν, ἐάν τε συμπίπτῃ τῇ *ΓΑ*. καὶ ἐὰν μὲν ἡ σύμπτωσις ἀνώτερον ᾖ τῆς διὰ τοῦ *Ζ* ἐφαπτομένης τῆς τομῆς, τέμνει τὴν τομήν, ἐὰν δὲ ἡ σύμπτωσις ἐν τῷ μεταξὺ τόπῳ ᾖ τῆς τε ἐφαπτομένης καὶ τῆς γωνίας, ὥσπερ καὶ ἡ *ΖΗ*, κατὰ τὰ αὐτὰ τῷ ἐπάνω ἡ *ΘΗ* τῆς τομῆς οὐκ ἀφέξει ἔλασσον διάστημα παντὸς τοῦ δοθέντος· ὥστε ἡ *ΓΑ* ἔγγιόν ἐστι τῆς τομῆς, ἤπερ ἡ *ΕΖ* ἐστιν. ἡ δὲ *ΔΑ* ἔγγιον τῆς τομῆς ἤπερ ἡ *ΖΗ* διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἐπὶ τῆς τρίτης καταγραφῆς.

ὅτι δὲ ἡ ἀνωτέρω τῆς διὰ τοῦ *Ζ* ἐφαπτομένης

---

In fig. 1 *Δ* et *H* om. W; additae sunt duae rectae rectis *EZ*, *ZH* parallelae.
In fig. 2 *E* om. W, pro *H* hab. *Π*.

---

2. δέ] γάρ Wp, corr. Halley cum Comm. τὰ ἐγγὺς αὐτοῦ] scripsi, τὸ ἐγγὺς αὐτῶν Wp. 3. εἰσιν W. 5. ἔλασ-

sin, ut in tertio casu, sic quoque *ΓΑ*, *ΑΔ*, si productae erunt in infinitum, sectioni adpropinquant et ad distantiam omni data minorem perueniunt, *EZ*, *ZH* autem ad *Z* partesque ei propinquas intra angulum positas sectioni propinquae sunt, productae uero magis a sectione distant; nam quam nunc[1]) habent distantiam, ea omni data est minor.

iam rursus, ut in quarta figura, asymptotae sint *EZ*, *ZH*. itaque sic quoque manifestum est, *ΓΑ* sectioni propiorem esse quam *EZ*, siue *EZ* rectae *ΓΑ* parallela est siue cum *ΓΑ* concurrit. et si punctum concursus supra rectam per *Z* sectionem contingentem[2]) positum est, sectionem secat, sin punctum concursus in spatio inter contingentem angulumque positum est, sicut etiam *ZH*, eodem modo, quo supra, *ΘH*[3]) a sectione non distabit interuallo, quod omni dato minus est. ergo *ΓΑ* sectioni propior erit quam *EZ*. *ΔΑ* autem sectioni propior est quam *ZH* eadem de causa, qua in tertia figura.

rectam autem, quae supra rectam per *Z* contin-

1) Sc. *ΓΑ*, *ΑΔ*.
2) Sc. ad *Δ* uersus ductam.
3) Haec non satis intellego.

σον] Halley, ἔλασσων Wp. 6. ὡς] om. Wp, mg. m. 2 U. 7. *ZH*] *HZ* p. 8. ἔγγιον] corr. ex ἔγγειον W. ἐστιν W. ἢ] p, om. W. 9. *ΓΑ* (pr.)] corr. ex *ΓΔ* m. 1 W. ἐστιν] Wp, ἢ Halley. συμπίπτει? 10. σύμπτωσις] comp. p, συμπτώσεις W. ἀνώτερον] κατώτερον Halley cum Comm. τῆς] comp. p, τις W. 11. ἐφαπτομένης] comp. p, ἐφαπτομένη W. 14. *ΘH*] *ZE* Halley. 15. ἐστιν W. 16. ἐστιν] om. Halley. δέ] om. Wp, corr. Halley.

*συμπίπτουσα τῇ ΓΑ συμπίπτει καὶ τῇ τομῇ, οὕτως δείκνυται.*

*...... καὶ ἡ ΖΕ ἐφαπτέσθω τῆς τομῆς κατὰ τὸ Ε, ἡ δὲ σύμπτωσις τῇ ΓΑ ἀνώτερον τῇ ΖΗ. λέγω, ὅτι ἐκβληθεῖσα συμπεσεῖται τῇ τομῇ.*

*ἤχθω γὰρ διὰ τῆς Ε ἀφῆς παράλληλος τῇ ΓΑ ἀσυμπτώτῳ ἡ ΕΘ· ἡ ΕΘ ἄρα κατὰ μόνον τὸ Ε τέμνει τὴν τομήν. ἐπεὶ οὖν ἡ ΓΑ τῇ ΕΘ παράλληλός ἐστιν, καὶ τῇ ΑΗ συμπίπτει ἡ ΖΗ, καὶ τῇ ΕΘ ἄρα συμπεσεῖται· ὥστε καὶ τῇ τομῇ.*

*Εἴ τίς ἐστιν εὐθύγραμμος γωνία περιέχουσα τὴν ὑπερβολὴν ἑτέρα τῆς περιεχούσης τὴν ὑπερβολήν, οὐκ ἔστιν ἐλάσσων τῆς περιεχούσης τὴν ὑπερβολήν.*

*ἔστω ὑπερβολή, ἧς ἀσύμπτωτοι αἱ ΓΑ, ΑΔ, ἕτεραι δέ τινες ἀσύμπτωτοι τῇ τομῇ ἔστωσαν αἱ ΕΖΗ. λέγω, ὅτι οὐκ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Ζ γωνία τῆς πρὸς τῷ Α.*

*ἔστωσαν γαρ πρότερον αἱ ΕΖΗ ταῖς ΓΑ, ΑΔ παράλληλοι. ἴση ἄρα ἡ πρὸς τῷ Ζ γωνία τῇ πρὸς τῷ Α· οὐκ ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Ζ τῆς πρὸς τῷ Α.*


*μὴ ἔστωσαν δὴ παράλληλοι, καθὼς ἐπὶ τῆς δευτέρας*

---

1. *ΓΑ*] *ΓΔ* p. *οὔτω* p. 2. Post *δείκνυται* excidit praeparatio; in Wp nulla lacuna. 3. *ἡ δὲ σύμπτωσις*] *αἱ δὲ συμπτώσεις* Wp, corr. Halley cum Comm. 4. *τῇ* (alt.)] *τῆς* Halley. 9. *ΑΗ*] scripsi, *ΑΝ* p et, *Α* in ras. m. 1, W; *ΑΓ* Halley cum Comm. 15. *ἧς*] scripsi, *ἥ* Wp; possis etiam *καί* coniicere. 16. *ΕΖΗ*] scripsi, *ΕΖ* Wp; *ΕΖ, ΖΗ* Halley cum Comm. 18. *τῷ*] p, *τό* W. 20. *παράλληλοι. ἴση ἄρα*] p, *παραλλήλοις ἡ ἄρα* W.


gentem cum $\Gamma A$ concurrat, etiam cum sectione concurrere, sic demonstratur:

sint asymptotae $A\Gamma$, $A\Delta$, et $ZK$, $ZH$ cadant ut in quarta figura, $ZE$ autem sectionem contingat in $E$, et punctum concursus cum $\Gamma A$ rectae $ZH$ superius sit. dico, eam productam cum sectione concurrere.




ducatur enim per punctum contactus $E$ asymptotae $\Gamma A$ parallela $E\Theta$; $E\Theta$ igitur in solo $E$ sectionem secat [prop. XIII]. quoniam igitur $\Gamma A$ rectae $E\Theta$ parallela est, et $ZH$ cum $AH$ concurrit, etiam cum $E\Theta$ concurret; ergo etiam cum sectione.

Si quis est angulus rectilineus hyperbolam continens alius atque is, qui hyperbolam continet, minor non est angulo hyperbolam continente.




sit hyperbola, cuius asymptotae sint $\Gamma A$, $A\Delta$, aliae autem aliquae sectionis asymptotae sint $EZ$, $ZH$. dico, angulum ad $Z$ positum minorem non esse angulo ad $A$ posito.

nam primum $EZ$, $ZH$ rectis $\Gamma A$, $A\Delta$ parallelae sint. itaque $\angle Z = \angle A$. ergo angulus ad $Z$ positus angulo ad $A$ posito minor non est.

iam parallelae ne sint, sicut in secunda figura.

---

In fig. 1 $\Gamma$ et $E$ om. W; $\Theta$ in sectione est.
In fig. 2 om. $A$ W, pro $\Delta$ hab. $A$.

καταγραφῆς. φανερὸν οὖν, ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Z γωνία τῆς ὑπὸ ΘAH.


ἐπὶ δὲ τῆς γ' μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ZΘA τῆς πρὸς τῷ A, καί ἐστιν ἴση ἡ πρὸς τῷ Z τῇ πρὸς τῷ Θ.

ἐπὶ δὲ τῆς δ' ἡ κατὰ κορυφὴν τῆς κατὰ κορυφὴν ἐστι μείζων.

οὐκ ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Z τῆς πρὸς τῷ A.

## Εἰς τὸ κγ'.

Τὸ δὲ ὑπὸ ΘME μετὰ τοῦ ὑπὸ ΘKE ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΛMK διὰ τὸ τὰς ἄκρας ἴσας εἶναι] ἔστω εὐθεῖα ἡ ΛK, καὶ ἔστω ἡ ΛΘ ἴση τῇ EK, ἡ δὲ ΘN ἴση τῇ EM, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν M, K πρὸς ὀρθὰς αἱ MΞ, KO, καὶ κείσθω τῇ MK ἴση ἡ MΞ, τῇ δὲ KE ἡ KO, καὶ συμπεπληρώσθω τὰ ΞΘ, ΘΛ παραλληλόγραμμα.






ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ MK τῇ MΞ, τουτέστι τῇ ΠO, ἔστι δὲ καὶ ἡ ΛΘ τῇ EK, τουτέστι τῇ KO, ἴσον ἄρα τὸ ΘΛ τῷ MO.

3. ἐπί] ἐπεί Wp, corr. Comm. γ'] $\overline{εγ}$ Wp, corr. Comm. 4. τῷ (pr.)] p, τό W. Θ] A Wp, corr. Halley. 5. δ' ἡ] δη Wp, corr. Comm. 6. ἔστιν W. 7. ἐλάσσων] comp. p, ἔλασσον W. 8. εἰς τὸ κγ'] om. Wp. 10. ἐστίν W. ΛMK] ΛM (Λ e corr. p) καί Wp, corr. Comm. 13. MΞ] p, NΞ W. KO] om. W, KΘ p, corr. Comm. 16. KO] p, KΘ W. 19. ἴση] -η e corr. m. 1 W. 20. τουτέστιν W. ἔστιν W. καί] euan. p. τουτέστιν W. 21. KO] KE Wp, corr. Comm. MO] MΘ W et, ut uidetur, p; corr. Comm.


In fig. pro N hab. H, pro Λ uero Δ(?) W.

manifestum igitur, angulum ad $Z$ positum maiorem esse angulo $\Theta A H$ [Eucl. I, 21].




in tertia autem figura $\angle Z\Theta A > \angle A$ [Eucl. I, 16], et $\angle Z = \angle Z\Theta A$ [Eucl. I, 29].




in quarta autem angulus ad uerticem positus angulo ad uerticem posito maior est [Eucl. I, 21].

ergo angulus ad $Z$ positus angulo ad $A$ posito minor non est.

## Ad prop. XXIII.

Est autem $\Theta M \times ME + \Theta K \times KE = AM \times MK$, quia extrema aequalia sunt I p. 234, 18—19] sit recta $AK$, et sit $A\Theta = EK$, $\Theta N = EM$, ducanturque ab $M$, $K$ perpendiculares $M\Xi$, $KO$, et ponatur $M\Xi = MK$, $KO = KE$, et parallelogramma $\Xi\Theta$, $\Theta A$ expleantur. quoniam igitur $MK = M\Xi = \Pi O$[1]), uerum etiam $A\Theta = EK = KO$, erit $\Theta A = MO$.

1) Scriptum oportuit $P\Theta$.

In fig. 1 $\Theta$ om. W.

In fig. 3 pro $H$ hab. $\Theta$ W, $H$ et $E$ ad uertices angulorum extremorum posita sunt; sed sic rectae $EZ$, $ZH$ hyperbolam non continent.

κοινὸν προσκείσθω τὸ ΞΘ· ὅλον ἄρα τὸ ΛΞ ἴσον ἐστὶ τῷ ΞΘ καὶ ΜΟ, τουτέστι τῷ ΘΟ καὶ ΠΡ. καί ἐστι τὸ μὲν ΛΞ τὸ ὑπὸ τῶν ΛΜΚ, τὸ δὲ ΘΟ τὸ ὑπὸ ΘΚΕ, τὸ δὲ ΠΡ τὸ ὑπὸ ΘΜΕ [τουτέστιν ὑπὸ ΠΞΡ].

ἔστι δὲ καὶ ἄλλως δεῖξαι τὸ αὐτό.

τετμήσθω ἡ ΜΝ δίχα κατὰ τὸ Σ. φανερὸν δή, ὅτι καὶ ἡ ΛΚ δίχα τέτμηται κατὰ τὸ Σ, καὶ ὅτι τὸ ὑπὸ ΘΚΕ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΛΕΚ· ἴση γὰρ ἡ ΘΚ τῇ ΛΕ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΛΚ τέτμηται εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ Σ, εἰς δὲ ἄνισα κατὰ τὸ Ε, τὸ ὑπὸ ΛΕΚ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΣΕ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΚΣ. τὸ δὲ ἀπὸ ΣΕ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΘΜΕ καὶ τῷ ἀπὸ ΣΜ· ὥστε τὸ ἀπὸ ΣΚ ἴσον ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ ΛΕΚ, τουτέστι τῷ ὑπὸ ΘΚΕ, καὶ τῷ ὑπὸ ΘΜΕ καὶ τῷ ἀπὸ ΣΜ. διὰ ταὐτὰ δὴ τὸ ἀπὸ ΣΚ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΛΜΚ καὶ τῷ ἀπὸ ΣΜ· ὥστε τὸ ὑπὸ ΘΚΕ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΘΜΕ καὶ τοῦ ἀπὸ ΣΜ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΛΜΚ καὶ τῷ ἀπὸ ΣΜ. κοινὸν ἀφῃρήσθω τὸ ἀπὸ ΣΜ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΘΚΕ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΘΜΕ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΛΜΚ.

## Εἰς τὸ κδ'.

Δεῖ σημειώσασθαι, ὅτι συμπτώσεις καλεῖ τὰ σημεῖα, καθ' ἃ συμβάλλουσι τῇ τομῇ αἱ ΑΒ, ΓΔ εὐθεῖαι. καὶ

---

1. προσκείσθω] scripsi, *apponatur* Comm., τε ἐκείσθω W, τε ἐκκείσθω p. 2. ἐστίν W. ΜΟ] ΜΘ Wp, corr. Comm. τουτέστιν W. ΘΟ] euan. p. 3. ἐστιν W. τό (quart.)] τῷ Wp, corr. Halley. 4. τό (alt.)] τῷ Wp, corr. Halley. τουτέστιν ὑπὸ ΠΞΡ] om. Comm., Halley. 6. ἔστιν W. 7. Σ] Ε Wp, corr. Comm. 8. καὶ ἡ] τῇ post lac. 3 litt. W, ἡ p; *et* Comm. Σ] ΘΣ Wp, corr. Comm. 9. ἐστίν W. ΛΕΚ] corr. ex

commune adiiciatur $\Xi\Theta$; itaque totum $A\Xi = \Xi\Theta + MO = \Theta O + \Pi P$. et $A\Xi = AM \times MK$, $\Theta O = \Theta K \times KE$, $\Pi P = \Pi\Xi \times \Xi P = \Theta M \times ME$.

potest autem aliter quoque demonstrari.

$MN$ in $\Sigma$ in duas partes aequales secetur. manifestum igitur, etiam $AK$ in $\Sigma$ in duas partes aequales secari, et esse $\Theta K \times KE = AE \times EK$; nam $\Theta K = AE$. et quoniam $AK$ in $\Sigma$ in partes aequales secta est, in $E$ autem in inaequales, erit [Eucl. II, 5] $AE \times EK + \Sigma E^2 = K\Sigma^2$. uerum

$$\Sigma E^2 = \Theta M \times ME + \Sigma M^2 \text{ [Eucl. II, 6].}$$

quare $\Sigma K^2 = AE \times EK + \Theta M \times ME + \Sigma M^2 = \Theta K \times KE + \Theta M \times ME + \Sigma M^2$. eadem de causa [Eucl. II, 5] igitur $\Sigma K^2 = AM \times MK + \Sigma M^2$. quare

$$\Theta K \times KE + \Theta M \times ME + \Sigma M^2 = AM \times MK + \Sigma M^2.$$

auferatur, quod commune est, $\Sigma M^2$. erit igitur reliquum $\Theta K \times KE + \Theta M \times ME = AM \times MK$.

## Ad prop. XXIV.

Notandum, eum *συμπτώσεις* adpellare puncta, in quibus rectae $AB$, $\Gamma\Delta$ cum sectione concurrant. et

---

$A\Gamma K$ m. 1 W. 12. ἐστίν W. $K\Sigma$] $\Xi K\Sigma$ Wp, corr. Halley, sk Comm. 13. ἐστίν W. τῷ] p, τό W. $\Theta ME$] $O\Theta ME$ Wp, corr. Comm. $\Sigma K$] $EK$ Wp, corr. Comm. 14. ἐστίν W. τουτέστιν W. τῷ] supra scr. m. 1 p. 15. $\Theta ME$] $\Sigma ME$ Wp, corr. Comm. $\Sigma M$] $\Sigma N$ Wp, corr. Comm.. ταὐτά] ταῦτα W, τὰ αὐτά p. 16. ἐστίν W. $AMK$] $N\Sigma K$ Wp, corr. Comm. τῷ] p, τό W. 17. $\Theta ME$] $\Theta$ corr. ex $O$, ut uidetur, W. $\Sigma M$] $\Sigma K$ Wp, corr. Comm. 18. ἐστίν W. 20. ἴσον] corr. ex ἴσων m. 1 W.


*δεῖ, φησίν, παρατηρεῖν, ὥστε ἐκτὸς εἶναι ἀλλήλων τὰ σημεῖα, ἀλλὰ μὴ τὰ Α, Β .....*


*δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι καὶ ἐπὶ ἐφαπτομένων τὰ αὐτὰ συμβαίνει.*

## *Εἰς τὸ κη'.*

*Ἄξιον ἐπισκέψασθαι τὴν δοθεῖσαν ἐν ἐπιπέδῳ καμπύλην γραμμήν, πότερον κύκλου ἐστὶ περιφέρεια ἢ ἑτέρα τις τῶν τριῶν τοῦ κώνου τομῶν ἢ ἄλλη παρὰ ταύτας.*

*ἔστω δὴ ἡ ΑΒΓ, καὶ προκείσθω τὸ εἶδος αὐτῆς ἐπισκέψασθαι τὸν εἰρημένον τρόπον.*




*εἰλήφθω τινὰ σημεῖα ἐπὶ τῆς γραμμῆς τὰ Γ, Δ, καὶ ἤχθωσαν διὰ τῶν Γ, Δ σημείων παράλληλοι ἀλλήλαις εὐθεῖαί τινες αἱ ΓΒ, ΔΕ ἐντὸς ἀπολαμβανόμεναι τῆς γραμμῆς, καὶ πάλιν ἀπὸ τῶν Γ, Δ ἕτεραι παράλ-*

---

In fig. 1 litt. *H*, *E* permutat W, *Θ* om.; in fig. 2 litt. *Γ*, *Δ* et *Θ*, *K* permutat.

---

2. *ἀλλὰ — Α, Β*] om. Comm. *μὴ ὡς τά* Halley. *Α, Β*] bis (in fine et initio lin.) W, bis etiam p. Post *B* lacunam statuo, quae sic fere explenda est: *μεταξὺ τῶν Γ, Δ ἢ τὰ Γ, Δ μεταξὺ τῶν Α, Β.* Pro *ΑΒ, ΑΒ* hab. *ΑΒ, ΓΔ* mg. m. 2 U; *ΑΓ, ΒΔ* Halley. 3. *ἐπί*] p, *ἐπεί* W. 4. *συμβαίνει*] Halley, *συμβαίνειν* Wp. 7. *ἐστίν* W. *περιφέρεια ἢ*] ⌒^α (h. e. *περι-*


bseruandum, ait, ut haec puncta extra se posita sint eque *Α*, *Β* intra *Γ*, *Δ* uel *Γ*, *Δ* intra *Α*, *Β*.

sciendum autem, etiam in contingentibus eadem uenire.

## Ad prop. XXVIII.

Operae pretium est inquirere, linea curua in plano ata utrum circuli sit arcus an alia aliqua trium oni sectionum an alia praeter has.

sit igitur data *ΑΒΓ*, et propositum sit, ut speciem ius quaeramus eo, quo diximus, modo.




sumantur in linea puncta aliqua *Γ*, *Δ*, et per *Γ*, *Δ* uncta rectae aliquae inter se parallelae *ΓΒ*, *ΔΕ* ucantur intra lineam terminatae, et rursus a *Γ*, *Δ*

---

In fig. 1 *Γ*, *Δ* permutat W, *ΚΘΛΜ* om.; in fig. 2 *Κ*, *Θ* ermutat, *Μ*, *Λ* om.

---

ἐρεια) p, *περιφέρειαν* W, corr. Halley cum Comm. 8. ἢ λλη] scripsi, lacunam 5—6 litt. W, lac. paruam p, ἢ Halley um Comm. 9. *προκείσθω*] p, *προσκείσθω* W. 13. *ΓΒ*] 'Δ Wp, corr. Comm. 14. *ἀπό*] *αἱ* Wp, corr. Halley cum omm. ἕτεραι] p, ἕταιραι W. *παράλληλοι*] p?, *παραλληλαι* W.

ληλοι αἱ ΓΗ, ΔΖ, καὶ τετμήσθωσαν δίχα αἱ μὲν ΓΒ, ΔΕ κατὰ τὰ Θ, Κ, αἱ δὲ ΓΗ, ΔΖ κατὰ τὰ Λ, Μ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΘΚ, ΛΜ.

εἰ μὲν οὖν πᾶσαι αἱ τῇ ΒΓ παράλληλοι ὑπὸ τῆς ΚΘ διχοτομοῦνται, πᾶσαι δὲ αἱ τῇ ΓΗ ὑπὸ τῆς ΜΛ, μία ἐστὶ τῶν τοῦ κώνου τομῶν ἡ ΒΑΓ διαμέτρους ἔχουσα τὰς ΘΚ, ΜΛ, εἰ δὲ μή, οὔ.

πάλιν δέ, ποία τῶν δ̄ ἐστίν, εὑρίσκομεν ἐκβάλλοντες εἰς ἄπειρον ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη τὰς ΘΚ, ΛΜ. ἤτοι γὰρ παράλληλοί εἰσιν, καί ἐστι παραβολή, ἢ ἐπὶ τὰ Θ, Λ μέρη συμπίπτουσιν, καί ἐστιν ἔλλειψις ἢ κύκλος, ἢ ἐπὶ τὰ ἕτερα, καί ἐστιν ὑπερβολή. τὴν δὲ ἔλλειψιν τοῦ κύκλου διακρινοῦμεν ἀπὸ τοῦ σημείου τῆς συμπτώσεως τῶν ΛΘ, ΝΛ, ὅπερ κέντρον γίνεται. εἰ μὲν γὰρ ἴσαι εἰσὶν αἱ ἀπ' αὐτοῦ πρὸς τὴν γραμμὴν προσπίπτουσαι, δῆλον, ὅτι κύκλου ἐστὶ περιφέρεια ἡ ΑΒΓ, εἰ δὲ μή, ἔλλειψις.

Ἔστιν αὐτὰς διακρῖναι καὶ ἄλλως ἀπὸ τῶν τεταγμένως ἐπὶ τὴν διάμετρον καταγομένων, οἷον τῶν ΓΘ, ΔΚ. εἰ μὲν γὰρ εἴη, ὡς τὸ ἀπὸ ΓΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΚ, οὕτως ἡ ΘΑ πρὸς ΑΚ, παραβολή ἐστιν, εἰ δὲ το ἀπὸ ΘΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΚ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ΘΑ πρὸς ΑΚ, ὑπερβολή, εἰ δὲ ἐλάττονα, ἔλλειψις.

Καὶ ἀπὸ τῶν ἐφαπτομένων δυνατόν ἐστιν αὐτὰς διακρῖναι ἀναμνησθέντας τῶν εἰρημένων αὐταῖς ὑπάρχειν ἀνωτέρω.

---

2. Θ] ΑΘ Wp, corr. Comm. 6. ἐστίν W. διαμέτρους] p, corr. ex διάμετρος m. 1 W. 7. δέ] scripsi cum Comm., γάρ Wp. 10. ἐστι] ἐστιν W. 11. συμπίπτουσιν] συμπίπτωσιν W, σύμπτ̈ω p, corr. Halley. 14. ΛΘ, ΝΛ] scripsi,

aliae parallelae $\Gamma H$, $\Delta Z$, in binas autem partes aequales secentur $\Gamma B$, $\Delta E$ in $\Theta$, $K$ et $\Gamma H$, $\Delta Z$ in $\Lambda$, $M$, ducanturque $\Theta K$, $\Lambda M$.

iam si omnes rectae parallelae rectae $B\Gamma$ a $K\Theta$ in binas partes aequales secantur, omnes autem parallelae rectae $\Gamma H$ a $M\Lambda$, $B\Lambda\Gamma$ una est ex sectionibus coni diametros habens $\Theta K$, $M\Lambda$, sin minus, non est.

rursus autem, qualis sit ex quattuor illis sectionibus, inuenimus rectis $\Theta K$, $\Lambda M$ in utramque partem in infinitum productis. aut enim parallelae sunt, et est parabola, aut ad partes $\Theta$, $\Lambda$ concurrunt, et est ellipsis uel circulus, aut ad alteram partem, et est hyperbola. ellipsim uero a circulo discernemus per punctum concursus rectarum $\Lambda\Theta$, $N\Lambda$, quod fit centrum; si enim rectae ab eo ad lineam adcidentes aequales sunt, adparet, $AB\Gamma$ ambitum circuli esse, sin minus, ellipsis.

fieri autem potest, ut aliter quoque discernantur per rectas ad diametrum ordinate ductas uelut $\Gamma\Theta$, $\Delta K$. nam si est $\Gamma\Theta^2 : \Delta K^2 = \Theta A : AK$, parabola est, sin $\Theta\Gamma^2 : \Delta K^2 > \Theta A : AK$, hyperbola, sin autem $\Theta\Gamma^2 : \Delta K^2 < \Theta A : AK$, ellipsis.

etiam per rectas contingentes eas discernere possumus ea recordati, quae supra earum propria esse dixit.

---

$\Lambda EN\Delta$ Wp; $K\Theta$, $M\Lambda$ Halley cum Comm. εἰ μέν] suppleui, lacunam Wp, εἰ Halley cum Comm. 16. ἐστίν W. 17. ἔλλειψις] p, corr. ex ἔλληψις m. 1 W. 18. ἔστι δέ Halley. τεταγμένως] p, corr. ex τεταγμένων m. 1 W. 21. οὕτως — 22. $\Delta K$] om. p. 21. παραβολή] παρακειμένη W, corr. Halley cum Comm. 23. ἐλάττονα] ἔλαττον αἱ Wp, ἐλάσσονα Halley. 24. ἔλλειψις] ἐλλείψεις Wp, corr. Comm. 26. ὑπάρχειν] ὑπάρχει ἄν W, ὑπάρχει p, corr. Halley.

## Εἰς τὸ μη΄.

Ἔστωσαν δύο μεγέθη ἴσα τὰ *ΑΒ*, *ΓΔ* καὶ διῃρήσθω εἰς ἄνισα κατὰ τὰ *Ε*, *Ζ*. λέγω, ὅτι, ᾧ διαφέρει τὸ *ΑΕ* τοῦ *ΖΓ*, τούτῳ διαφέρει τὸ *ΕΒ* τοῦ *ΖΔ*.

κείσθω τῷ *ΓΖ* ἴσον τὸ *ΑΗ*· τὸ *ΕΗ* ἄρα ὑπεροχή ἐστι τῶν *ΑΗ*, *ΑΕ*, τουτέστι τῶν *ΓΖ*, *ΑΕ*· τὸ γὰρ *ΑΗ* ἴσον ἐστὶ τῷ *ΓΖ*. ἀλλὰ καὶ τὸ *ΑΒ* τῷ *ΓΔ*· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ *ΗΒ* τῷ *ΖΔ* ἐστιν ἴσον. ὥστε τὸ *ΕΗ* ὑπεροχή ἐστι τῶν *ΕΒ*, *ΒΗ* ἤτοι τῶν *ΕΒ*, *ΖΔ*.

Ἀλλὰ δὴ ἔστωσαν δ̄ μεγέθη τὰ *ΑΕ*, *ΕΒ*, *ΓΖ*, *ΖΔ*, καὶ τὸ *ΑΕ* τοῦ *ΓΖ* διαφερέτω, ᾧ διαφέρει τὸ *ΕΒ* τοῦ *ΖΔ*. λέγω, ὅτι συναμφότερα τὰ *ΑΕΒ* συναμφοτέροις τοῖς *ΓΖ*, *ΖΔ* ἐστιν ἴσα.

κείσθω πάλιν τῷ *ΓΖ* ἴσον τὸ *ΑΗ*· τὸ *ΕΗ* ἄρα ὑπεροχή ἐστι τῶν *ΑΕ*, *ΓΖ*. τῷ δὲ αὐτῷ διαφέρειν ὑπόκεινται ἀλλήλων τὰ *ΕΑ*, *ΓΖ* καὶ τὰ *ΕΒ*, *ΖΔ*· ἴσον ἄρα τὸ *ΗΒ* τῷ *ΖΔ*. ἀλλὰ καὶ τὸ *ΑΗ* τῷ *ΓΖ*· τὸ *ΑΒ* ἄρα τῷ *ΓΔ* ἐστιν ἴσον.

φανερὸν δή, ὅτι, ἐὰν πρῶτον δευτέρου υπερέχῃ τινί, καὶ τρίτον τετάρτου ὑπερέχῃ τῷ αὐτῷ, ὅτι τὸ πρῶτον καὶ τὸ τέταρτον ἴσα ἐστὶ τῷ δευτέρῳ καὶ τῷ τρίτῳ κατὰ τὴν καλουμένην ἀριθμητικὴν μεσότητα. ἐὰν γὰρ τούτων ὑποκειμένων ὑπάρχῃ, ὡς τὸ πρῶτον

---

1. μη΄] ν Wp; sed ad prop. XLVIII p. 272, 13—15 recte rettulit Comm. 2. διῃρήσθωσαν p. 4. *ΖΔ*] *Δ* corr. ex *Α* m. 1 W. 6. ἔστιν W. τουτέστιν W. *ΑΕ* — 7. ἴσον] lacunam magnam Wp, suppleuit Comm. 7. ἐστίν W. 8. *ΖΔ*] p, Z insert. m. 1 W. *ΕΗ*] p, *Ε* in ras. W. 9. ἔστιν W. 11. Ante τό (pr.) eras. εσ m. 1 W. *ΓΖ*] Z e corr. p. τό] e corr. p, τῶι W. 13. *ΖΔ*] *Δ* e corr. m. 1 W. 14. τό (pr.)] p, τῶι W. 15. ἔστιν W. αὐτῷ] p, αὐτῶν W. 16. ὑπόκειται Halley. 18. *ΓΔ* — 19. πρῶτον] in ras. m. 1 W. 19. δευτέρου] β^ου p. ὑπερέχῃ] p, υπερέχει corr.

## Ad prop: XLVIII.


Duae magnitudines aequales sint $AB$, $\Gamma\Delta$ et in $E$, $Z$ in partes aequales diuidantur. dico, esse $Z\Gamma \div AE = EB \div Z\Delta$.

ponatur $AH = \Gamma Z$; itaque

$$EH = AH \div AE = \Gamma Z \div AE;$$

est enim $AH = \Gamma Z$.

uerum etiam $AB = \Gamma\Delta$; quare etiam reliqua $HB = Z\Delta$. ergo $EH = EB \div BH = EB \div Z\Delta$.




iam uero quattuor magnitudines sint $AE$, $EB$; $\Gamma Z$, $Z\Delta$, et sit

$$\Gamma Z \div AE = EB \div Z\Delta.$$

dico, esse $AE + EB = \Gamma Z + Z\Delta$.

ponatur rursus $AH = \Gamma Z$; itaque $EH = \Gamma Z \div AE$. supposuimus autem, esse $\Gamma Z \div EA = EB \div Z\Delta$. itaque $HB = Z\Delta$. uerum etiam $AH = \Gamma Z$; ergo $AB = \Gamma\Delta$.

iam manifestum est, si prima secundam excedat magnitudine aliqua et tertia quartam excedat eadem, esse primam quartamque secundae tertiaeque aequales in proportione arithmetica, quae uocatur. si enim[1]) his suppositis est, ut prima ad tertiam, ita secunda

1) Haec non intellego. *itaque* Comm.

In fig. litteras Z, Δ permutat W.

ex ὑπάρχει m. 1 W. 20. ὑπερέχῃ] p, ὑπερέχει W. ὅτι] del. Halley. 21. πρῶτον] α̂ p. τέταρτον] Δ̄ Wp. ἐστίν W. δευτέρῳ] β̄ Wp. 22. τρίτῳ] γ̄ Wp. 23. ὑπάρχῃ] p, ὑπάρχει W. πρῶτον] ᾱ W et e corr. p.

πρὸς τὸ τρίτον, τὸ δεύτερον πρὸς τὸ τέταρτον, ἴσον ἔσται τὸ μὲν πρῶτον τῷ τρίτῳ, τὸ δὲ δεύτερον τῷ τετάρτῳ. δυνατὸν γὰρ ἐπὶ ἄλλων τοῦτο δειχθῆναι διὰ τὸ δεδεῖχθαι ἐν τῷ κε' θεωρήματι τοῦ ε' βιβλίου τῆς Εὐκλείδου στοιχειώσεως· ἐὰν δ̄ μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, τὸ πρῶτον καὶ τὸ τέταρτον δύο τῶν λοιπῶν μείζονα ἔσται.

1. τρίτον] γ̄ p, ἀπὸ γ̄ W. δεύτερον] β̄ Wp. τέταρτον] δ̄ p. 2. τό] p, τῷ W. πρῶτον] α̂ Wp. τρίτῳ] γ̂ Wp. δεύτερον] β̂ Wp. 3. τετάρτῳ] δα Wp, corr. Comm. γάρ] δέ Halley. 6. πρῶτον] ᾱ p. τέταρτον] δ̄ p. μείζονα] μείζων W, μεῖζον p, corr. Halley.

ad quartam, erit prima tertiae aequalis, secunda autem quartae. nam fieri potest, ut hoc in aliis[1]) demonstretur, propterea quod in prop. XXV quinti libri Elementorum Euclidis demonstratum est hoc: si quattuor magnitudines proportionales sunt, prima et quarta duabus reliquis maiores erunt.

---

1) Significare uoluisse uidetur, in proportione arithmetica rem aliter se habere atque in geometrica. sed totus locus uix sanus est.

## *Εἰς το τρίτον.*

*Τὸ τρίτον τῶν Κωνικῶν, ὦ φίλτατέ μοι Ἀνθέμιε, πολλῆς μὲν φροντίδος ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἠξίωται, ὡς αἱ πολύτροποι αὐτοῦ ἐκδόσεις δηλοῦσιν, οὔτε δὲ ἐπιστολὴν ἔχει προγεγραμμένην, καθάπερ τὰ ἄλλα, οὐδὲ σχόλια εἰς αὐτὸ ἄξια λόγου τῶν πρὸ ἡμῶν εὑρίσκεται, καίτοι τῶν ἐν αὐτῷ ἀξίων ὄντων θεωρίας, ὡς καὶ αὐτὸς Ἀπολλώνιος ἐν τῷ προοιμίῳ τοῦ παντὸς βιβλίου φησίν. πάντα δὲ ὑφ᾽ ἡμῶν σαφῶς ἔκκειταί σοι δεικνύμενα διὰ τῶν προλαβόντων βιβλίων καὶ τῶν εἰς αὐτὰ σχολίων.*

### *Εἰς τὸ α΄.*

*Ἔστι δὲ καὶ ἄλλη ἀπόδειξις.*

*ἐπὶ μὲν τῆς παραβολῆς, ἐπειδὴ ἐφάπτεται ἡ ΑΓ, καὶ κατῆκται ἡ ΑΖ, ἴση ἐστὶν ἡ ΓΒ τῇ ΒΖ. ἀλλὰ ἡ ΒΖ τῇ ΑΔ ἴση· καὶ ἡ ΑΔ ἄρα τῇ ΓΒ ἴση. ἔστι δὲ αὐτῇ καὶ παράλληλος· ἴσον ἄρα καὶ ὅμοιον τὸ ΑΔΕ τρίγωνον τῷ ΓΒΕ τριγώνῳ.*

*ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν ἐπιζευχθεισῶν τῶν ΑΒ, ΓΔ λεκτέον·*

*ἐπεί ἐστιν, ὡς ἡ ΖΗ πρὸς ΗΒ, ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ, ὡς δὲ ἡ ΖΗ πρὸς ΗΒ, ἡ ΑΗ πρὸς ΗΔ· παράλληλος γὰρ ἡ*

---

1. *Εὐτοκίου Ἀσκαλωνίτου εἰς τὸ γ̅ (τρίτον* p) *τῶν Ἀπολλωνίου κωνικῶν τῆς κατ᾽ αὐτὸν ἐκδόσεως* (ο corr. ex ω W) *ὑπόμνημα* Wp. 6. *ἄξια λόγου*] scripsi, *ἀξιολόγου* Wp, *ἀξιόλογα*

## In librum III.

Tertium Conicorum librum, amicissime Anthemie, multa cura antiqui dignati sunt, ut ex multiplicibus eius editionibus adparet, sed neque epistolam praemissam habet, sicut reliqui, neque ad eum scholia priorum exstant, quae quidem ullius pretii sint, quamquam, quae continet, inuestigatione digna sunt, ut ipse Apollonius in prooemio totius libri [I p. 4, 10 sq.] dicit. omnia autem a nobis plane tibi exposita sunt per libros praecedentes nostraque ad eos scholia demonstrata.

### Ad prop. I.

Est autem etiam alia demonstratio:

in parabola, quoniam $A\Gamma$ contingit, et $AZ$ ordinate ducta est, erit $\Gamma B = BZ$ [I, 35]. uerum $BZ = A\Delta$. itaque etiam $A\Delta = \Gamma B$. est autem eadem ei parallela; itaque triangulus $A\Delta E$ triangulo $\Gamma BE$ aequalis est et similis.

in reliquis autem ductis rectis $AB$, $\Gamma\Delta$ dicendum:

quoniam est $ZH : HB = BH : H\Gamma$ [I, 37] et $ZH : HB = AH : H\Delta$ (nam $AZ$, $\Delta B$ parallelae sunt),

---


Halley. 10. *διά*] scripsi, om. Wp, *ἐκ* Halley. 13. *ἔστιν* W. 16. *ἔστιν*, *ν* in ras. m. 1, W. 17. *αὐτῇ*] *αὗτη* Wp, corr. Halley. 18. *τρίγωνον τῷ* $\Gamma BE$] om. Wp, corr. Comm. (*ebc*). 19. *ἐπιζευχθησῶν* W. 22. $H\Delta$] $H\Gamma$ Wp, corr. Comm.

*ΑΖ τῇ ΔΒ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ, ἡ ΑΗ πρὸς ΗΔ. παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ. ἴσον ἄρα τὸ ΑΔΓ τρίγωνον τῷ ΒΓΔ, καὶ κοινοῦ ἀφαιρουμένου τοῦ ΓΔΕ λοιπὸν τὸ ΑΔΕ ἴσον ἐστὶ τῷ ΓΒΕ.*

*περὶ δὲ τῶν πτώσεων λεκτέον, ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς παραβολῆς καὶ τῆς ὑπερβολῆς οὐκ ἔχει, ἐπὶ δὲ τῆς ἐλλείψεως ἔχει δύο· αἱ γὰρ ἐφαπτόμεναι κατὰ τὰς ἁφὰς μόνον συμβάλλουσαι ταῖς διαμέτροις καὶ ἐκβαλλομέναις αὐταῖς συμπίπτουσιν, ἢ ὡς ἐν τῷ ῥητῷ κεῖται, ἢ ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη, καθ' ἅ ἐστι τὸ Ε, ὥσπερ ἔχει καὶ ἐπὶ τῆς ὑπερβολῆς.*

## *Εἰς τὸ β'.*


*Τὰς πτώσεις τούτου τοῦ θεωρήματος εὑρήσεις διὰ τοῦ μβ' καὶ μγ' θεωρήματος τοῦ α' βιβλίου καὶ τῶν εἰς αὐτὰ γεγραμμένων σχολίων. δεῖ μέντοι ἐπιστῆσαι, ὅτι, ἐὰν τὸ Η σημεῖον μεταξὺ τῶν Α, Β ληφθῇ ὥστε τὰς παραλλήλους εἶναι ὡς τὰς ΜΙΗΖ, ΛΗΚ, ἐκβάλλειν δεῖ τὴν ΛΚ μέχρι τῆς τομῆς ὡς κατὰ τὸ Ν καὶ διὰ τοῦ Ν τῇ ΒΔ παράλληλον ἀγαγεῖν τὴν ΝΞ· ἔσται γὰρ διὰ τὰ εἰρημένα ἐν τῷ α' βιβλίῳ κατὰ τὸ μθ' καὶ ν' θεώρημα καὶ τὸ τούτων σχόλιον τὸ ΚΝΞ τρί-*




In fig. pro *Ι* hab. *Τ* W, pro *Η* hab. *Ν*, pro *Ν* autem *Γ*.

1. *ΔΒ*] *ΑΒ* Wp, corr. Comm. *ΒΗ*] *Η* e corr. W. 3. *ΑΔΓ*] *Δ* corr. ex *Γ* in scrib. W. 9. *ἢ* (pr.)] addidi, om. Wp. 10. *ἐστιν* W. 16. *ἐάν*] corr. ex *ἐν* p, *ἐν* in ras. W. *τό*] Halley, *τῷ* p et in ras. W. *σημεῖον*] comp. p, *σημείῳ* in ras. W. 19. *ΜΙΗΖ*] scripsi; *ΜΕ*, *ΗΖ* Wp. 23. *τήν*] comp. p, *τῇ* W.

erit etiam $BH : H\Gamma = AH : H\Delta$. itaque $AB$, $\Gamma\Delta$ parallelae sunt [Eucl. VI, 2]. ergo [Eucl. I, 37]




$A\Delta\Gamma = B\Gamma\Delta$ et ablato, qui communis est, triangulo $\Gamma\Delta E$ erit reliquus $A\Delta E = \Gamma BE$.

De casibus autem dicendum, in parabola hyperbolaque nullum esse, in ellipsi autem duo; nam rectae contingentes, quae cum diametris in solis punctis contactus concurrunt, etiam cum iis productis concurrunt aut ut in uerbis Apollonii[1]) positum est aut ad alteram partem, in qua est $E$, sicut etiam in hyperbola est [I p. 319].

## Ad prop. II.

Casus huius propositionis inuenientur per propp. XLII et XLIII libri primi et scholia ad eas scripta. animaduertendum autem, si punctum $H$ inter $A$, $B$ sumatur, ita ut parallelae illae sint $MIHZ$, $AHK$, rectam $AK$ producendam esse usque ad sectionem uelut ad $N$ et per $N$ rectae $B\Delta$ parallelam ducendam $N\Xi$. ita enim propter ea, quae in propp. XLIX et L libri primi et in scholio ad eas dicta sunt, erit

In fig. $E$ om. W.

1) In figura 1 uol. I p. 320. itaque fig. 2 non habuit Eutocius.

*γωνον τῷ ΚΓ τετραπλεύρῳ ἴσον. ἀλλὰ τὸ ΚΞΝ ὅμοιόν ἐστι τῷ ΚΜΗ, διότι παράλληλός ἐστιν ἡ ΜΗ τῇ ΝΞ· ἔστι δὲ αὐτῷ καὶ ἴσον, διότι ἐφαπτομένη ἐστὶν ἡ ΑΓ, παράλληλος δὲ αὐτῇ ἡ ΗΝ, καὶ διάμετρος ἡ ΜΞ, καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΗΚ τῇ ΚΝ. ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶ τὸ ΚΝΞ τῷ τε ΚΓ καὶ τῷ ΚΜΗ, κοινοῦ ἀφαιρουμένου τοῦ ΑΗ λοιπὸν τὸ ΑΙΜ ἴσον ἐστὶ τῷ ΓΗ.*

### *Εἰς τὸ γ'.*

*Τὸ θεώρημα τοῦτο πλείους ἔχει πτώσεις, ἃς εὑρήσομεν ὁμοίως τῷ πρὸ αὐτοῦ. δεῖ μέντοι ἐπισκῆψαι, ὅτι τὰ λαμβανόμενα δύο σημεῖα ἢ μεταξύ ἐστι τῶν δύο διαμέτρων ἢ τὰ δύο ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη· εἰ γὰρ το μὲν ἕτερον ἐκτὸς λάβωμεν, τὸ δὲ ἕτερον μεταξὺ τῶν διαμέτρων, οὐ συνίσταται τὰ ἐν τῇ προτάσει λεγόμενα τετράπλευρα, ἀλλ' οὐδὲ ἐφ' ἑκάτερα τῶν διαμέτρων.*

### *Εἰς τὸ δ'.*

*Ἐν τῇ προτάσει τούτου τοῦ θεωρήματος καὶ τῶν ἐφεξῆς δεῖ ἐπιστῆσαι, ὅτι τῶν ἀντικειμένων λέγει ἀδιορίστως, καὶ τινὰ μὲν τῶν ἀντιγράφων τὰς δύο ἐφαπτομένας ἐπὶ τῆς μιᾶς τομῆς ἔχει, τινὰ δὲ οὐκέτι τὰς δύο ἐφαπτομένας ἐπὶ τῆς μιᾶς, ἀλλ' ἐφ' ἑκατέρας αὐτῶν μίαν συμπιπτούσας ἀλλήλαις, ὡς εἴρηται ἐν τῷ β' βιβλίῳ, ἐν τῇ ἐφεξῆς γωνίᾳ τῶν ἀσυμπτώτων, καὶ οὕτως δὲ κἀκείνως συμβαίνει τὰ τῆς προτάσεως, ὡς ἔξεστι τοῖς βουλομένοις καταγράφουσιν ἐπισκέπτεσθαι,*

---

2. *ἐστιν* e corr. m. 1 W. *ΚΜΗ*] *ΚΜΝ* Wp, corr. Halley, *kgm* Comm. *ΜΗ*] *ΜΝ* p. 3. *ἔστιν* W. 5. *ἐστί*] *ἐστίν* W. 7. *ἐστίν* W. 9. *εὑρήσωμεν* W. 11. *ἐστιν* W. 20. *ἀδιωρίστως* W. 21. *τῆς*] corr. ex *τῆι* in

$K N \Xi = K \Gamma$. uerum $K \Xi N$, $K M H$ similes sunt, quia $M H$, $N \Xi$ parallelae sunt. est autem etiam $K \Xi N = K M H$, quia $A \Gamma$ contingit eique parallela est $H N$, et $M \Xi$ diametrus est et $H K = K N$. quoniam igitur $K N \Xi = K \Gamma = K M H$, ablato, quod commune est, quadrilatero $A H$ erit reliquus $A I M = \Gamma H$.

## Ad prop. III.

Haec propositio complures casus habet, quos eodem modo inueniemus, quo in propositione praecedenti. in eo autem insistendum, ut duo, quae sumuntur, puncta aut inter duas diametros posita sint aut utrumque extra eas et ad easdem partes; si enim alterum extra sumimus, alterum inter diametros, quadrilatera illa in propositione significata non constituuntur, neque si ad utramque partem diametrorum sumuntur.

## Ad prop. IV.

In propositione huius theorematis sequentiumque animaduertendum, eum sectiones oppositas indefinite dicere, et alii codices duas rectas contingentes in altera sectione habent, alii autem non iam duas contingentes in altera, sed in singulis unam, concurrentes inter se, ut in libro II [32] dictum est, in angulo deinceps posito angulo asymptotarum, et quae in propositione dicta sunt, et hac et illa ratione eueniunt, ut iis, quicunque uoluerint, cognoscere licet descripta

---

scrib. W. 23. μίαν] scripsi, μιᾷ Wp. 24. β'] om. Wp, corr. Comm. τῇ] e corr. W. 25. οὕτω p. κἀκείνως] scripsi, κἀκείνῳ Wp. ὡς] addidi; om. Wp. 26. ἔξ-εστιν W.

πλὴν ὅτι, εἰ μὲν τῆς μιᾶς τῶν τομῶν δύο εὐθεῖαι ἐφάπτονται, ἡ διὰ τῆς συμπτώσεως αὐτῶν καὶ τοῦ κέντρου ἡ πλαγία διάμετρός ἐστι τῶν ἀντικειμένων, εἰ δὲ ἑκατέρας μία ἐστὶν ἐφαπτομένη, ἡ διὰ τῆς συμπτώσεως αὐτῶν καὶ τοῦ κέντρου ἡ ὀρθία διάμετρός ἐστιν.

Εἰς τὸ ε'.

Ἐπειδὴ ἀσαφές ἐστι τὸ ε' θεώρημα, λεκτέον ἐπὶ μὲν τῆς καταγραφῆς τῆς ἐχούσης τὴν μίαν ὀρθίαν διάμετρον·

ἐπεὶ δέδεικται τὸ ΗΘΜ τοῦ ΓΛΘ μεῖζον τῷ ΓΔΖ, ἴσον ἂν εἴη τὸ ΗΘΜ τῷ ΓΘΛ καὶ τῷ ΓΔΖ· ὥστε καὶ τῷ ΚΔΘ μετὰ τοῦ ΖΛΚ. τὸ ἄρα ΗΜΘ τοῦ ΚΔΘ διαφέρει τῷ ΚΛΖ. κοινοῦ ἀφαιρουμένου τοῦ ΘΔΚ λοιπὸν τὸ ΚΛΖ ἴσον τῷ ΚΔΜΗ.

ἐπὶ δὲ τῆς ἐχούσης τὴν πλαγίαν διάμετρον·

ἐπειδὴ προδέδεικται τὸ ΓΛΘ τοῦ ΜΘΗ μεῖζον τῷ ΓΔΖ, ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ΓΘΛ τῷ ΘΗΜ μετὰ τοῦ ΓΔΖ. κοινὸν ἀφῃρήσθω τὸ ΓΔΚΛ· λοιπὸν ἄρα τὸ ΚΘΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ΘΗΜ μετὰ τοῦ ΚΛΖ. ἔτι κοινὸν ἀφῃρήσθω τὸ ΜΘΗ· λοιπὸν ἄρα τὸ ΚΖΛ τῷ ΔΜΗΚ ἴσον.

πτώσεις δὲ ἔχει πολλάς, αἷς δεῖ ἐφιστάνειν ἀπὸ τῶν δεδειγμένων ἐν τῷ μδ' καὶ με' θεωρήματι τοῦ α' βιβλίου.

ἐν δὲ τῷ λέγειν ἀφῃρήσθω ἢ προσκείσθω τετράπλευρον ἢ τρίγωνον τὰς ἀφαιρέσεις ἢ προσθέσεις κατα τὴν οἰκειότητα τῶν πτώσεων χρὴ ποιεῖσθαι.

3. ἐστιν p. τῶν ἀντικειμένων] om. p. 4. εἰ] p?, ἡ W. μία] μιᾶς Wp, corr. Halley. 7. ἀσαφές] scripsi, σαφές Wp. 8. μίαν] om. Halley. 9. ἐπεί] ἐπί Wp, corr. Comm. ΓΛΘ] ΤΗ Wp, corr. Comm. 10. ΓΘΛ] ΓΘΑ p et, Α e corr., W; corr. Comm. 13. ΚΔΜΗ] Δ e

figura; nisi quod, si utraque recta alteram sectionem contingit, recta per punctum concursus earum centrumque ducta diametrus transuersa oppositarum erit, sin singulas una contingit, recta per punctum concursus earum centrumque ducta diametrus recta est.

## Ad prop. V.

Quoniam propositio V obscurior est, in figura, quae unam diametrum rectam habet, dicendum:

quoniam demonstratum est [I, 45], esse $H\Theta M$ maiorem quam $\Gamma\Lambda\Theta$ triangulo $\Gamma\Delta Z$, erit

$$H\Theta M = \Gamma\Theta\Lambda + \Gamma\Delta Z = K\Delta\Theta + Z\Lambda K.$$

itaque $HM\Theta$ a $K\Delta\Theta$ differt triangulo $K\Lambda Z$. ablato, qui communis est, triangulo $\Theta\Delta K$ erit reliquus $K\Lambda Z = K\Delta MH$.

in figura autem, quae diametrum transuersam habet:

quoniam antea demonstratum est [I, 45], $\Gamma\Lambda\Theta$ maiorem esse quam $M\Theta H$ triangulo $\Gamma\Delta Z$, erit $\Gamma\Theta\Lambda = \Theta HM + \Gamma\Delta Z$. auferatur, quod commune est, $\Gamma\Delta K\Lambda$; itaque reliquus $K\Theta\Delta = \Theta HM + K\Lambda Z$. rursus auferatur, qui communis est, $M\Theta H$; itaque reliquus $KZ\Lambda = \Delta MHK$.

casus autem multos habet, qui inueniendi sunt per ea, quae in propp. XLIV et XLV libri I demonstrata sunt.

cum dicimus autem aut auferatur aut adiiciatur quadrilaterum triangulusue, auferri aut adiici secundum proprietatem casuum oportet.

corr. W. 15. $M\Theta H$] $\overline{\mu\vartheta}$ ἠ Wp, corr. Comm. 16. τό] τῷ Wp, corr. Comm. 17. λοιπόν — 19. $M\Theta H$] bis p (multa euan., sicut etiam in sqq.). 18. ἐστίν W. 20. ἴσον] om. Wp, corr. Comm. 25. προσθέσεις] corr. ex προσθέσης m. 1 W.

ἴσον ἐστὶ τῷ *MKN* καὶ τῷ *ΑΕΖ*. κοινοῦ ἀφαιρουμένου τοῦ *KMN* λοιπὸν τὸ *ΑΕΖ* τῷ *ΚΑΕΝ* ἐστιν ἴσον. κοινὸν προσκείσθω τὸ *ΖΕΝΙ*· ὅλον ἄρα τὸ *ΑΙΝ* τρίγωνον τῷ *ΚΑΖΙ* ἐστιν ἴσον. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ *ΒΟΑ* ἴσον ἐστὶ τῷ *ΚΝΗΟ*.

## Εἰς τὸ ιγ'.

Ἐπεί ἐστιν, ὡς ἡ *ΑΘ* πρὸς *ΘΖ*, ἡ *ΘΒ* πρὸς *ΘΗ*, καί εἰσιν αἱ πρὸς τῷ *Θ* γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι, ἴσον τὸ *ΑΗΘ* τρίγωνον τῷ *ΒΘΖ* τριγώνῳ] ἐκκείσθω χωρὶς ἡ καταγραφὴ μόνων τῶν τριγώνων, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ *ΑΘ* εἰς τὸ *Ξ*, καὶ πεποιήσθω, ὡς ἡ *ΗΘ* πρὸς *ΘΒ*, ἡ *ΖΘ* πρὸς *ΘΞ*. ἐπεί ἐστιν, ὡς ἡ *ΘΒ* πρὸς *ΘΗ*, ἡ *ΑΘ* πρὸς *ΘΖ* καὶ ἡ *ΞΘ* πρὸς *ΘΖ*, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ *ΑΘ* τῇ *ΘΞ*· ὥστε καὶ τὸ *ΑΗΘ* τρίγωνον ἴσον τῷ *ΗΘΞ*. καὶ ἐπεί ἐστιν, ὡς ἡ *ΞΘ* πρὸς *ΘΖ*, ἡ *ΘΒ* πρὸς *ΘΗ*, καὶ περὶ ἴσας γωνίας τὰς κατὰ κορυφὴν πρὸς τῷ *Θ* ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραί, ἴσον ἐστὶ τὸ *ΖΘΒ* τρίγωνον τῷ *ΗΘΞ*· ὥστε καὶ τῷ *ΑΗΘ*.

ἔστι δὲ καὶ ἄλλως δεῖξαι ἴσα τὰ τρίγωνα.

ἐπεὶ γὰρ δέδεικται, ὡς ἡ *ΚΘ* πρὸς *ΘΒ*, ἡ *ΘΒ* πρὸς *ΘΗ*, ἀλλ' ὡς ἡ *ΚΘ* πρὸς *ΘΒ*, ἡ *ΑΚ* πρὸς *ΒΖ*,

---

1. ἐστί] ἐστίν W, om. p. 2. *KMN*] *K* e corr. p. τό] om. Wp, corr. Halley. *ΑΕΖ*] *Z* corr. ex *B*? m. 1 W. *ΚΑΕΝ* ἐστιν] *ΚΑ* et post lac. 3 litt. εν ἐστιν W, *ΚΑ* ἔνεστι p; corr. Halley. 3. *ΖΕΝΙ*] *I* e corr. p. *ΑΙΝ*] *ΑΝ* p. 4. *ΒΑΖΙ* p. ὁμοίως] ὅμοιον ὡς Wp, corr. Halley. καί] om. p. 5. ἐστίν W. *ΚΝΗΟ*] *ΚΝΗΘ* Wp, corr. Halley. 7. *ΑΘ*] *ΑΟ* Wp, corr. Comm. *ΘΒ*] U m. 2, *ΟΒ* Wp. 8. *Θ*] *O* Wp, corr. Halley. 9. *ΑΗΘ*] *ΔΗΘ* Wp, corr. Comm. 11. *ΑΘ* εἰς τὸ *Ξ*] *ΑΘΕ* τῇ τὸ *Ξ* Wp, corr. Comm. 12. *ΗΘ*] corr. ex *ΚΘ* p. *ΘΒ*] *ΘΕ* Wp, corr. Comm. *ΖΘ*] *Z* in ras. W, *ZE* p. 13. *ΑΘ*] *ΑΕ* Wp, corr. Comm.


itaque $MEΛ = MKN + ΛEZ$. ablato, qui communis est, triangulo $KMN$ erit reliquus $ΛEZ = KΛEN$. commune adiiciatur $ZENI$; ergo $ΛIN = KΛZI$. et similiter $BOΛ = KNHO$.

## Ad prop. XIII.

Quoniam est $ΛΘ : ΘZ = ΘB : ΘH$, et anguli ad $Θ$ positi duobus rectis aequales, erit $ΛHΘ = BΘZ$ I p. 340, 1—4] describatur enim seorsum figura triangulorum solorum, et $ΛΘ$ ad $Ξ$ producatur, fiatque $ZΘ : ΘΞ = HΘ : ΘB$. iam quoniam est

$$ΘB : ΘH = ΛΘ : ΘZ = ΞΘ : ΘZ,$$

erit [Eucl. V, 9] $ΛΘ = ΘΞ$. quare etiam $ΛHΘ = HΘΞ$ [Eucl. I, 38]. et quoniam est $ΞΘ : ΘZ = ΘB : ΘH$, et latera aequales angulos comprehendentia, qui ad $Θ$ ad uerticem inter se positi sunt, in contraria proportione sunt, erit




$$ZΘB = HΘΞ$$

[Eucl. VI, 15]. ergo etiam $ZΘB = ΛHΘ$.

uerum aliter quoque demonstrari potest, triangulos aequales esse.

quoniam enim demonstratum est, esse

$$KΘ : ΘB = ΘB : ΘH \text{ [I p. 338, 25]},$$

---

14. $ΛΘ$] $Θ$ e corr. p. $ΘΞ$] $ΘZ$ Wp, corr. Comm. $ΛHΘ$] $H$ e corr. p. 15. ἴσον] ἐν Wp, corr. Comm. $HΘΞ$] $HΘZ$ Wp, corr. Comm. 16. ἡ $ΘB$ πρός] in ras. m. 1 W. 18. ἐστίν W. 19. ἔστιν W. 21. $BZ$] $ΘZ$ Wp, corr. Comm.

*καὶ ὡς ἄρα ἡ ΑΚ πρὸς ΒΖ, ἡ ΒΘ πρὸς ΗΘ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΚ, ΘΗ ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΒΖ, ΒΘ ὀρθογωνίῳ. καὶ ἐπεὶ ἴσαι εἰσὶν αἱ ὑπὸ ΗΘΝ, ΘΒΖ, ἐὰν ἀναγράψωμεν παραλληλόγραμμα ῥομβοειδῆ ὑπὸ τῶν αὐτῶν περιεχόμενα πλευρῶν τοῖς ὀρθογωνίοις ἴσας ἔχοντα τὰς πρὸς τοῖς Θ, Β, ἴσα ἔσται καὶ αὐτὰ διὰ τὴν τῶν πλευρῶν ἀντιπεπόνθησιν. ἔσται δὴ τὸ περιεχόμενον ῥομβοειδὲς ὑπὸ τῶν ΖΒ, ΒΘ ἐν τῇ Β γωνίᾳ διπλάσιον τοῦ ΘΒΖ τριγώνου· διάμετρος γὰρ αὐτοῦ ἔσται ἡ ΖΘ· τὸ δὲ περιεχόμενον ὑπὸ τῆς ΗΘ καὶ τῆς ἴσης τῇ ΑΚ ἀπὸ τῆς ΘΝΛ ἀφαιρουμένης ἐν τῇ ὑπὸ ΗΘΝ γωνίᾳ διπλάσιόν ἐστι τοῦ ΛΗΘ τριγώνου· ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεώς εἰσι τῆς ΗΘ καὶ ὑπὸ τὴν αὐτὴν παράλληλον τὴν ἀπὸ τοῦ Λ παρὰ τὴν ΗΘ ἀγομένην. ὥστε ἴσον τὸ ΛΗΘ τῷ ΖΒΘ.*

### *Εἰς τὸ ιϛʹ.*

*Ἔν τισι τῶν ἀντιγράφων τοῦτο ὡς θεώρημα ὡς ιζʹ παρέκειτο, ἔστι δὲ κατὰ ἀλήθειαν πτῶσις τοῦ ιϛʹ· μόνον γάρ, ὅτι αἱ ΛΓΒ ἐφαπτόμεναι παράλληλοι γίνονται ταῖς διαμέτροις, τὰ δὲ ἄλλα ἐστὶ τὰ αὐτά. ἐν σχολίοις οὖν ἔδει τοῦτο κεῖσθαι, ὥσπερ ἐγράψαμεν καὶ εἰς τὸ μαʹ τοῦ αʹ βιβλίου.*

*Ἐὰν ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως καὶ τοῦ κύκλου αἱ διὰ τῶν*


---

1. πρός (pr.)] bis p. 2. ΘΗ] om. Wp, corr. Comm. ἐστίν W. ΒΘ] Β e corr. p. 3. ΗΘΝ] Η supra scr. m. 1 W. 6. τάς] addidi, om. Wp. Β γωνίας Halley. 7. δή] δέ Halley. 8. ὑπὸ τῶν] om. Wp, corr. Halley. 11. ΘΝΛ] scripsi, ΘΛΝ Wp. 12. ΗΘΝ] ΘΝ Wp, corr. Comm. ἐστιν W. ΛΗΘ] in ras. W. 13. εἰσιν W. ΗΘ καί] ΗΘΚ p et seq. lac. 2 litt. W, corr. Halley cum Comm. 16. ιϛʹ] p, ϛ W. 17. τισιν W. ὡς (pr.)] e corr. W; fort. delendum. ὡς (alt.)] om. p? 18. ἔστιν W. κατ' Halley. 20. ἐστίν W.

et $K\Theta : \Theta B = AK : BZ$ [I p. 338, 26], erit etiam $AK : BZ = B\Theta : H\Theta$. itaque $AK \times \Theta H = BZ \times B\Theta$. et quoniam $\angle H\Theta N = \Theta BZ$, si parallelogramma rhomboidea descripserimus iisdem lateribus comprehensa, quibus rectangula, et angulos ad $\Theta$, $B$ positos aequales habentia, haec quoque propter proportionem contrariam laterum aequalia erunt [Eucl. VI, 14]. iam rhomboides rectis $ZB$, $B\Theta$ in angulo $B$ comprehensum duplo maius erit triangulo $\Theta BZ$ [Eucl. I, 34]; $Z\Theta$ enim diametrus eius erit. parallelogrammum autem, quod ab $H\Theta$ rectaque rectae $AK$ aequali a $\Theta NA$ ablata in angulo $H\Theta N$ comprehenditur, duplo maius est triangulo $AH\Theta$ [Eucl. I, 41]; nam in eadem basi sunt $H\Theta$ et sub eadem parallela, quae ab $A$ rectae $H\Theta$ parallela ducitur. ergo $AH\Theta = ZB\Theta$.

## Ad prop. XVI.

In nonnullis codicibus hoc pro theoremate tanquam propositio XVII adpositum erat, est autem re




uera casus propositionis XVI; nam eo tantum differt, quod rectae contingentes $A\Gamma$, $\Gamma B$ diametris parallelae fiunt, cetera autem eadem sunt. in scholiis igitur ponendum erat, sicut etiam ad prop. XLI libri primi scripsimus.

Si in ellipsi circuloque diametri per puncta con-

In fig. pro $I$ hab. $C$ W.

καὶ ὡς ἄρα ἡ $AK$ πρὸς $BZ$, ἡ $B\Theta$ πρὸς $H\Theta$· τὸ ἄρα ὑπὸ $AK$, $\Theta H$ ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ $BZ$, $B\Theta$ ὀρθογωνίῳ. καὶ ἐπεὶ ἴσαι εἰσὶν αἱ ὑπὸ $H\Theta N$, $\Theta BZ$, ἐὰν ἀναγράψωμεν παραλληλόγραμμα ῥομβοειδῆ ὑπὸ τῶν αὐτῶν περιεχόμενα πλευρῶν τοῖς ὀρθογωνίοις ἴσας ἔχοντα τὰς πρὸς τοῖς $\Theta$, $B$, ἴσα ἔσται καὶ αὐτὰ διὰ τὴν τῶν πλευρῶν ἀντιπεπόνθησιν. ἔσται δὴ τὸ περιεχόμενον ῥομβοειδὲς ὑπὸ τῶν $ZB$, $B\Theta$ ἐν τῇ $B$ γωνίᾳ διπλάσιον τοῦ $\Theta BZ$ τριγώνου· διάμετρος γὰρ αὐτοῦ ἔσται ἡ $Z\Theta$· τὸ δὲ περιεχόμενον ὑπὸ τῆς $H\Theta$ καὶ τῆς ἴσης τῇ $AK$ ἀπὸ τῆς $\Theta N A$ ἀφαιρουμένης ἐν τῇ ὑπὸ $H\Theta N$ γωνίᾳ διπλάσιόν ἐστι τοῦ $AH\Theta$ τριγώνου· ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεώς εἰσι τῆς $H\Theta$ καὶ ὑπὸ τὴν αὐτὴν παράλληλον τὴν ἀπὸ τοῦ $A$ παρὰ τὴν $H\Theta$ ἀγομένην. ὥστε ἴσον τὸ $AH\Theta$ τῷ $ZB\Theta$.

## Εἰς τὸ ιϛ'.

Ἔν τισι τῶν ἀντιγράφων τοῦτο ὡς θεώρημα ὡς ιζ' παρέκειτο, ἔστι δὲ κατὰ ἀλήθειαν πτῶσις τοῦ ιϛ'· μόνον γάρ, ὅτι αἱ $A\Gamma B$ ἐφαπτόμεναι παράλληλοι γίνονται ταῖς διαμέτροις, τὰ δὲ ἄλλα ἐστὶ τὰ αὐτά. ἐν σχολίοις οὖν ἔδει τοῦτο κεῖσθαι, ὥσπερ ἐγράψαμεν καὶ εἰς τὸ μα' τοῦ α' βιβλίου.


Ἐὰν ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως καὶ τοῦ κύκλου αἱ διὰ τῶν

1. πρός (pr.)] bis p. 2. $\Theta H$] om. Wp, corr. Comm. ἐστίν W. $B\Theta$] $B$ e corr. p. 3. $H\Theta N$] $H$ supra scr. m. 1 W. 6. τάς] addidi, om. Wp. $B$ γωνίας Halley. 7. δή] δέ Halley. 8. ὑπὸ τῶν] om. Wp, corr. Halley. 11. $\Theta N A$] scripsi, $\Theta A N$ Wp. 12. $H\Theta N$] $\Theta N$ Wp, corr. Comm. ἐστιν W. $AH\Theta$] in ras. W. 13. εἰσιν W. $H\Theta$ καί] $H\Theta K$ p et seq. lac. 2 litt. W, corr. Halley cum Comm. 16. ιϛ'] p, ϛ W. 17. τισιν W. ὡς (pr.)] e corr. W; fort. delendum. ὡς (alt.)] om. p? 18. ἔστιν W. κατ' Halley. 20. ἐστίν W.

et $K\Theta : \Theta B = AK : BZ$ [I p. 338, 26], erit etiam $AK : BZ = B\Theta : H\Theta$. itaque $AK \times \Theta H = BZ \times B\Theta$. et quoniam $\angle H\Theta N = \Theta BZ$, si parallelogramma rhomboidea descripserimus iisdem lateribus comprehensa, quibus rectangula, et angulos ad $\Theta$, $B$ positos aequales habentia, haec quoque propter proportionem contrariam laterum aequalia erunt [Eucl. VI, 14]. iam rhomboides rectis $ZB$, $B\Theta$ in angulo $B$ comprehensum duplo maius erit triangulo $\Theta BZ$ [Eucl. I, 34]; $Z\Theta$ enim diametrus eius erit. parallelogrammum autem, quod ab $H\Theta$ rectaque rectae $AK$ aequali a $\Theta NA$ ablata in angulo $H\Theta N$ comprehenditur, duplo maius est triangulo $AH\Theta$ [Eucl. I, 41]; nam in eadem basi sunt $H\Theta$ et sub eadem parallela, quae ab $A$ rectae $H\Theta$ parallela ducitur. ergo $AH\Theta = ZB\Theta$.

## Ad prop. XVI.

In nonnullis codicibus hoc pro theoremate tanquam propositio XVII adpositum erat, est autem re




uera casus propositionis XVI; nam eo tantum differt, quod rectae contingentes $A\Gamma$, $\Gamma B$ diametris parallelae fiunt, cetera autem eadem sunt. in scholiis igitur ponendum erat, sicut etiam ad prop. XLI libri primi scripsimus.

Si in ellipsi circuloque diametri per puncta con-

---

In fig. pro $I$ hab. $C$ W.

ἀφῶν διάμετροι παράλληλοι ὦσι ταῖς ἐφαπτομέναις, καὶ οὕτως ἔσται τὰ τῆς προτάσεως.

ἐπεὶ ὡς τὸ ἀπὸ *ΒΘ* πρὸς τὸ ὑπὸ *ΛΘΑ*, οὕτως τὸ ἀπὸ *ΔΗ* πρὸς τὸ ὑπὸ *ΛΗΑ*, καί ἐστι τὸ μὲν ὑπὸ *ΛΘΑ* ἴσον τῷ ἀπὸ *ΘΑ*, τὸ δὲ ὑπὸ *ΛΗΑ* ἴσον τῷ ὑπὸ *ΙΑΗ*· ἴση γὰρ ἡ *ΛΘ* τῇ *ΘΑ* καὶ ἡ *ΔΚ* τῇ *ΚΖ* καὶ ἡ *ΗΘ* τῇ *ΘΙ* καὶ ἡ *ΛΗ* τῇ *ΙΑ*· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ *ΑΘ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΘΒ*, τουτέστι τὸ ἀπὸ *ΒΓ* πρὸς το ἀπὸ *ΓΑ*, τὸ ὑπὸ *ΙΑΗ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΔΗ*, τουτέστι τὸ ὑπὸ *ΖΕΔ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΕΑ*.

## Εἰς τὸ ιζ′.

Καὶ τοῦτο ὁμοίως τῷ πρὸ αὐτοῦ ἔκειτο θεώρημα, ὅπερ ἡμεῖς ὡς πτῶσιν ἀφελόντες ἐνταῦθα ἐγράψαμεν·

Ἐὰν ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως καὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας αἱ διὰ τῶν ἀφῶν ἀγόμεναι διάμετροι παράλληλοι ὦσι ταῖς ἐφαπτομέναις ταῖς *ΒΓ*, *ΓΑ*, καὶ οὕτως ἐστίν, ὡς τὸ ἀπὸ *ΓΑ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓΒ*, τὸ ὑπὸ *ΚΖΕ* πρὸς τὸ ὑπὸ *ΔΖΘ*.

ἤχθωσαν διὰ τῶν *Δ*, *Θ* τεταγμένως κατηγμέναι αἱ *ΔΠ*, *ΘΜ*. ἐπεὶ οὖν ἐστιν, ὡς τὸ ἀπὸ *ΑΓ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓΒ*, τὸ ἀπὸ *ΒΝ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΝΑ*, τουτέστι πρὸς τὸ ὑπὸ *ΑΝΛ*, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ *ΒΝ* πρὸς τὸ ὑπὸ *ΑΝΛ*, τὸ ἀπὸ *ΔΠ*, τουτέστι τὸ ἀπὸ *ΖΟ*, πρὸς τὸ ὑπὸ *ΑΠΛ* καὶ τὸ ἀπὸ *ΕΟ* πρὸς τὸ ὑπὸ *ΑΟΛ*, καὶ λοιπὸν ἄρα πρὸς λοι-

1. ὦσι] p, ὦσιν W. 3. ὡς τὸ ἀπό] m. 2 U, ἡ Wp. οὕτω p. 4. *ΛΗΑ*] *ΛΠΑ* Wp, corr. U m. 2 (in W fort. *Η* scriptum est, sed litterae *Π* simile). ἐστιν W. 8. τουτέστιν W. 9. τουτέστιν W. 10. *ΖΕΔ*] m. 2 U, *ΖΕΑ* Wp. 12—19. euan. p. 15. ὦσιν W. 20. *ΘΜ*] *ΟΜ* Wp, corr. Comm. 21. τουτέστιν W. 22. τό (sec.)] om. p. 23. τουτέστιν W. 24. *ΕΟ*] *ΕΘ* Wp, corr. Comm.


tum ad totum. sin ab $EO^2$ aufertur $\varDelta\Pi^2$ siue $ZO^2$, relinquitur $KZ \times ZE$ [Eucl. II, 5]; nam $KO = OE$. sin ab $AO \times O\varLambda$ aufertur $A\Pi \times \Pi\varLambda$, relinquitur[1]) $MO \times O\Pi$ siue $\Theta Z \times Z\varDelta$; nam $A\Pi = M\varLambda$ et $\Pi N = NM$. ergo $\Gamma A^2 : \Gamma B^2 = KZ \times ZE : \varDelta Z \times Z\Theta$.

sin $Z$ extra sectionem positum est, additiones et ablationes e contrario faciendae sunt.

## Ad prop. XVIII.

In nonnullis codicibus huius propositionis alia demonstratio inuenta est:

Si utramque sectionem contingentes rectae concurrunt, sic quoque erunt, quae diximus.




sint enim oppositae $A$, $B$ easque contingentes $A\Gamma$, $\Gamma B$ in $\Gamma$ concurrentes, et in $B$ sectione sumatur punctum $\varDelta$, et per id rectae $A\Gamma$ parallela ducatur $E\varDelta Z$. dico, esse

$$A\Gamma^2 : \Gamma B^2 = EZ \times Z\varDelta : ZB^2.$$

nam per $A$ ducatur diametrus $A\Theta H$, per $B$, $H$ autem rectae $EZ$ parallelae $HK$, $B\varLambda$. quoniam igitur a $B$ hyperbolam contingit $B\Theta$ et ordinate ducta est $B\varLambda$, erit $A\varLambda : \varLambda H = A\Theta : \Theta H$ [I, 36]. est autem $A\varLambda : \varLambda H = \Gamma B : BK$[2]) et $A\Theta : \Theta H = A\Gamma : KH$

Fig. hab. Wp, sed sine litteris.

1) U. Pappi lemma 3 ad libr. II, et cfr. Eutocius ad II, 23.
2) Nam $A\Theta : \Theta\varLambda = \Gamma\Theta : \Theta B$, $A\varLambda : \Gamma B = \Theta\varLambda : \Theta B = H\varLambda : KB$.

*πόν ἐστιν, ὡς ὅλον πρὸς ὅλον. ἀλλ' ἐὰν μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπὸ ΕΟ ἀφαιρεθῇ τὸ ἀπὸ ΔΠ, τουτέστι τὸ ἀπὸ ΖΟ, καταλείπεται τὸ ὑπὸ ΚΖΕ· ἴση γὰρ ἡ ΚΟ τῇ ΟΕ· ἐὰν δὲ ἀπὸ τοῦ ὑπὸ ΑΟΛ ἀφαιρεθῇ τὸ ὑπὸ ΑΠΛ, λείπεται τὸ ὑπὸ ΜΟΠ, τουτέστι τὸ ὑπὸ ΘΖΔ· ἴση γὰρ ἡ ΑΠ τῇ ΜΛ καὶ ἡ ΠΝ τῇ ΝΜ. ἔστιν ἄρα, ὡς τὸ ἀπὸ ΓΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ, λοιπὸν τὸ ὑπὸ ΚΖΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΖΘ.*

*ὅταν δὲ τὸ Ζ ἐκτὸς ᾖ τῆς τομῆς, τὰς προσθέσεις καὶ ἀφαιρέσεις ἀνάπαλιν ποιητέον.*

### *Εἰς τὸ ιη'.*

*Ἔν τισιν ἀντιγράφοις ηὑρέθη ἑτέρα ἀπόδειξις τούτου τοῦ θεωρήματος·*

*Ἐὰν ἑκατέρας τῶν τομῶν ἐφαπτόμεναι εὐθεῖαι συμπίπτωσι, καὶ οὕτως ἔσται τὰ εἰρημένα.*

*ἔστωσαν γὰρ ἀντικείμεναι αἱ Α, Β καὶ ἐφαπτόμεναι αὐτῶν αἱ ΑΓ, ΓΒ συμπίπτουσαι κατὰ τὸ Γ, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς Β τομῆς τὸ Δ, καὶ δι' αὐτοῦ παρὰ τὴν ΑΓ ἤχθω ἡ ΕΔΖ. λέγω, ὅτι ἐστίν, ὡς τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ, τὸ ὑπὸ ΕΖΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΒ.*

*ἤχθω γὰρ διὰ τοῦ Α διάμετρος ἡ ΑΘΗ, διὰ δὲ τῶν Β, Η παρὰ τὴν ΕΖ αἱ ΗΚ, ΒΛ. ἐπεὶ οὖν ἀπὸ τοῦ Β ἐφάπτεται μὲν τῆς ὑπερβολῆς ἡ ΒΘ, τεταγμένως*

1. *ἀπὸ ΕΟ*] *ΕΘ* Wp, corr. Comm. 2. *ΔΠ*] *ΔΗ* Wp, corr. Comm. *τουτέστιν* W. *ΖΟ*] *ΖΘ* Wp, corr. Comm. 3. *ΚΟ*] *ΚΘ* Wp, corr. Comm. *ΟΕ*] *ΘΕ* Wp, corr. Comm. 4. *ὑπὸ ΑΟΛ*] *ΑΘΛ* Wp, corr. Comm. *τό*] *τά* Wp, corr. Comm. *ὑπό*] *ἀπό* p. 5. *ΜΟΠ*] *ΟΜΠ* Wp, corr. Comm. *τουτέστιν* W. 7. *τό* (pr.)] p, *τῶι* W. 9. *ἐκτὸς ᾖ*] scripsi, *ἐκ τῶν* W, *ἐκτός* p. 12. *ηὑρέθη*] -υ- in ras. W, *εὑρέθη* p. 14. *ἐάν*] om. Wp, corr. Halley. 19. *ΕΔΖ*] scripsi, *ΔΕΖ* Wp. 20. *ὑπό*] *ἀπό* Wp, corr. Halley cum Comm.


tum ad totum. sin ab $EO^2$ aufertur $\Delta\Pi^2$ siue $ZO^2$, relinquitur $KZ \times ZE$ [Eucl. II, 5]; nam $KO = OE$. sin ab $\Lambda O \times O\Lambda$ aufertur $\Lambda\Pi \times \Pi\Lambda$, relinquitur[1]) $MO \times O\Pi$ siue $\Theta Z \times Z\Delta$; nam $\Lambda\Pi = M\Lambda$ et $\Pi N = NM$. ergo $\Gamma\Lambda^2 : \Gamma B^2 = KZ \times ZE : \Delta Z \times Z\Theta$.

sin $Z$ extra sectionem positum est, additiones et ablationes e contrario faciendae sunt.

## Ad prop. XVIII.

In nonnullis codicibus huius propositionis alia demonstratio inuenta est:

Si utramque sectionem contingentes rectae concurrunt, sic quoque erunt, quae diximus.




sint enim oppositae $A$, $B$ easque contingentes $A\Gamma$, $\Gamma B$ in $\Gamma$ concurrentes, et in $B$ sectione sumatur punctum $\Delta$, et per id rectae $A\Gamma$ parallela ducatur $E\Delta Z$. dico, esse

$$A\Gamma^2 : \Gamma B^2 = EZ \times Z\Delta : ZB^2.$$

nam per $A$ ducatur diametrus $A\Theta H$, per $B$, $H$ autem rectae $EZ$ parallelae $HK$, $B\Lambda$. quoniam igitur a $B$ hyperbolam contingit $B\Theta$ et ordinate ducta est $B\Lambda$, erit $A\Lambda : \Lambda H = A\Theta : \Theta H$ [I, 36]. est autem $A\Lambda : \Lambda H = \Gamma B : BK$[2]) et $A\Theta : \Theta H = A\Gamma : KH$

Fig. hab. Wp, sed sine litteris.

1) U. Pappi lemma 3 ad libr. II, et cfr. Eutocius ad II, 23.
2) Nam $A\Theta : \Theta\Lambda = \Gamma\Theta : \Theta B$, $A\Lambda : \Gamma B = \Theta\Lambda : \Theta B = H\Lambda : KB$.

δὲ ἦκται ἡ ΒΑ, ἔστιν, ὡς ἡ ΑΛ πρὸς ΛΗ, ἡ ΑΘ πρὸς ΘΗ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΑΛ πρὸς ΛΗ, ἡ ΓΒ πρὸς ΒΚ, ὡς δὲ ἡ ΑΘ πρὸς ΘΗ, ἡ ΑΓ πρὸς ΚΗ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΓΒ πρὸς ΒΚ, ἡ ΑΓ πρὸς ΗΚ. καὶ ἐναλλάξ, ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΒ, ἡ ΗΚ πρὸς ΚΒ, καὶ ὡς τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ, τὸ ἀπὸ ΗΚ πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΒ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΗΚ πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΒ, οὕτως ἐδείχθη τὸ ὑπὸ ΕΖΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΒ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ, τὸ ὑπὸ ΕΖΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΒ.

## Εἰς τὸ ιθ'.

Ἔν τισιν ἀντιγράφοις ηὑρέθη ἀπόδειξις τούτου τοῦ θεωρήματος τοιαύτη·

ἤχθω δὴ ἡ μὲν ΜΛ παρὰ τὴν ΖΑ τέμνουσα τὴν ΔΓ τομήν, ἡ δὲ ΗΛ παρὰ τὴν ΖΔ τέμνουσα την ΑΒ. δεικτέον, ὅτι ὁμοίως ἐστίν, ὡς τὸ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΗΛΙ πρὸς τὸ ὑπὸ ΜΛΞ.

ἤχθωσαν γὰρ διὰ τῶν Α, Δ ἁφῶν διάμετροι αἱ ΑΓ, ΔΒ, καὶ διὰ τῶν Γ, Β ἤχθωσαν παρὰ τὰς ἐφαπτομένας αἱ ΒΠ, ΓΠ· ἐφάπτονται δὴ αἱ ΒΠ, ΓΠ τῶν τομῶν κατὰ τὰ Β, Γ. καὶ ἐπεὶ κέντρον ἐστὶ τὸ Ε, ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΒΕ τῇ ΔΕ, ἡ δὲ ΑΕ τῇ ΕΓ· διὰ δὲ τοῦτο, καὶ ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ ΑΤΖ τῇ ΓΣΠ,

---

3. ὡς — 4. ΗΚ] om. p. 4. ἡ ΑΓ πρὸς ΗΚ] om. W, corr. Halley (οὕτως ἡ) cum Comm. (*kg*). 5. ΑΓ] ΑΒ Wp, corr. Comm. ΗΚ] Κ e corr. p. 6. ΗΚ] Κ e corr. m. 1 W. 9. ΕΖΔ] ΕΖΗ Wp, corr. Comm. 12. εὑρέθη p. 16. δεικτέον] p, δεικταῖον W. 17. οὕτω p. ΗΛΙ] ΗΙΛ W, ΝΙΛ p, corr. Comm. ΜΛΞ] ΜΛΖ p. 19. Γ, Β] Β, Γ Halley. 20. ΒΠ] mut. in ΒΗ m. 1 W, ΒΗ p. ΒΠ] ΒΗ Wp, corr. Comm. 21. τά] p, om. W. 22. ΒΕ] ΒΘ W et e corr. p; corr. Comm. ΔΕ] scripsi, ΔΘ W et, Θ e corr., p; *ed* Comm.

tiones contingunt. et quoniam $E$ centrum est, erit $BE = \varDelta E$, $AE = E\Gamma$ [I, 30]; et hac de causa et quia $ATZ$, $\Gamma\Sigma\Pi$ parallelae sunt, erit $\varDelta E = EB$, $TE = E\Sigma$, $\varDelta\Sigma = TB$[1]); quare etiam $B\Sigma = T\varDelta$ et $\triangle B\Pi\Sigma = \varDelta TZ$ [Eucl. VI, 19]. quare etiam $B\Pi = \varDelta Z$ [Eucl. VI, 4]. iam similiter demonstrabimus, esse etiam $\Gamma\Pi = AZ$. est autem [III, 19]

$$B\Pi^2 : \Pi\Gamma^2 = HA \times AI : MA \times A\Xi.$$

ergo etiam $\varDelta Z^2 : ZA^2 = HA \times AI : MA \times A\Xi$.

## Aliud ad eandem propositionem.

Rursus utraque $H\Theta K$, $I\Theta A$ parallela ducatur sectionem $\varDelta\Gamma$ secans. demonstrandum, sic quoque esse $AZ^2 : Z\varDelta^2 = H\Theta \times \Theta K : I\Theta \times \Theta A$.

ducatur enim per $A$ punctum contactus diametrus $A\Gamma$, et rectae $AZ$ parallela ducatur $\Gamma M$; $\Gamma M$ igitur sectionem $\Gamma\varDelta$ in $\Gamma$ continget [Eutocius ad I, 44]. et erit [III, 17] $\varDelta M^2 : M\Gamma^2 = I\Theta \times \Theta A : H\Theta \times \Theta K$. est autem $\varDelta M^2 : M\Gamma^2 = \varDelta Z^2 : ZA^2$[2]). ergo

$$\varDelta Z^2 : ZA^2 = I\Theta \times \Theta A : H\Theta \times \Theta K.$$

1) Nam $AE : E\Gamma = TE : E\Sigma$ (Eucl. VI, 4); itaque $TE = E\Sigma$. et quia $BE = E\varDelta$, erit $BT = \Sigma\varDelta$. tum communis adiiciatur $T\Sigma$.

2) Cfr. Eutocius ad III, 18 p. 332, 5 sq.


τὸ ὑπὸ $MA\Xi$ Halley cum Comm. 10. τομήν] om. p. 11. $AZ$] scripsi, $\varDelta Z$ Wp. $Z\varDelta$] scripsi, $ZAO$ Wp, $ZA$ Comm. οὕτω p. 12. $H\Theta K$ et $I\Theta A$ permut. Comm. $I\Theta A$] $I$ e corr. W. 13. $A\Gamma$] $A\Pi$ Wp, corr. Comm. 14. $AZ$] $AZ$ η $\Gamma M$ Wp, corr. Halley cum Comm. 18. $M\Gamma$ — 19. πρὸς τό] om. p. 22. $ZA$] p, $A$ incert. W. ὡς — 23. $ZA$] om. Wp, corr. Halley cum Comm. ($ZA$ οὕτως). 23. ὑπό] uel ἀπό p.

ἴση ἐστὶ καὶ ἡ μὲν ΔΕ τῇ ΕΒ, ἡ δὲ ΔΣ τῇ ΤΒ. ὥστε καὶ ἡ ΒΣ τῇ ΤΔ, καὶ ἴσον ἐστὶ τὸ ΒΠΣ τρίγωνον τῷ ΔΤΖ τριγώνῳ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΒΠ τῇ ΔΖ. ὁμοίως δὴ δειχθήσεται καὶ ἡ ΓΠ τῇ ΑΖ ἴση. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΒΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΓ, οὕτως ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΗΛΙ πρὸς τὸ ὑπὸ ΜΛΞ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ.

### Ἄλλο εἰς τὸ αὐτό.

Ἤχθω πάλιν ἑκατέρα τῶν ΗΘΚ, ΙΘΛ παράλληλος τέμνουσα τὴν ΔΓ τομήν. δεικτέον, ὅτι καὶ οὕτως ἐστίν, ὡς τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΗΘΚ πρὸς τὸ ὑπὸ ΙΘΛ.

ἤχθω γὰρ διὰ τῆς Α ἁφῆς διάμετρος ἡ ΑΓ, παρὰ δὲ τὴν ΑΖ ἤχθω ἡ ΓΜ· ἐφάψεται δὴ ἡ ΓΜ τῆς ΓΔ τομῆς κατὰ τὸ Γ· καὶ ἔσται, ὡς τὸ ἀπὸ ΔΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΓ, τὸ ὑπὸ ΙΘΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΘΚ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΔΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΓ, τὸ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ, τὸ ὑπὸ ΙΘΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΘΚ.




In fig. litt. *I*, *Γ*, *H* om. W, pro *Λ* hab. *Δ*.

1. ἐστίν W. ΔΕ] ΤΕ Halley cum Comm. ΕΒ] ΕΣ Halley cum Comm. Fort. scrib. ΕΒ, ἡ δὲ ΤΕ τῇ ΕΣ, ἡ δὲ κτλ. ΔΣ] ΑΕ Wp, corr. Halley. 2. ἐστίν W. 3. ἄρα] bis p. 5. ἀπὸ ΒΠ] ΒΖΠ p et corr. ex ΓΖΠ m. 1 W; corr. Comm. τό] om. p. ἐστίν W. ΗΛΙ] ΜΛΞ Wp, corr. Comm. 6. ΜΛΞ] ΗΜ Wp, corr. Comm. 7. ἀπό] om. Wp, corr. Halley cum Comm. ΖΑ οὕτως τὸ ὑπὸ ΗΛΙ πρὸς

Haec propositi[illegible] multi[illegible]

[illegible] autem [illegible] nonnulli[illegible]

[illegible]

*ΛΑ*, τὸ ἀπὸ *ΚΘ*, τουτέστι τὸ ὑπὸ *ΘΚΤ*, πρὸς το ἀπὸ *ΗΚ*, τουτέστι τὸ ὑπὸ *ΗΚΟ*.

τῶν αὐτῶν ὄντων ἐὰν ἡ μὲν *ΘΚΠ*, τουτέστιν ἡ παρὰ τὴν *ΕΛ* ἀγομένη, διὰ τοῦ *Κ* κέντρου ἐμπίπτῃ, η δὲ *ΗΟ* μὴ διὰ τοῦ κέντρου, λέγω, ὅτι καὶ οὕτως ἐστίν, ὡς τὸ ἀπὸ *ΕΛ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΛΑ*, τὸ ὑπὸ *ΘΞΠ* πρὸς τὸ ὑπὸ *ΗΞΟ*.

ἤχθωσαν γὰρ διὰ τῶν *Ο*, *Π* ταῖς ἐφαπτομέναις παράλληλοι αἱ *ΟΡ*, *ΠΣ*. ἐπεὶ οὖν τὸ *ΜΟΡ* τοῦ *ΜΝΚ* τριγώνου μεῖζον τῷ *ΑΚΤ*, τῷ δὲ *ΑΚΤ* ἴσον τὸ *ΚΣΠ*, ἴσον τὸ *ΜΟΡ* τοῖς *ΜΝΚ*, *ΚΣΠ* τριγώνοις· ὥστε λοιπὸν τὸ *ΞΡ* τετράπλευρον τῷ *ΞΣ* τετραπλεύρῳ ἴσον. καὶ ἐπεί ἐστιν, ὡς τὸ ἀπὸ *ΕΛ* πρὸς τὸ *ΕΛΤ* τρίγωνον, οὕτως τό τε ἀπὸ *ΠΚ* πρὸς τὸ *ΚΣΠ* καὶ τὸ ἀπὸ *ΚΞ* πρὸς τὸ *ΚΞΝ*, ἔσται, ὡς τὸ ἀπὸ *ΕΛ* πρὸς τὸ *ΕΛΤ*, οὕτως λοιπὸν τὸ ὑπὸ *ΘΞΠ* πρὸς τὸ *ΞΡ* τετράπλευρον. καί ἐστι τῷ μὲν *ΕΛΤ* τριγώνῳ ἴσον τὸ *ΑΦΛ*, τὸ δὲ *ΞΡ* τετράπλευρον τῷ *ΣΞ*· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ *ΕΛ* πρὸς τὸ *ΑΛΦ*, τὸ ὑπὸ *ΘΞΠ* πρὸς τὸ *ΞΣ*. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καί, ὡς τὸ *ΑΛΦ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΑΛ*, τὸ *ΞΣ* πρὸς

---

1. τουτέστιν W. *ΘΚΤ*] scripsi, *ΘΚΓ* Wp. 2. τουτέστιν W. *ΗΚΟ*] *ΗΚΘ* Wp, corr. Comm. 4. ἐμπίπτῃ] p, ἐμπίπτει corr. ex ἐνπίπτει W. 5. ἡ δὲ *ΗΟ*] δὲ ἡ *ΗΜ* Wp, corr. Halley cum Comm. 6. *ΘΞΠ*] *ΟΞΠ* Wp, corr. Comm. 7. τό] om. p. *ΗΞΟ*] *ΝΞΟ* p. 9. *ΠΣ*] *ΠΕ* Wp, corr. Comm. 10. μείζων comp. p. τῷ (pr.)] m. 2 U, τό Wp. *ΚΣΠ*] *ΚΕΠ* Wp, corr. Comm. 12. τετράπλευρον] -άπλευ- in ras. W. *ΞΣ*] *ΞΤΣ* Wp, corr. m. 2 U. 13. *ΕΛ*] m. 2 U, *ΕΝ* Wp. 14. οὕτω p. *ΚΕΠ* p. τό] ὡς W, ὡς τό p, corr. Halley. 15. *ΚΞΝ* ἔσται] scripsi cum Comm., *ΔΞ* (*Δ* e corr.) seq. magna lac. W, *ΔΞ*, deinde ante lac. del. τὸ ἀπὸ *ΕΛ* p, *ΚΞΝ* τρίγωνον ὡς ἄρα Halley. τό (tert.)] τὸ ἀπό Wp, corr. Comm. 16. οὕτω p. *ΘΞΠ*] Comm., *ΘΠΞ* Wp. *ΞΡ*] *ΞΣ* Halley cum Comm., et ita scriptum esse


est autem etiam $\Delta\Pi\Delta : \Delta\Delta^2 = HKM : HK^2$ [Eucl. VI, 22]; itaque etiam ex aequo

$$E\Delta^2 : \Delta\Delta^2 = K\Theta^2 : HK^2, \text{ h. e.}$$

$$E\Delta^2 : \Delta\Delta^2 = \Theta K \times KT : HK \times KO.$$

Iisdem suppositis, si $\Theta K\Pi$ siue recta rectae $E\Delta$ parallela ducta per $K$ centrum cadit, $HO$ autem non per centrum, dico, sic quoque esse

$E\Delta^2 : \Delta\Delta^2 = \Theta\Xi \times \Xi\Pi : H\Xi \times \Xi O.$




ducantur enim per $O$, $\Pi$ contingentibus parallelae $OP$, $\Pi\Sigma$. quoniam igitur

$$MOP = MNK + \Delta KT$$

et

$$K\Sigma\Pi = \Delta KT \text{ [III, 15]},$$

erit

$$MOP = MNK + K\Sigma\Pi;$$

quare reliquum[1]) quadrilaterum $\Xi P = \Xi\Sigma$. et quoniam est

$$E\Delta^2 : E\Delta T = \Pi K^2 : K\Sigma\Pi = K\Xi^2 : K\Xi N$$

[Eucl. VI, 22], erit [Eucl. V, 19]

$$E\Delta^2 : E\Delta T = \Theta\Xi \times \Xi\Pi : \Xi P \text{ [Eucl. II, 5]}.$$

et $\Delta\Phi\Delta = E\Delta T$ [III, 4], $\Xi P = \Xi\Sigma$; itaque

$$E\Delta^2 : \Delta\Delta\Phi = \Theta\Xi \times \Xi\Pi : \Xi\Sigma.$$

---

In fig. litt. $\Delta$, $H$, $\Theta$ om. W, pro $N$ hab. $H$.

---

1) Ablatis triangulis $MKN + KN\Xi$.

---

oportuit. 17. ἐστιν W. $E\Delta\Sigma$ p? 20. τό (pr.)] τά Wp, corr. Halley cum Comm. τό (sec.)] τά Wp, corr. Halley cum Comm. $\Xi\Sigma$] $\Sigma\Xi$ p.

τὸ ὑπὸ *ΗΞΟ*· καὶ δι' ἴσου ἐστίν, ὡς τὸ ἀπὸ *ΕΛ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΛΑ*, τὸ ὑπὸ *ΘΞΠ* πρὸς τὸ ὑπὸ *ΗΞΟ*.

## Ἄλλως.

ἔστι δὲ καὶ οὕτως δεῖξαι·

ἐπεί, ἐὰν τῆς *ΕΖ* τομῆς ἀχθῇ ἐπιψαύουσα, καθ' ὃ συμβάλλει ἡ *ΑΖ* διάμετρος τῇ *ΕΖ* τομῇ, γίνεται παράλληλος ἡ ἀχθεῖσα τῇ *ΑΤ*, καὶ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει ἡ ἀχθεῖσα πρὸς τὴν ἀποτεμνομένην ὑπ' αὐτῆς πρὸς τῷ *Ε* ἀπὸ τῆς *ΕΦ* τῷ ὃν ἔχει ἡ *ΑΛ* πρὸς *ΛΕ*, καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως τοῖς εἰς τὸ ιθ'.

## Εἰς τὸ κθ'.

Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ *ΛΞ* τῇ *ΟΝ*, τὰ ἀπὸ *ΛΗΝ* τῶν ἀπὸ *ΞΗΟ* ὑπερέχει τῷ δὶς ὑπὸ *ΝΞΛ*] ἔστω εὐθεῖα ἡ *ΛΝ*, καὶ ἀφῃρήσθωσαν ἀπ' αὐτῆς ἴσαι αἱ *ΛΞ*, *ΝΟ*......τὸ σχῆμα. φανερὸν δὴ ἐκ τῆς ὁμοιότητος καὶ τοῦ ἴσην εἶναι τὴν *ΛΞ* τῇ *ΟΝ*, ὅτι τὰ *ΛΔ*, *ΖΝ*, *ΑΤ*, *ΦΒ* τετράγωνα ἴσα ἐστὶν ἀλλήλοις. ἐπεὶ οὖν τὰ ἀπὸ *ΛΗΝ* τὰ *ΑΜ*, *ΜΝ* ἐστιν, τὰ δὲ ἀπὸ *ΞΗΟ* ἐστι

---

1. *ΝΞΟ* p. ἐστίν] p, ν supra scr. m. 1 W. ὡς] -ς e corr. m. 1 W. 2. ὑπό] ὑπὸ τό Wp, corr. Halley. *ΘΞΠ*] *Θ* corr. ex *Ο* p. *ΗΞΟ*] *ΗΞΘ* W et, *Η* e corr., p; corr. Comm. 4. ἔστιν W. οὕτω p. 5. ἐπεί, ἐάν] ἐὰν γάρ Halley. 6. *ΑΖ*] *ΑΒ* p. 9. *ΑΛ*] *ΑΔ* Wp, corr. Halley. 11. Εἰς τὸ κθ'] εἰς τὸ λ' p et mg. m. 1 W; corr. Comm. 12. *ΛΞ*] *ΑΞ* Wp, corr. Comm. 13. *ΛΗΝ*] scripsi, *ΛΜΝ* Wp, *lg gn* Comm. *ΞΗΟ* — δίς] *ΞΗ* τῶν Wp, corr. Halley cum Comm. (*xg go*). 15. *ΛΞ*] *ΑΞ* Wp, corr. Comm. *ΝΟ*] *ΝΘ*, *Θ* e corr., p. Deinde magnam lacunam hab. Wp; καὶ γενέσθω suppleuit Halley; sed debuit καὶ καταγεγράφθω uel καὶ συμπεπληρώσθω, et multo plura desunt (*et figura describatur* Comm.). ὅτι ἐκ U. 16. τὴν *ΛΞ*] τῆν *ΛΞ* p, τῇ *ΝΛΞ* W. ὅτι] addidi, om. Wp. 18. *ΛΗΝ*] scripsi, *ΔΗΜ* Wp; *ΛΗ*, *ΗΝ* m. 2 U. *ΞΗΟ*] *ΞΗΘ* Wp; *ΞΗ*, *ΗΟ* Comm. ἔστιν W.

iam eadem de causa etiam

$$\Lambda A\Phi : A\Lambda^2 = \Xi\Sigma : H\Xi \times \Xi O,$$

et ex aequo est $E\Lambda^2 : A\Lambda^2 = \Theta\Xi \times \Xi\Pi : H\Xi \times \Xi O.$

## Aliter.


Potest autem etiam sic demonstrari:

quoniam, si recta ducitur sectionem $EZ$ contingens in eo puncto, in quo $\Lambda Z$ diametrus cum sectione $EZ$ concurrit, recta ita ducta rectae $\Lambda T$ parallela fit [Eutocius ad I, 44], recta ducta etiam ad rectam de $E\Phi$ ad $E$ ab ea abscisam eandem rationem habet, quam $A\Lambda : \Lambda E$ [supra p. 335 not. 2], et cetera eodem modo, quo ad prop. XIX dictum est [supra p. 334].

## Ad prop. XXIX.

Nam quoniam est $\Lambda\Xi = ON$, erit

$$\Lambda H^2 + HN^2 = \Xi H^2 + HO^2 + 2N\Xi \times \Xi\Lambda$$




I p. 384, 25—26] sit recta $\Lambda N$, et ab ea auferantur aequales $\Lambda\Xi$, $NO$ [et perpendiculares ducantur $\Lambda A$, $NB$, sitque

$$\Lambda\Gamma = \Lambda\Xi,$$
$$\Lambda I = HN,$$
$$IA = \Lambda H,$$
$$\Sigma A = \Lambda\Xi;$$

et expleatur] figura. manifestum igitur ex similitudine et ex eo, quod $\Lambda\Xi = ON$, esse

In fig. litt. $B$ om. W, pro ϛ hab. $\mu$, pro $A'B'$ autem $\omega\beta$. ϡ scribitur ⅂ν.

τὰ *ΤΜ*, *ΜΖ*, τὰ ἄρα ἀπὸ *ΛΗΝ* τῶν ἀπὸ *ΞΗΟ* ὑπερέχουσι τοῖς [illegible], *Α΄Β΄* γνώμοσιν. καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστὶ τὸ *ΗΖ* τῷ *ΦΩ*, τὸ δὲ *ΣΚ* τῷ *ΦΡ*, οἱ [illegible], *Α΄Β΄* γνώμονες ἴσοι εἰσὶ τῷ τε *ΖΒ* καὶ τῷ *ΑΦ*. τὸ δὲ *ΑΦ* τῷ *ΖΛ* ἴσον, τὰ δὲ *ΖΛ*, *ΖΒ* ἴσα ἐστὶ τῷ δὶς ὑπὸ *ΛΞΝ*, τουτέστιν ὑπὸ *ΛΟΝ*· τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν *ΛΗΝ*, τουτέστι τὰ *ΑΜ*, *ΜΝ*, τῶν ἀπὸ *ΞΗΟ*, τουτέστι τῶν *ΤΜ*, *ΜΖ*, ὑπερέχει τῷ δὶς ὑπὸ *ΝΞΛ* ἤτοι τοῖς *ΛΖ*, *ΖΒ*.

## Εἰς τὸ λα΄.

Δυνατόν ἐστι τοῦτο τὸ θεώρημα δεῖξαι ὁμοίως τῷ πρὸ αὐτοῦ ποιοῦντας τὰς δύο εὐθείας μιᾶς τομῆς ἐφάπτεσθαι· ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πάντῃ ταὐτὸν ἦν τῷ ἐπὶ τῆς μιᾶς ὑπερβολῆς προδεδειγμένῳ, αὕτη ἡ ἀπόδειξις ἀπελέχθη.

## Εἰς τὸ λγ΄.

Ἔστι καὶ ἄλλως τοῦτο τὸ θεώρημα δεῖξαι·

ἐὰν γὰρ ἐπιζεύξωμεν τὰς *ΓΛ*, *ΛΖ*, ἐφάψονται τῶν τομῶν διὰ τὰ δεδειγμένα ἐν τῷ μ΄ τοῦ β΄ βιβλίου. ἐπεὶ οὖν . . . . . .

## Ἄλλως τὸ λδ΄.

Ἔστω ὑπερβολὴ ἡ *ΑΒ* καὶ ἀσύμπτωτοι αἱ *ΓΔΕ* καὶ ἐφαπτομένη ἡ *ΓΒΕ* καὶ παράλληλοι αἱ *ΓΑΗ*, *ΖΒΗ*. λέγω, ὅτι ἴση ἡ *ΓΑ* τῇ *ΑΗ*.

---

1. *ΛΗΝ*] *ΛΗΜ* Wp; *ΛΗ*, *ΗΝ* Comm. 2. *Α΄Β΄*] α ,Β W, αβ p. καί] supra scr. p? ἐπεὶ καί p? 3. ἐστίν W. *Α΄Β΄*] α ,Β W, ,αβ p. 4. εἰσίν W. Post τε litt. del. p. 5. *ΖΒ*] *ΑΖΒ* Wp. ἐστίν W. τῷ] corr. ex τό W. δίς] δέ Wp, corr. Halley. 6. *ΛΖΝ* p? 7. τουτέστιν W. *ΞΗΟ*] *ΞΗΘ* Wp; *ΞΗ*, *ΗΟ* Comm. τουτέστιν W. 14. Post ὑπερβολῆς una litt. del. p. 15. ἀπελέχθη] Halley, ἀπελέγχθη W, ἀπηλέγχθη p. 17. ἔστιν W. 18. *ΓΛ*] scripsi,

$A\Delta = ZN = AT = \Phi B$. quoniam igitur

$$AH^2 + HN^2 = AM + MN$$

et $\Xi H^2 + HO^2 = TM + MZ$, erit

$$AH^2 + HN^2 = \Xi H^2 + HO^2 + \text{⅋q} + A'B'.$$

et quoniam est $HZ = \Phi\Omega$, $\Sigma K = \Phi P$, erunt gnomones ⅋q $+ A'B' = ZB + A\Phi$. est autem $A\Phi = ZA$, et $ZB + ZA = 2A\Xi \times \Xi N = 2AO \times ON$. ergo $AH^2 + HN^2$ (siue $AM + MN$) $= \Xi H^2 + HO^2$ (siue $TM + MZ$) $+ 2N\Xi \times \Xi A$ (siue $AZ + ZB$).

## Ad prop. XXXI.

Fieri potest, ut haec propositio similiter demonstretur ac praecedens, si utramque rectam eandem sectionem contingentem fecerimus; sed quoniam prorsus idem erat, ac quod in una hyperbola antea demonstratum est [III, 30], hanc demonstrationem elegimus.

## Ad prop. XXXIII.

Haec propositio etiam aliter demonstrari potest: si enim $\Gamma A$, $AZ$ duxerimus, sectiones contingent propter ea, quae in prop. XL libri II demonstrata sunt. quoniam igitur....

## Aliter prop. XXXIV.

Sit hyperbola $AB$, asymptotae $\Gamma\Delta$, $\Delta E$, contingens $\Gamma BE$, parallelae $\Gamma AH$, $ZBH$. dico, esse $\Gamma A = AH$.

---

$TA$ Wp. 20. Post οὖν magnam lacunam Wp. 23. $\Gamma BE$] $\Pi BE$ Wp, corr. Comm. $\Gamma AH$] $A$ corr. ex $\Delta$ m. 1 W; $\Gamma\Delta H$, $H$ e corr., p. 24. $ZBH$] $ZHB$ Wp, corr. Comm.

ἐπεζεύχθω γὰρ ἡ ΑΒ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ Θ, Κ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΓΒ τῇ ΒΕ, ἴση ἄρα καὶ ἡ ΚΒ τῇ ΒΑ. ἀλλὰ ἡ ΚΒ τῇ ΑΘ ἐστιν ἴση· ὥστε καὶ ἡ ΓΑ τῇ ΑΗ.


Ἄλλως τὸ λε'.

Ἔστω ὑπερβολὴ ἡ ΑΒ, ἀσύμπτωτοι δὲ αἱ ΓΔΕ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἡ μὲν ΓΒΕ ἐφαπτέσθω, ἡ δὲ ΓΑΗΘ τεμνέτω τὴν τομὴν κατὰ τὰ Α, Η σημεῖα, καὶ διὰ τοῦ Β παρὰ τὴν ΓΔ ἤχθω ἡ ΚΒΖ. δεικτέον, ὅτι ἐστίν, ὡς ἡ ΗΓ πρὸς ΓΑ, ἡ ΗΖ πρὸς ΖΑ.

ἐπεζεύχθω ἡ ΑΒ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ Λ, Μ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ε παρὰ τὴν ΓΘ ἤχθω ἡ ΕΝ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΓΒ τῇ ΕΒ, ἴση ἐστὶ καὶ ἡ ΓΑ τῇ ΕΝ, ἡ δὲ ΑΒ τῇ ΒΝ· ἡ ἄρα ΝΜ ὑπεροχή ἐστι τῶν ΒΜ, ΑΒ. ἴση δὲ ἡ ΒΜ τῇ ΛΑ· ἡ ΝΜ ἄρα ὑπεροχή ἐστι τῶν ΛΑ, ΑΒ. καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ ΑΘΜ παρὰ τὴν ΑΘ ἐστιν ἡ ΕΝ, ἔστιν, ὡς ἡ ΑΜ πρὸς ΝΜ, ἡ ΑΘ πρὸς ΝΕ. ἴση δὲ ἡ ΝΕ τῇ ΑΓ· ὡς ἄρα ἡ ΘΑ πρὸς ΑΓ, ἡ ΑΜ πρὸς τὴν ὑπεροχὴν τῶν ΑΒ, ΒΜ, τουτέστιν ἡ ΛΒ πρὸς τὴν ὑπεροχὴν τῶν ΛΑ, ΑΒ. ὡς δὲ ἡ ΘΑ πρὸς ΑΓ, ἡ ΗΓ πρὸς ΓΑ· ἴση γὰρ ἡ ΓΑ τῇ ΘΗ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΗΓ πρὸς ΓΑ, οὕτως ἡ ΛΒ πρὸς τὴν ὑπεροχὴν τῶν ΛΑ, ΑΒ καὶ ἡ ΓΖ πρὸς

---

7. ΓΒΕ] Halley, ΓΒ Wp. 8. τήν] bis p. Η] Β Wp, corr. Halley. 9. τὴν ΓΔ] τῆι ΜΓΔ Wp, corr. Comm. ΚΒΖ] scripsi, ΒΚΖ Wp, ΖΒΚ Halley cum Comm. 10. ΗΓ] Η e corr. W. 12. ΓΘ] corr. ex ΓΟ p. 13. ἐστίν — ἴση] om. p. ΕΒ] mg. m. 2 U, ΘΒ W. ἐστί] ἐστίν W. ΓΑ] m. 2 U, ΓΔ Wp. 14. ΝΜ — 15. ΑΒ] om. lacuna relicta Wp, corr. Halley (ΑΒ, ΒΜ). 15. ἐστιν W. 16. τριγώνου] corr. ex τρίγωνον W. ΑΘΜ] ΑΒΜ Wp, ΑΜΘ




ducatur enim $AB$ et ad $\Theta$, $K$ producatur. quoniam igitur est

$$\Gamma B = BE \text{ [II, 3]},$$

erit etiam [Eucl. VI, 4]

$$KB = BA.$$


uerum etiam [II, 8]

$$KB = A\Theta.$$

ergo etiam $\Gamma A = AH$.

## Aliter prop. XXXV.

Sit hyperbola $AB$ et asymptotae $\Gamma\Delta$, $\Delta E$, et a $\Gamma$ recta $\Gamma BE$ contingat, $\Gamma AH\Theta$ secet sectionem in punctis $A$, $H$, per $B$ autem rectae $\Gamma\Delta$ parallela ducatur $KBZ$. demonstrandum, esse $H\Gamma : \Gamma A = HZ : ZA$.




ducatur $AB$ producaturque ad $\Lambda$, $M$, et ab $E$ rectae $\Gamma\Theta$ parallela ducatur $EN$. quoniam igitur $\Gamma B = EB$ [II, 3], erit etiam [Eucl. VI. 4]

$$\Gamma\Lambda = EN, \; AB = BN.$$

itaque $NM = BM \div AB$. uerum $BM = \Lambda A$ [II, 8]; itaque $NM = \Lambda A \div AB$. et quoniam in triangulo $A\Theta M$ rectae $A\Theta$ parallela est $EN$, erit [Eucl. VI, 4] $AM : NM = A\Theta : NE$. est autem $NE = A\Gamma$; itaque

$$\Theta A : A\Gamma = AM : BM \div AB = \Lambda B : \Lambda A \div AB.$$

---

In fig. 2 rectam $EN$ om. W.

---

Halley cum Comm. 17. $AM$] $AN$ Wp, corr. Comm. 19. $AB$ — 20. τῶν] om. p. 23. τήν] bis p. ὑπεροχήν] Halley, ὑπερβολήν Wp. $\Gamma Z$] $\Pi Z$ Wp, corr. Comm.

τὴν τῶν *ΓΑ*, *ΖΑ* ὑπεροχήν. καὶ ἐπεὶ ζητῶ, εἴ ἐστιν, ὡς ἡ *ΓΗ* πρὸς *ΓΑ*, ἡ *ΗΖ* πρὸς *ΖΑ*, δεικτέον, εἴ ἐστιν, ὡς ὅλη ἡ *ΗΓ* πρὸς ὅλην τὴν *ΓΑ*, οὕτως ἡ ἀφαιρεθεῖσα ἡ *ΖΗ* πρὸς ἀφαιρεθεῖσαν τὴν *ΑΖ* καὶ λοιπὴ ἡ *ΓΖ* πρὸς λοιπὴν τὴν τῶν *ΓΑ*, *ΖΑ* ὑπεροχήν. δεικτέον ἄρα, ὅτι ἐστίν, ὡς ἡ *ΗΓ* πρὸς *ΓΑ*, ἡ *ΓΖ* πρὸς τὴν τῶν *ΓΑ*, *ΖΑ* ὑπεροχήν.

## Ἄλλως τὸ λϛʹ.

Ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ *Α*, *Δ* καὶ ἀσύμπτωτοι αἱ *ΒΚ*, *ΓΔ* καὶ ἐφαπτομένη ἡ *ΒΑΔ* καὶ διηγμένη ἡ *ΔΚΔΗΖ* καὶ τῇ *ΓΔ* παράλληλος ἡ *ΑΖ*. δεικτέον, ὅτι ἐστίν, ὡς ἡ *ΑΖ* πρὸς *ΖΗ*, ἡ *ΔΔ* πρὸς *ΔΗ*.

ἐπεζεύχθω ἡ *ΑΗ* καὶ ἐκβεβλήσθω· φανερὸν οὖν, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ *ΘΑ* τῇ *ΕΗ* καὶ ἡ *ΘΗ* τῇ *ΑΕ*. ἤχθω διὰ τοῦ *Δ* παρὰ τὴν *ΘΓ* ἡ *ΔΜ*· ἴση ἄρα ἡ *ΒΑ* τῇ *ΑΔ* καὶ ἡ *ΘΑ* τῇ *ΑΜ*. ἡ ἄρα *ΜΗ* ὑπεροχή ἐστι τῶν *ΘΑ*, *ΑΗ*, τουτέστι τῶν *ΑΗ*, *ΗΕ*. καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ *ΒΚ* τῇ *ΔΜ*, ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ *ΘΗ* πρὸς *ΗΜ*, ἡ *ΚΗ* πρὸς *ΗΔ*. ἴση δὲ ἡ μὲν *ΗΘ* τῇ *ΑΕ*, ἡ δὲ *ΑΔ* τῇ *ΚΗ*· ὡς ἄρα ἡ *ΑΔ* πρὸς *ΔΗ*,

1. *ΓΑ*] *ΓΖ* Wp, corr. Comm. εἰ] ἡ Wp, corr. Comm. 2. δεικτέον, εἴ ἐστιν] uix sanum, δεικτέον ἤ ἐστιν Wp, δεικτέον ὅτι Halley. 3. ἡ (alt.)] del. Halley. 4. ἀφαιρεθεῖσα] corr. ex ἀφαιρεθῆσα m. 1 W. 5. *ΓΑ*] *ΓΖ* Wp, corr. Comm. 6. δέδεικται δέ Halley. 7. *ΓΑ*] *Γ* Wp, corr. Comm. 11. *ΑΚΔΗΖ*] *ΗΑΔΗΖ* Wp, corr. Comm. *ΑΖ*] *ΑΖΔ* Wp, corr. Comm. 12. *ΛΔ*] *ΑΔ* Wp, corr. Comm. 13. *ΑΗ*] *ΑΒ* W, *ΑΘ* p, corr. Comm. οὖν] om. p. 14. ἡ *ΘΑ* — καί] bis W (altero loco ante *ΕΗ* ras. 1 litt.). 15. ἡ *ΔΜ*] *ΗΔΜ* Wp, corr. Comm. 16. ἐστιν W. 17. τουτέστιν W. τῶν — ἐπεί] Halley cum Comm., lacun. Wp. 19. *ΘΗ*] *ΘΝ* p. πρός (pr.) — *ΗΔ*] lacun. Wp, corr. mg. m. 2 U (οὕτως ἡ).

est autem $\Theta A : A\Gamma = H\Gamma : \Gamma A$; nam $\Gamma A = \Theta H$ [II, 8]; quare etiam

$$H\Gamma : \Gamma A = \Lambda B : \Lambda A \div AB = \Gamma Z : \Gamma A \div ZA$$[1].

et quoniam quaerimus, sitne $\Gamma H : \Gamma A = HZ : ZA$, quaerendum, sitne

$$H\Gamma : \Gamma A = ZH : AZ = \Gamma Z : \Gamma A \div ZA$$

[Eucl. V, 19]. ergo demonstrandum, esse


$$H\Gamma : \Gamma A = \Gamma Z : \Gamma A \div ZA.$$

## Aliter prop. XXXVI.

Sint oppositae $A$, $\Lambda$, asymptotae $BK$, $\Gamma\Delta$, contingens $BA\Delta$, sectiones secans $\Lambda K\Delta HZ$, rectaeque $\Gamma\Delta$ parallela $AZ$. demonstrandum, esse

$$\Lambda Z : ZH = \Lambda\Delta : \Delta H.$$

ducatur $AH$ producaturque; manifestum igitur, esse $\Theta A = EH$ [II, 8] et $\Theta H = AE$. ducatur per




$\Delta$ rectae $\Theta\Gamma$ parallela $\Delta M$; itaque $BA = A\Delta$ [II, 3] et [Eucl. VI, 4] $\Theta A = AM$. itaque

$$MH = AH \div \Theta A = AH \div HE.$$

et quoniam $BK$ rectae $\Delta M$ parallela est, erit [Eucl.

1) Quoniam $\Gamma A\Lambda$, $ABZ$ similes sunt, erit (Eucl. VI, 4)
$\Gamma A : A\Lambda = AZ : AB = \Gamma Z : B\Lambda$ (Eucl. V, 18)
$= \Gamma A \div AZ : A\Lambda \div AB$ (Eucl. V, 19).

οὕτως ἡ *AE* πρὸς *HM*, τουτέστι τὴν τῶν *AHE* ὑπεροχήν. ἀλλ' ὡς ἡ *AE* πρὸς τὴν τῶν *AHE* ὑπεροχήν, οὕτως ἡ *ΔZ* πρὸς τὴν τῶν *ΔHZ* ὑπεροχήν· προδέδεικται γάρ· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ *ΛΔ* πρὸς *ΔH*, ἡ *ΔZ* πρὸς τὴν τῶν *ΔHZ* ὑπεροχήν. καὶ ὡς ἓν πρὸς ἕν, οὕτως ἅπαντα πρὸς ἅπαντα, ὡς ἡ *ΛΔ* πρὸς *ΔH*, ὅλη ἡ *ΛZ* πρὸς *ΔH* καὶ τὴν τῶν *ΔHZ* ὑπεροχήν, τουτέστι τὴν *HZ*.

## Ἄλλως τὸ αὐτό.

Ἔστω τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον καὶ διὰ τοῦ *A* παρὰ τὴν *BK* ἡ *AM*.

ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ *BA* τῇ *AΔ*, ἴση ἐστὶ καὶ ἡ *KM* τῇ *MΔ*. καὶ ἐπεὶ παράλληλοί εἰσιν αἱ *ΘK*, *AM*, ἔστιν, ὡς ἡ *HM* πρὸς *MK*, ἡ *HA* πρὸς *AΘ*, τουτέστιν ἡ *AH* πρὸς *HE*. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ *AH* πρὸς *HE*, ἡ *ZH* πρὸς *HΔ*, ὡς δὲ ἡ *HM* πρὸς *MK*, ἡ διπλασία τῆς *MH* πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς *MK*· ὡς ἄρα ἡ *ZH* πρὸς *HΔ*, ἡ διπλασία τῆς *MH* πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς *MK*. καί ἐστι διπλασία τῆς *MH* ἡ *ΛH*· ἴση γὰρ ἡ *ΛK* τῇ *ΔH* καὶ ἡ *KM* τῇ *MΔ*· τῆς δὲ *KM* διπλασία ἡ *ΔK*· ὡς ἄρα ἡ *ΛH* πρὸς *HZ*, ἡ *KΔ* πρὸς *ΔH*. συνθέντι, ὡς ἡ *ΛZ* πρὸς *ZH*, ἡ *KH* πρὸς *HΔ*, τουτέστιν ἡ *ΛΔ* πρὸς *ΔH*.

---

1. *HM*] $\bar{\eta}$ Wp, corr. Comm. τουτέστιν W. 2. *AE*] *AHE* p et, *H* e corr. m. 1, W; corr. Comm. 4. προσδέδεικται p. *ΛΔ*] *Δ* e corr. m. 1 W. 5. *ΔZ*] Z e corr. p. ὡς] comp. p, ὠ W. 6. ὡς ἄρα Halley cum Comm. 8. τουτέστιν W. 9. ἄλλως] p, ἄλλος W. 12. ἐστί] ἐστίν W. 14. *MK*, ἡ] corr. ex *MKH* p, *MKH* W. *HA*] *NA* p. 15. *AH*] *H* e corr. m. 1 W. *AH*] *AN* p. 16. *HE*] *HΣ* Wp, corr. Comm. 17. ὡς — 19. *MK*] in ras. p. 19. ἐστιν W.

VI, 4] $\Theta H : HM = KH : H\Delta$. uerum $H\Theta = AE$, $\Lambda\Delta = KH$ [II, 16]; itaque

$$\Lambda\Delta : \Delta H = AE : HM = AE : AH \div HE.$$


est autem $AE : AH \div HE = \Delta Z : HZ \div \Delta H$; hoc enim antea demonstratum est [ad prop. XXXV supra p. 347 not.]; itaque $\Lambda\Delta : \Delta H = \Delta Z : HZ \div \Delta H$. et ut unum ad unum, ita omnia ad omnia [Eucl. V, 12], $\Lambda\Delta : \Delta H = \Lambda Z : \Delta H + (HZ \div \Delta H) = \Lambda Z : HZ$.

Aliter idem.

Sint eadem, quae antea, et per $A$ rectae $BK$ parallela $AM$.

quoniam igitur $BA = A\Delta$ [II, 3], erit etiam $KM = M\Delta$ [Eucl. VI, 2]. et quoniam $\Theta K$, $AM$ parallelae sunt, erit [Eucl. VI, 2]

$$HM : MK = HA : A\Theta = AH : HE \text{ [II, 8].}$$




est autem [Eucl. VI, 4] $AH : HE = ZH : H\Delta$,

$$HM : MK = 2MH : 2MK \text{ [Eucl. V, 15];}$$

itaque erit $ZH : H\Delta = 2MH : 2MK$. est autem $\Lambda H = 2MH$; nam $\Lambda K = \Delta H$ [II, 16] et $KM = M\Delta$; et $\Delta K = 2KM$. quare $\Lambda H : HZ = K\Delta : \Delta H$. componendo $\Lambda Z : ZH = KH : H\Delta = \Lambda\Delta : \Delta H$ [II, 16].

In fig. $B$, $\Theta$ permutat W.

*Ἄλλως τὸ μδʹ.*

Ἀποδεδειγμένων τῶν ΓΕ, ΖΗ παραλλήλων ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΗΑ, ΖΒ.

ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ΖΗ τῇ ΓΕ, ἴσον τὸ ΓΗΖ τρίγωνον τῷ ΕΗΖ τριγώνῳ. καί ἐστι τὸ μὲν ΓΖΗ τοῦ ΑΗΖ διπλάσιον, ἐπεὶ καὶ ἡ ΓΖ τῆς ΖΑ, τὸ δὲ ΕΗΖ τοῦ ΒΗΖ· ἴσον ἄρα τὸ ΑΗΖ τῷ ΒΗΖ. παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ ΑΒ.

ἐπὶ δὲ τῶν ἀντικειμένων ἡ ΑΒ ἢ ...... μὴ ἔρχεται δια τοῦ Δ κέντρου, ἤχθω διὰ τοῦ Δ παράλληλος τῇ ΓΕ ἡ ΔΚΑ καὶ διὰ τῶν Κ, Α ἐφαπτόμεναι τῶν τομῶν αἱ ΚΜΝ, ΑΞΟ. οὕτως γὰρ δῆλον γενήσεται, ὅτι, ἐπειδὴ τὸ ὑπὸ ΞΔΟ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΜΔΝ, ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ ΞΔΟ τῷ ὑπὸ ΕΔΗ ἐστιν ἴσον, το δὲ ὑπὸ ΜΔΝ τῷ ὑπὸ ΓΔΖ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΕΔΗ ἴσον τῷ ὑπὸ ΓΔΖ.

*Εἰς τὸ νδʹ.*

Ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΝΓ, ΜΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΜ, τὸ ὑπὸ ΑΓ, ΚΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΑ] ἐπεὶ γάρ ἐστιν, ὡς ἡ ΑΔ πρὸς ΔΜ, ἡ ΓΔ πρὸς ΔΝ, ἀναστρέψαντι, ὡς ἡ ΔΑ πρὸς ΑΜ, ἡ ΔΓ προς ΓΝ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ


---

4. ΓΕ] ΓΒ Wp, corr. Comm. 5. ἐστιν W. 6. ΓΖ] Ζ in ras. m. 1 W. 7. ΕΗΖ] ΗΖ Wp, corr. Comm. Post τό (alt.) del. ΑΖΗ p. 9. ἐπί] ἐπεί Wp, corr. Comm. Post ἤ lacunam statuo; Comm. εἰ uoluisse uidetur pro ἤ. ἔρχεται] in ras. m. 1 W. 11. ΔΚΑ] ΚΔΑ? 12. ΚΜΝ, ΑΞΟ] ΜΚΝ, ΞΑΟ? οὕτω p. δῆλον] scripsi, δή Wp. 13. ΞΔΟ] Ο corr. ex Θ? W, ΞΔΘ p. ἐστίν W. 14. ΞΔΟ] ΔΟ in ras. m. 1 W. 19. ΑΓ] ΑΓ Wp, corr. Comm. Post ἀπό del. 1 litt. p. 20. ΑΔ] ΑΕ Wp, corr. Comm. ΔΝ] ΑΝ Wp, corr. Comm. 21. ΔΓ] Δ in ras. W.

## Aliter prop. XLIV.

Cum demonstrauerimus [I p. 422, 19], parallelas esse $\Gamma E$, $ZH$, ducantur [in fig. I p. 422] $H A$, $ZB$.

quoniam $ZH$, $\Gamma E$ parallelae sunt, erit [Eucl. I, 37] $\triangle\ \Gamma HZ = EHZ$. est autem $\Gamma ZH = 2 AHZ$ [Eucl. VI, 1], quoniam etiam $\Gamma Z = 2 Z\Delta$ [II, 3], et [id.] $EHZ = 2 BHZ$. itaque $AHZ = BHZ$. ergo [Eucl. VI, 1] $ZH$, $AB$ parallelae sunt.




in oppositis autem[1]) $AB$ aut [per centrum cadit aut non per centrum. si per centrum cadit, ex II, 15 adparet, quod quaeritur; sin] non cadit per centrum $\Delta$, per $\Delta$ rectae $\Gamma E$ parallela ducatur $K\Delta\Lambda$ et per $K$, $\Lambda$ sectiones contingentes $MKN$, $\Xi\Lambda O$. ita enim adparebit, quoniam $\Xi\Delta \times \Delta O = M\Delta \times \Delta N$ [II, 15], et $\Xi\Delta \times \Delta O = E\Delta \times \Delta H$, $M\Delta \times \Delta N = \Gamma\Delta \times \Delta Z$ [III, 43], esse $E\Delta \times \Delta H = \Gamma\Delta \times \Delta Z$.

## Ad prop. LIV.

Est autem $N\Gamma \times MA : AM^2 = A\Gamma \times KA : KA^2$ I p. 442, 12—13] quoniam enim est [Eucl. VI, 4]

---

In fig., quae omnino minus adcurate descripta est, litt. $\Delta$, $\Lambda$ om. W; pro $N$ hab. $H$, pro $O$, ut uidetur, $C$.

---

1) Haec Halleius ad prop. XLIII rettulit, sed est demonstratio in oppositis proportionis $\Gamma\Delta : \Delta E = H\Delta : \Delta Z$ I p. 422, 16 sq., quam necessariam duxit, nec immerito, quia III, 43, qua in demonstratione prop. 44 utimur, in sola hyperbola demonstrata est.

*καὶ τὸ ἀνάπαλίν ἐστιν, ὡς ἡ ΚΑ πρὸς ΑΔ, ἡ ΑΓ πρὸς ΓΔ· δι' ἴσου ἄρα, ὡς ἡ ΜΑ πρὸς ΑΚ, ἡ ΝΓ πρὸς ΓΛ· καὶ ἐναλλάξ, ὡς ἡ ΜΑ πρὸς ΝΓ, ἡ ΚΑ πρὸς ΛΓ. καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΝΓ, ΑΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΜ, τὸ ὑπὸ ΛΓ, ΚΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΑ.*

*Ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ὑπὸ ΑΜ, ΝΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΔΜ, τὸ ἀπὸ ΕΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΔ] ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΑΜ, ΓΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΔΜ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἐκ τοῦ τῆς ΑΜ πρὸς ΜΔ καὶ τοῦ τῆς ΓΝ πρὸς ΝΔ, ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΑΜ πρὸς ΜΔ, ἡ ΕΒ πρὸς ΒΔ, ὡς δὲ ἡ ΓΝ πρὸς ΝΔ, ἡ ΕΒ πρὸς ΒΔ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΜ, ΓΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΔΜ διπλασίονα λόγον ἔχει τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΕΒ πρὸς ΒΔ. ἔχει δὲ καὶ τὸ ἀπὸ ΕΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΔ διπλασίονα λόγον τοῦ τῆς ΕΒ πρὸς ΒΔ· ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΜ, ΓΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΔΜ, τὸ ἀπὸ ΕΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΔ.*

*Ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΝΔΜ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΒΜ, τὸ ὑπὸ ΓΔΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΑ] ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΝΔΜ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΒΜ τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἐκ τοῦ τῆς ΔΝ πρὸς ΝΒ καὶ τοῦ τῆς ΔΜ πρὸς ΜΒ, ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΔΝ πρὸς ΝΒ, ἡ ΔΓ πρὸς ΓΕ, ὡς δὲ ἡ ΔΜ πρὸς ΜΒ, ἡ ΔΑ πρὸς ΑΕ, ἕξει ἄρα τὸν συγκείμενον ἐκ τοῦ τῆς ΔΓ πρὸς ΓΕ καὶ τοῦ τῆς ΔΑ πρὸς ΑΕ, ὅς ἐστιν ὁ αὐτὸς τῷ ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ ΓΔΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΑ. ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΝΔΜ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΒΜ, τὸ ὑπὸ ΓΔΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΑ.*

---

2. *δι'*] p, om. W. 4. *ΛΓ*] scripsi, *ΛΚ* Wp, *cl* Comm. 5. *τὸ ὑπό*] *τοῦ* W, *τό* p, corr. Comm. *ἀπό*] corr. ex *ὑπό* p. 7. *ΝΔΜ*] *ΝΑΜ* Wp, corr. Comm. 8. *ὑπό* (pr.)] e corr. p. *ὑπὸ ΝΔΜ*] *ἀπὸ ΕΔ* Wp, corr. Comm. 9. *ἔχει*] supra scr. m. 1 W. 10. *ΝΔ*] *ΝΒ* Wp, corr. Comm. 13. *ἔχει δέ* — 15. *ΒΔ*] om. p. 15. *ὡς*] p, *ὡ* W. 16. *ὑπό*]

$A\Delta : \Delta M = \Gamma\Delta : \Delta N$, conuertendo erit
$$\Delta A : AM = \Delta\Gamma : \Gamma N.$$
eadem de causa [Eucl. VI, 4] et e contrario erit $KA : A\Delta = A\Gamma : \Gamma\Delta$; ex aequo igitur
$$MA : AK = N\Gamma : \Gamma A;$$
et permutando $MA : N\Gamma = KA : A\Gamma$. ergo etiam $N\Gamma \times AM : AM^2 = A\Gamma \times KA : KA^2$.

Uerum $N\Gamma \times AM : N\Delta \times \Delta M = EB^2 : B\Delta^2$ I p. 442, 28—444, 1] quoniam enim est $AM \times \Gamma N : N\Delta \times \Delta M = (AM : M\Delta) \times (\Gamma N : N\Delta)$. et $AM : M\Delta = EB : B\Delta$, $\Gamma N : N\Delta = EB : B\Delta$ [Eucl. VI, 2], erit $AM \times \Gamma N : N\Delta \times \Delta M = EB^2 : B\Delta^2$.

Et $N\Delta \times \Delta M : NB \times BM = \Gamma\Delta \times \Delta A : \Gamma E \times EA$ I p. 444, 1—2] quoniam enim $N\Delta \times \Delta M : NB \times BM = (\Delta N : NB) \times (\Delta M : MB)$, et $\Delta N : NB = \Delta\Gamma : \Gamma E$, $\Delta M : MB = \Delta A : AE$ [Eucl. VI, 4], erit $N\Delta \times \Delta M : NB \times BM$ $= (\Delta\Gamma : \Gamma E) \times (\Delta A : AE) = \Gamma\Delta \times \Delta A : \Gamma E \times EA$.

---

ἀπό p. $N\Delta M$] $\Delta M$ Wp, corr. Comm. ἀπό (pr.)] corr. ex ὑπό in scrib. W. 18. $\Gamma EA$] $E$ e corr. p. 19. $N\Delta M$ — ὑπό] om. Wp, corr. Comm. 20. $\Delta N$] $AN$ Wp, corr. Comm. 21. $\Delta N$] $N$ e corr. p. 22. $\Delta A$] δα W. 24. ὅς] e corr. p, ὡς W. 25. $\Gamma EA$] $A$ e corr. m. 1 W, $\Gamma E\Delta$ p. In fine: πεπλήρωται σὺν θεῷ τὸ ὑπόμνημα τοῦ γ' βιβλίου τῶν κωνικῶν Εὐτοκίου Ἀσκαλωνίτου Wp.

---

## *Εἰς τὸ δʹ.*

*Τὸ τέταρτον βιβλίον, ὦ φίλε ἑταῖρε Ἀνθέμιε, ζήτησιν μὲν ἔχει, ποσαχῶς αἱ τῶν κώνων τομαὶ ἀλλήλαις τε καὶ τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ συμβάλλουσιν ἤτοι ἐφαπτόμεναι ἢ τέμνουσαι, ἔστι δὲ χαρίεν καὶ σαφὲς τοῖς ἐντυγχάνουσι καὶ μάλιστα ἀπὸ τῆς ἡμετέρας ἐκδόσεως, καὶ οὐδὲ σχολίων δεῖται· τὸ γὰρ ἐνδέον αἱ παραγραφαὶ πληροῦσιν. δέδεικται δὲ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς, ὥσπερ καὶ Εὐκλείδης ἔδειξε τὰ περὶ τῶν τομῶν τοῦ κύκλου καὶ τῶν ἐπαφῶν. εὔχρηστος δὲ καὶ ἀναγκαῖος ὁ τρόπος οὗτος καὶ τῷ Ἀριστοτέλει δοκεῖ καὶ τοῖς γεωμέτραις καὶ μάλιστα τῷ Ἀρχιμήδει.*

*ἀναγινώσκοντι οὖν σοι τὰ δ̄ βιβλία δυνατὸν ἔσται διὰ τῆς τῶν κωνικῶν πραγματείας ἀναλύειν καὶ συντιθέναι τὸ προτεθέν· διὸ καὶ αὐτὸς ὁ Ἀπολλώνιος ἐν ἀρχῇ τοῦ βιβλίου φησὶ τὰ δ̄ βιβλία ἀρκεῖν πρὸς τὴν ἀγωγὴν τὴν στοιχειώδη, τὰ δὲ λοιπὰ εἶναι περιουσιαστικώτερα.*

---

1. *Εὐτοκίου Ἀσκαλωνίτου εἰς τὸ δʹ τῶν Ἀπολλωνίου κωνικῶν τῆς κατʼ αὐτὸν ἐκδόσεως* W, euan. p. 4. *τῇ*] *ἡ* Wp, corr. Comm. *περιφέρεια* W, comp. p. 5. *ἤτοι*] Halley, *ἤτε* Wp. *ἐφαπτόμεναι ἢ*] Halley, *ἐφαπτομένη* Wp. *ἔστιν* W. 6. *ἐντυγχάνουσιν* W. *μάλιστα* — 7. *ἐκδόσεως*] *μά* | p. 7. *δεῖται*] p, *δῆται* W. 10. *ἔδειξεν* W. *τοῦ*] Halley, *καὶ τοῦ* Wp. 12. *Ἀριστοτέλει*] corr. m. rec. ex *Ἀριστοτέλη* W. *Ἀριστοτέλει* — *γεωμέτραις*] corr. ex *Ἀριστοτέλει καὶ δοκεῖ* ad-

## In librum IV.

Liber quartus, mi Anthemie, disquisitionem continet, quot modis sectiones conorum et inter se et cum ambitu circuli concurrant siue contingentes siue secantes, est autem elegans et perspicuus iis, qui legent, maxime in nostra editione; nec scholiis eget; adnotationes[1]) enim explent, si quid deest. omnes uero propositiones eius per reductionem in absurdum demonstrantur, qua ratione etiam Euclides de sectionibus et contactu circuli demonstrauit [Elem. III, 10, 13]. quae ratio et Aristoteli [Anal. pr. I, 7] utilis necessariaque uidetur et geometris, in primis Archimedi.

perlectis igitur his IV libris tibi licebit per rationem conicorum omnia, quae proposita erunt, resoluere et componere. quare etiam Apollonius ipse in principio operis dicit, IV libros ad institutionem elementarem [I p. 4, 1] sufficere, reliquos autem ulterius progredi [I p. 4, 22].


1) Fuit, cum coniicerem. καταγραφαί, sed nunc credo significari breues illas notas, quibus in codd. mathematicorum propositiones usurpatae uel ipsius operis uel Euclidis citantur; tales igitur Eutocius uel addidisse uel in suis codd. conicorum inuenisse putandus est, quamquam in nostris desunt.

scriptis litteris αγβ p. 13. Ἀρχιμήδει] comp. p, Ἀρχιμήδηι W. 15. πραγματείας] p, πραγματίας W. 17. φησίν W, comp. p.

*ἀνάγνωθι οὖν αὐτὰ ἐπιμελῶς, καὶ εἴ σοι καταθυμίως γένηται καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ τοῦτον τὸν τύπον ὑπ' ἐμοῦ ἐκτεθῆναι, καὶ τοῦτο θεοῦ ἡγουμένου.γενήσεται. ἔρρωσο.*

*Ἄλλως τὸ κδ'.*

*Ἔστωσαν αἱ ΕΑΒΓ, ΔΑΒΓ τομαί, ὡς εἴρηται, καὶ διήχθω, ὡς ἔτυχεν, ἡ ΔΕΓ, καὶ διὰ τοῦ Α τῇ ΔΕΓ παράλληλος ἤχθω ἡ ΑΘ.*




*εἰ οὖν ἐντὸς τῶν τομῶν πίπτει, ἡ ἐν τῷ ῥητῷ ἀπόδειξις ἁρμόσει· εἰ δὲ ἐφάψεται κατὰ τὸ Α, ἀμφοτέρων ἐπιψαύσει τῶν τομῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἀγομένη διάμετρος τῆς ἑτέρας τῶν τομῶν διάμετρος ἔσται καὶ τῆς λοιπῆς. δίχα ἄρα τέμνει κατὰ τὸ Ζ τήν τε ΓΔ καὶ τὴν ΕΓ· ὅπερ ἀδύνατον.*

*Ἄλλως τὸ αὐτό.*

*Ἔστωσαν αἱ ΕΑΒΓ, ΔΑΒΓ τομαί, ὡς εἴρηται, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τοῦ ΑΒΓ κοινοῦ τμήματος αὐτῶν σημεῖόν τι τὸ Β, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΒ καὶ δίχα τετμήσθω κατὰ τὸ Ζ, καὶ διὰ τοῦ Ζ διάμετρος ἤχθω ἡ ΗΖΘ, καὶ διὰ τοῦ Γ παρὰ τὴν ΑΒ ἤχθω ἡ ΓΔΕ.*

*ἐπεὶ οὖν διάμετρός ἐστιν ἡ ΖΘ καὶ δίχα τέμνει τὴν ΑΒ, τεταγμένως ἄρα κατῆκται ἡ ΑΒ. καί ἐστι*

Fig. om. Wp.

1. *ἀνάγνωθι*] p, *ἀνάγνωθει* W. *σοι*] in ras. m. 1 W. 2. *γένηται*] p, *γένοιται* W. 6. *ΕΑΒΓ*] Ε insert. m. 1 W. *ΔΑΒΓ*] om. Wp, corr. Halley cum Comm. 7. *καί* (pr.)] *ἑστωσ καί* W (puncta add. m. rec., ( ) a m. 1 sunt), *ἔστω* (σ) *καί* p, *καί* w. 19. *τομαί*] om. p. 23. Ante *ΗΖΘ* del. *ΗΘΖ* p. 24. *καί*] om. Wp, corr. Halley; *quae* Comm. 25. *ἐστιν* W.

itaque eos studiose legas uelim, et si concupiueris, reliquos etiam ad hanc formam a me exponi, hoc quoque deo duce fiet. uale.


## Aliter prop. XXIV.

Sint $EAB\Gamma$, $\Delta AB\Gamma$ sectiones, quales diximus, et ducatur quaelibet recta $\Delta E\Gamma$, per $A$ autem rectae $\Delta E\Gamma$ parallela ducatur $A\Theta$.

ea igitur si intra sectiones cadit, demonstratio in uerbis Apollonii proposita apta erit; sin in $A$ contingit, utramque sectionem continget, et ea de causa diametrus ab $A$ ducta alterius sectionis etiam reliquae diametrus erit. ergo in $Z$ et $\Gamma\Delta$ et $E\Gamma$ in binas partes secat [I def. 4]; quod fieri non potest.

## Aliter idem.

Sint $EAB\Gamma$, $\Delta AB\Gamma$ sectiones, quales diximus, et in $AB\Gamma$ communi earum parte punctum aliquod sumatur $B$, ducaturque $AB$ et in $Z$ in duas partes aequales secetur, per $Z$ autem diametrus ducatur $HZ\Theta$, et per $\Gamma$ rectae $AB$ parallela ducatur $\Gamma\Delta E$.




quoniam igitur diametrus est $Z\Theta$ et rectam $AB$ in duas partes aequales secat, $AB$ ordinate ducta est [I def. 4]. et ei parallela est $\Gamma\Delta E$. itaque in $\Theta$ in binas partes aequales secta est [I def. 4] in $EAB\Gamma$ sectione $E\Gamma$, in $\Delta AB\Gamma$ autem $\Delta\Gamma$. ergo $E\Theta = \Theta\Delta$; quod fieri non potest.

Fig. om. Wp.

*παράλληλος αὐτῇ ἡ ΓΔΕ· δίχα ἄρα τέτμηται κατὰ τὸ Θ ἐν μὲν τῇ ΕΑΒΓ γεγραμμένῃ ἡ ΕΓ, ἐν δὲ τῇ ΔΑΒΓ ἡ ΔΓ. ἴση ἄρα ἡ ΕΘ τῇ ΘΔ· ὅπερ ἀδύνατον.*

*Ἄλλως τὸ μγ'.*

*Ἔστωσαν ἀντικείμεναι αἱ Α, Β, καὶ ὑπερβολὴ ἡ ΓΑΒΔ ἑκατέραν τῶν ἀντικειμένων τεμνέτω κατὰ τὰ Γ, Α, Β, Δ, ἀντικειμένη δὲ αὐτῆς ἔστω ἡ ΕΖ. λέγω, ὅτι ἡ ΕΖ οὐδετέρᾳ τῶν ἀντικειμένων συμπεσεῖται.*

*ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΔΒ, ΓΑ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν καὶ συμπιπτέτωσαν ἀλλήλαις κατὰ τὸ Θ· ἔσται ἄρα τὸ Θ μεταξὺ τῶν ἀσυμπτώτων τῆς ΓΑΒ τομῆς. ἔστωσαν ἀσύμπτωτοι τῆς ΓΑΒΔ αἱ ΚΗΛ, ΜΗΝ· φανερὸν δή, ὅτι αἱ ΝΗΛ τὴν ΕΖ τομὴν περιέχουσιν. καὶ ἡ ΓΑ τέμνει τὴν ΓΑΞ τομὴν κατὰ δύο σημεῖα τὰ Γ, Α· ἐκβαλλομένη ἄρα ἐφ' ἑκάτερα τῇ ἀντικειμένῃ οὐ συμπεσεῖται τῇ ΔΒΟ, ἀλλ' ἔσται μεταξὺ τῆς ΒΟ τομῆς καὶ τῆς ΛΗ. ὁμοίως δὴ καὶ ἡ ΔΒΘ οὐ συμπεσεῖται τῇ ΓΑΞ, ἀλλ' ἔσται μεταξὺ τῆς ΑΞ καὶ τῆς ΗΝ. ἐπεὶ οὖν αἱ ΘΠ, ΘΡ μὴ συμπίπτουσαι ταῖς Α, Β τομαῖς περιέχουσι τὰς ΝΗΛ ἀσυμπτώτους καὶ πολλῷ μᾶλλον τὴν ΕΖ τομήν, ἡ ΕΖ οὐδετέρᾳ τῶν ἀντικειμένων συμπεσεῖται.*

*Ἄλλως τὸ να'.*

*Λέγω, ὅτι ἡ Ε οὐδετέρᾳ τῶν Α, Β συμπεσεῖται. ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν Α, Β ἐφαπτόμεναι τῶν τομῶν*


---

2. ἐν (alt.)] εἰ Wp, corr. Comm. 7. Γ] insert. W. ἀντικειμένην? comp. p. αὐτῇ Halley. 8. ΕΖ] p, ἐξ post ras. 1 litt. W. συμπεσεῖται] συμ- supra scr. m. 1 p. 11. ἀσυμπτώτων] συμπτώσεων Wp, corr. Comm. ΓΑΒΔ Halley cum Comm. 14. ΓΑΖ p. 15. ἄρα] om. Wp, corr. Halley cum Comm.; possis etiam lin. 13 καὶ ἐπεὶ ἡ scribere. 17.

## Aliter prop. XLIII.

Sint oppositae *A*, *B*, et hyperbola *ΓABΔ* utramque oppositam secet in *Γ*, *A*, *B*, *Δ*, opposita autem eius sit *EZ*. dico, *EZ* cum neutra oppositarum concurrere.

ducantur enim *ΔB*, *ΓA* producanturque et in *Θ* concurrant; *Θ* igitur intra asymptotas sectionis *ΓAB* positum erit [II, 25]. sint *KHΛ*, *MHN* asymptotae sectionis *ΓABΔ*; manifestum igitur, rectas *NH*, *HΛ* sectionem *EZ* comprehendere [II, 15]. et *ΓA* sectionem *ΓAΞ* in duobus punctis *Γ*, *A* secat; producta igitur in utramque partem cum opposita *ΔBO* non concurret [II, 33], sed inter sectionem *BO* rectamque *ΛH* cadet. iam eodem modo etiam *ΔBΘ* non concurret cum *ΓAΞ*, sed inter *AΞ* et *HN* cadet. quoniam igitur *ΘΠ*, *ΘP* cum sectionibus *A*, *B* non concurrentes asymptotas *NH*, *HΛ* comprehendunt et multo magis sectionem *EZ*, *EZ* cum neutra oppositarum concurret.




## Aliter prop. LI.

Dico, sectionem *E* cum neutra sectionum *A*, *B* concurrere.

In fig. *Ξ*, *O* om. W.

*ΛH*] *AH* p. 18. *AΞ*] *ΛΞ* p. 19. *ΘΠ*] *ΘB* p. 20. *περιέχουσι*] p, *περιέχωσιν* W. 21. *πολλῷ*] p, *πολλό* W. 23. Ante *να'* eras. *α* W.

παράλληλος
τὸ Θ ἐν μὲν
ΛΑΒΓ ἡ Δ ἰ

Ἔστωσαν ( ΓΑΒΔ ἑκατέ Γ, Α, Β, Δ, ἐ ὅτι ἡ ΕΖ οὐδε ἐπεζεύχθωσα καὶ συμπιπτέτω τὸ Θ μεταξὺ τῶν σαν ἀσύμπτωτοι τ δή, ὅτι αἱ ΝΗΛ ΓΛ τέμνει τὴν Γ ἐκβαλλομένη ἄρα συμπεσεῖται τῇ Λ τομῆς καὶ τῆς Λ συμπεσεῖται τῇ Γ τῆς ΗΝ. ἐπεὶ οἱ ταῖς Α, Β τομαῖς καὶ πολλῷ μᾶλλον τῶν ἀντικειμένων ο

Λέγω, ὅτι ἡ Ε ήχθωσαν ἀπὸ τ

2. ἐν (alt.)] εἰ Wp, κειμένην? comp. p. αἱ litt. W. συμπεσεῖται πτώτων] συμπτώσεων cum Comm. 14. ΓΑΖ cum Comm.; possis etia

ducantur ab *Α*, *Β* rectae sectiones contingentes et inter se concurrant in *Γ* intra angulum sectionem *ΑΒ* comprehendentem [II, 25]; manifestum igitur, rectas *ΑΓ*, *ΓΒ* productas cum asymptotis sectionis *Ε* non concurrere, sed eas multoque magis sectionem *Ε* comprehendere [II, 33]. et quoniam *ΑΓ* sectionem *ΑΔ* contingit, *ΑΓ* cum *ΒΗ* non concurret [II, 33]. iam eodem modo demonstrabimus, *ΒΓ* cum *ΑΔ* non concurrere. ergo sectio *Ε* cum neutra sectionum *ΑΔ*, *ΒΗ* concurret.





Fig. om. Wp.